

## Pakkausselostetiedote: Tie toa käyttäjälle

### Lamisil 1 % sumute iholle, liuos

terbinafiinihydrokloridi

**Lue tämä pakkausselostetiedote huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausselostetiedote. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännyn lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännyn lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselostetiedoteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselostetiedoteessa kerrotaan:**

1. Mitä Lamisil-sumute on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lamisil-sumutetta
3. Miten Lamisil-sumutetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Lamisil-sumutteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Lamisil-sumute on ja mihin sitä käytetään**

Lamisil-sumute on sienilääke ihan sieni-infektion hoitoon. Se vaikuttaa tappamalla iho-oireita aiheuttavan sieniin.

Lamisil-sumutetta käytetään seuraavien sieni-infektioiden hoitoon:

- jalkasilsa (*tinea pedis*)
- nivustaipeen silsa (*tinea cruris*)
- vartalosilsa (*tinea corporis*)
- *Pityriasis versicolor* -nimisen hiivasienen aiheuttama infektio (savipuoli).

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Lamisil-sumutetta**

##### **Älä käytä Lamisil-sumutetta**

- jos olet allerginen terbinafiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

**Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos tämä koskee sinua äläkää käytä Lamisil-sumutetta.**

##### **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Lamisil-sumutetta.

- Käytä vain ulkoisesti. Älä käytä valmistetta suuhun tai niele sitä.
- Varo sumutteen joutumista kasvoille, silmiin tai vaurioituneelle iholle, missä alkoholi saattaa aiheuttaa ärsytystä. Jos sumuteliosta joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos oireet pitkittyvät, ota yhteyttä lääkäriin.
- Älä hengitä sumuteliosta.

- Lamisil-sumute sisältää alkoholia. Pidä poissa avotulen lähettyviltä.

### **Lapset ja nuoret**

Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten ei pidä käyttää Lamisil-sumutetta.

### **Muut lääkevalmisteet ja Lamisil-sumute**

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Älä käytä hoidettavalla alueella muita lääkkeitä tai hoitoja (myöskään ilman reseptiä saatavia itsehoitovalmisteita) samaan aikaan Lamisil-sumutteen kanssa.

### **Raskaus ja imetyks**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lamisil-sumutetta ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeellista.

Lääkeainetta saattaa kulkeutua rintamaitoon. Jos imetät, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä päästä imeväisiä kosketukseen Lamisililla hoidetun ihoalueen kanssa, rintojen iho mukaan lukien.

### **Ajamineen ja koneiden käyttö**

Lamisil-sumutteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita.

### **Lamisil-sumute sisältää 96 %:sta etanolia**

Tämä lääkevalmiste sisältää 250 mg/g 96 %-sta etanolia.  
Saattaa aiheuttaa polttelua vahingoittuneilla ihoalueilla.

### **Lamisil-sumute sisältää propyleeniglykolia**

Tämä lääkevalmiste sisältää 50 mg/g propyleeniglykolia.

## **3. Miten Lamisil-sumutetta käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

**Sumuta Lamisil-sumutetta hoide ttavalle ihoalueelle kerran tai kaksi kertaa päivässä viikon ajan seuraavasti.**

### **Käyttöohjeet**

#### **Vain aikuiset**

- Puhdistaa ja kuivata hoidettava ja sitä ympäröivä ihoalue ja pese kädet.
- Poista sumutepullon korkki.
- Paina ennen ensimmäistä käyttökertaa sumutepullon pumppua muutaman kerran, jotta saat tasaisen sumutteen.
- Sumuta riittävästi liuosta, jotta hoidettava ihoalue ja sitä ympäröivä iho kostuvat kauttaaltaan. Voit pitää pulloa pystyasennossa tai ylösalaisin saadaksesi sumutteen helpommin hoidettavalle ihoalueelle.
- Kierrä korkki takaisin pulloon.
- Pese kädet liuoksen sumuttamisen sen jälkeen, kun olet koskenut hoidettavaan ihoalueeseen, jotta et levitä tartuntaa itseesi tai muihin ihmisiin.

Jos hoidat ihopoimussa sijaitsevaa infektiota, voit peittää hoidetun alueen sideharsolla, etenkin yön ajaksi. Jos peität alueen sideharsolla, vaihda siihen uusi sideharso aina valmisten levittämisen yhteydessä.

### **Miten usein ja kuinka kauan Lamisil-sumutetta käytetään**

Sumuta sumutetta hoidettavalle ihoalueelle kerran tai kaksi kertaa päivässä, kuten alla on mainittu, ellei lääkäri ole antanut sinulle toisenlaisia ohjeita:

- **jalkasilsa:** kerran päivässä viikon ajan
- **nivus- ja vartalosilsa:** kerran päivässä viikon ajan
- **savipuoli (*Pityriasis versicolor* -hiivasieni-infektio):** kaksi kertaa päivässä viikon ajan.

Käytä valmistetta suositellun hoitojakson ajan, vaikka oireet häviäisivät muutamassa päivässä. Sieni-infektio näyttää paranevan muutaman päivän jälkeen, mutta saattaa uusiutua jos valmistetta ei käytetä säännöllisesti tai hoito lopetetaan liian aikaisin.

Valmisten pitäisi alkaa helpottaa oireita muutamassa päivässä.

**Jos et havaitse paraneista viikon kuluessa Lamisil-hoidon lopettamisen jälkeen,** ota yhteyttä apteekkikenkilökuntaan varmistaaksesi että olet käyttänyt valmistetta oikein, tai lääkäriin oikean diagnoosin varmistamiseksi.

**Hävitä jäljellä mahdollisesti oleva sumuteliuos** 12 viikon kuluttua pullon ensimmäisen avaamisen jälkeen.

### **Hoitoa edistäviä tekijöitä**

Pidä hoidettava ihoalue puhtaana pesemällä se säännöllisesti. Kuivaa ihoalue hyvin, mutta älä hankaa sitä vaan taputtele kevyesti. Vaikka iho saattaa kutista, yritä olla raapimatta sitä, koska sitä voi aiheuttaa lisähaittaa ja se voi hidastaa paranemista tai levittää infektiota.

Käytä omaa pyyhettä ja omia vaatteitasi äläkä anna toisten käyttää niitä, koska tällaiset infektiot voivat tarttua helposti. Pese vaatteesi ja pyyhkeesi usein vältyäksesi infektion uusiutumiselta.

### **Jos unohdat käyttää Lamisil-sumutetta**

Jos unohdat sumuttaa liuosta, sumuta sitä iholle mahdollisimman pian ja jatka sitten hoitoa normaaliiin tapaan. Jos muistat vasta, kun on aika sumuttaa seuraava annos iholle, sumuta liuosta tavanomainen määrä ja jatka hoitoa sitten tavanomaiseen tapaan. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen kerta-annoksen.

Käytä sumutetta käyttöohjeen mukaisesti. Tämä on tärkeää, koska hoitokertojen poisjääminen suurentaa infektion uusiutumisriskiä.

### **Jos vahingossa nielet valmisten**

Käännyn heti lääkärin puoleen, jotta saat toimintaohjeet. Valmisten sisältämä alkoholi tulee ottaa huomioon.

### **Jos valmistetta pääsee vahingossa silmiin**

Huuhtelee silmät huolellisesti juoksevalla vedellä. Mene lääkäriin, jos epämiellyttävät tuntemukset silmissä jatkuvat.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käännyn lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.

#### **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut henkilöt saattavat olla allergisia Lamisil-sumutteelle, mikä voi aiheuttaa turvotusta ja kipua, ihottumaa tai nokkosihottumaa. Näitä on raportoitu, mutta näiden *esiintymistäajuus on tuntematona* (*yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella*).

Jos sinulla on näitä oireita, lopeta Lamisil-sumutteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin välittömästi.

##### **Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu**

**Yleiset haittavaikutukset** (*voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä*):  
Hoidetun alueen ihmisen hilseily ja kutina.

**Melko harvinaiset haittavaikutukset** (*voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta*):  
Ihovauriot, rupimuodostus, iho-oireet, ihmisen värin muutokset, punaisuus, polttelu, kipu tai ärsytys hoidetulla ihoalueella.

**Harvinaiset haittavaikutukset** (*voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta*):  
Ihmisen kuivuminen, ekseema, oireiden paheneminen, kosketusihottuma (eräänlainen ihotulehdus).

Jos Lamisil-sumutetta on vahingossa joutunut silmiin, silmien ärsytystä voi esiintyä.

**Esiintymistäajuuden tunte mottomat haittavaikutukset** (*yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella*):  
Ihottuma.

##### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienhenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

#### **5. Lamisil-sumutteen säilyttäminen**

##### **Ei lasten ulottuville eikä näkyville.**

Älä käytä tästä lääkettä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätä.

Kierrä pullon korkki kiinni käytön jälkeen. Hävitä jäljellä mahdollisesti oleva sumuteliuos 12 viikon kuluttua pullon ensimmäisestä avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### Mitä Lamisil-sumute sisältää

- Vaikuttava aine on terbinafiinihydrokloridi. Yksi gramma Lamisil-sumutetta sisältää 10 mg terbinafiinihydrokloridia (1 % w/w).
- Muut aineet ovat puhdistettu vesi, etanol 96 %, propyleeniglykoli (E 1520), makrogolisetostearyylieetteri.

### Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Lamisil-sumute, liuos, on kirkas, väritön tai hieman kellertävä neste.

Lamisil-sumutetta on saatavana 30 ml:n pulloissa, joissa on sumutepumppu.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### Myyntiluvan haltija ja valmistaja

#### Myyntiluvan haltija

Karo Healthcare AB  
Box 16184  
103 24 Stockholm  
Ruotsi

#### Valmistaja

Haleon Denmark ApS  
Delta Park 37  
2665 Vallensbæk Strand, Tanska

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH  
Bahnhofbichl 13  
6391 Fieberbrunn, Austria

Novartis (Hellas) S.A.C.l.  
National Road No 1 (12th km)  
Metamorphosi 14451 Athens, Greece

Novartis Farma S.p.A  
Via Provinciale Schito 131  
800058 Torre Annunziata (NA), Italy

GlaxoSmithKline Santé Grand Public,  
23 Rue Francois Jacob,  
92500 Rueil Malmaison, France

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.  
Site Apollo – Avenue Pascal 2-4-6  
1300 Wavre, Belgium

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmBH & Co. KG  
Barthstraße 4

80339 München, Germany

Haleon Germany GmbH  
Barthstraße 4  
80339 München, Germany

**Tämä pakkausselostet on hyväksytty viimeksi 01.11.2023**

## Bipackse deln: Information till användaren

### Lamisil 1 % kutan spray, lösning

terbinafinhydroklorid

**Läs noga igenom denna bipackse del innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipackse del finns information om följande:**

1. Vad Lamisil spray är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lamisil spray
3. Hur du använder Lamisil spray
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lamisil spray ska förvaras
6. Förfäckningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Lamisil spray är och vad det används för**

Lamisil spray är ett svampmedel som används på huden. Det verkar genom att döda svampen som orsakar hudproblemen.

Lamisil spray används för att behandla:

- fotsvamp (*tinea pedis*)
- hudsvamp (*tinea cruris*)
- ringorm (*tinea corporis*)
- en ytlig jästsvampsinfektion på huden orsakad av *Pityriasis versicolor*.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Lamisil spray**

##### **Använd inte Lamisil spray**

- om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- **Tala om för läkaren eller apotekspersonalen** om detta gäller dig och **använd inte Lamisil spray**.

##### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lamisil spray.

- Endast avsett för utvärtes användning.
- Använd inte i munnen eller svälj inte sprayen
- Använd inte sprayen i ansiktet, i ögonen eller på skadad hud där alkohol kan irriterar huden. Om du av misstag får sprayen i ögonen, skölj dem noga med rinnande vatten. Kontakta läkaren om symtomen fortsätter.
- Andas inte in sprayen.

- Lamisil spray innehåller alkohol. Får inte hanteras nära öppen eld.

### **Barn och ungdomar**

Barn och ungdomar under 18 år får inte använda Lamisil spray.

### **Andra läkemedel och Lamisil spray**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel

- Applicera inte andra mediciner eller behandlingar på det drabbade området (inklusive receptfria medel) samtidigt med Lamisil spray.

### **Graviditet och amning**

- Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Lamisil spray ska inte användas under graviditet om det inte är oundvikligt.
- Detta läkemedel kan passera över i modersmjölk. Om du ammar, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Spädbarnet bör inte komma i kontakt med något behandlat område, inklusive brösten.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Användningen av Lamisil spray påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

### **Lamisil spray innehåller etanol (96 %)**

Detta läkemedel innehåller 250 mg/g etanol (96 %).

Det kan orsaka en bränande känsla på skadad hud.

### **Lamisil spray innehåller propylenglykol**

Detta läkemedel innehåller 50 mg/g propylenglykol.

## **3. Hur du använder Lamisil spray**

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

**Rekommenderad dos är att använda sprayen en eller två gånger dagligen i en veckas tid enligt anvisningarna nedan.**

### **Hur sprayen används**

Endast vuxna

- Rengör och torka det drabbade hudområdet samt det omgivande hudområdet och tvätta sedan händerna.
- Avlägsna korken från sprayflaskan.
- Innan du använder första gången ska du pumpa några gånger så du får en jämn spray.
- Spraya tillräckligt lösning för att grundligt fukta det drabbade hudområdet och den omgivande huden. Du kan hålla flaskan upprätt eller upp och ner för att nå de drabbade områdena bättre.
- Skruva korken tillbaka på flaskan.
- Tvätta händerna efter att du vidrört den infekterade huden, så du inte sprider infektionen till dig själv eller till andra människor.

Om du behandlar en infektion i hudveck kan du täcka det behandlade området med gasbinda, särskilt på natten. Om du gör det, byt och använd en ny ren gasremsa varje gång du applicerar produkten.

## **Hur ofta och hur länge ska Lamisil spray användas**

Använd sprayen en eller två gånger dagligen på det drabbade området enligt anvisningarna nedan om inte läkaren har föreskrivit något annat:

- **fotsvamp:** använd en gång dagligen under en vecka
- **hudsvamp och ringorm:** använd en gång dagligen under en vecka
- **jästs vampa infektion** (*Pityriasis versicolor*): använd två gånger dagligen under en vecka.

Använd produkten under den rekommenderade behandlingsperioden, även om infektionen ser ut att bli bättre inom några dagar. Infektioner ser ofta ut att förbättras efter några dagar, men kan återkomma om produkten inte används regelbundet eller om behandlingen avbryts för tidigt.

Produkten bör börja förbättra din hud inom några dagar.

**Om du inte märker några tecken på förbättring inom en vecka** efter avslutad behandling med Lamisil spray, rådfråga apotekspersonal för att säkerställa att produkten används på rätt sätt eller kontakta läkare för att bekräfta rätt diagnos.

**Oanvänd spray ska kasseras** senast 12 veckor efter första öppnandet.

### **För en lyckad behandling**

Håll det drabbade hudområdet rent genom att tvätta det regelbundet. Klappa huden torr omsorgsfullt men utan att gnugga. Även om huden kan klia, försök låta bli att skrapa eftersom det kan orsaka mera skada och födröja tillfriskningsprocessen eller sprida infektionen.

Använd separata handdukar och dina egna kläder och dela dem inte med andra eftersom infektionerna enkelt kan sprida sig. Tvätta dina kläder och handdukar ofta för att skydda dig själv mot att bli återsmittad.

### **Om du har glömt att använda Lamisil spray**

Om du glömmer att använda sprayen, gör det då genast när du märker det och fortsätt sedan som normalt. Om du märker det vid tiden för ditt nästa behandlingstillfälle, spraya då en normal mängd och fortsätt behandlingen som vanligt. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Använd sprayen enligt anvisningarna. Detta är viktigt, eftersom uteblivna behandlingstillfällen ökar risken för att infektionen återkommer.

### **Om du av missstag sväljer av produkten**

Kontakta omedelbart en läkare som kan ge råd om vad du ska göra. Det är viktigt att beakta att produkten innehåller alkohol.

### **Om du av missstag får produkten i ögonen**

Skölj ögonen omsorgsfullt med rinnande vatten. Uppsök läkare om du fortfarande har besvär efter det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa personer kan vara allergiska mot Lamisil spray, vilket kan orsaka svullnad och smärta, hudutslag eller nässelutsalg. Detta har rapporterats, men förekomstfrekvensen är okänd (*kan inte beräknas från tillgängliga data*).

Sluta använda Lamisil sprayen och kontakta läkare omedelbart om något av dessa symtom förekommer.

#### **Också följande biverkningar har rapporterats:**

**Vanliga biverkningar** (*kan förekomma högst hos en användare av 10*)  
Hudfjällning och klåda vid appliceringsstället.

**Mindre vanliga biverkningar** (*kan förekomma högst hos en användare av 100*)  
Skador på huden, skorv, hudsymtom, förändringar i hudens färg, hudrodnad, brännande känsla på huden, smärta eller irritation vid appliceringsstället.

**Sällsynta biverkningar** (*kan förekomma högst hos en användare av 1 000*)  
Torr hud, eksem, försvårade symtom, kontakteksem (en typ av hudinflammation).

Om du av misstag får Lamisil spray i ögonen kan irritation inträffa.

**Biverkningar med okänd förekomstfrekvens** (*kan inte beräknas från tillgängliga data*)  
Utslag.

#### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

## **5. Hur Lamisil spray ska förvaras**

### **Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.**

Använts före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter (Utg.dat.) Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Tillslut flaskan efter användning. Oanvänt spray ska kasseras senast 12 veckor efter första öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid. Ett gram Lamisil spray innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid (1 % w/w)
- Övriga innehållsämnen är renat vatten, etanol 96 %, propylenglykol (E 1520), makrogolcetostearylter.

### **Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar**

Lamisil kutan spray, lösning är en klar, färglös eller svagt gulaktig lösning.

Lamisil spray, lösning finns tillgängligt i 30 ml flaska med spraypump.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

#### Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige

#### Tillverkare

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand, Danmark

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH

Bahnhofbichl 13

6391 Fieberbrunn, Austria

Novartis (Hellas) S.A.C.l.

National Road No 1 (12th km)

Metamorphosi 14451 Athens, Greece

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

800058 Torre Annunziata (NA), Italy

GlaxoSmithKline Santé Grand Public,

23 Rue Francois Jacob,

92500 Rueil Malmaison, France

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.

Site Apollo – Avenue Pascal 2-4-6

1300 Wavre, Belgium

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmBH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München, Germany

Haleon Germany GmbH

Barthstraße 4

80339 München, Germany

**Denna bipackse del ändrades senast 01.11.2023**