

Pakkausseloste : Tietoa käyttäjälle

Viscotears 2 mg/g silmägeeli

Karbomeeri

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännä lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Viscotears on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Viscotearsia
3. Miten Viscotearsia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Viscotearin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Viscotears on ja mihin sitä käytetään

Viscotears-silmägeeli sisältää vaikuttavana aineena karbomeeriä, joka toimii luonnollisen kynnelnesteen korvikkeena kuivissa silmissä. Se kostuttaa silmiä ja muodostaa silmän pintaa suojaavaa kalvoa jopa kuuden tunnin ajan.

Viscotears-silmägeeli on saatavissa ilman lääkemääräystä.

Karbomeeriä, jota Viscotears sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Viscotearia

Älä käytä Viscotears-silmägeeliä

- jos olet allerginen karbomeerille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoime

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Viscotears-silmägeeliä.

Jos kärsit silmäkivusta, näkökyvyn muutoksista, silmien ärsytyksestä, jatkuvasta silmien punaisuudesta tai jos tilasi pahentuu tai ei häviä, lopeta käyttö ja käännä lääkärin puoleen.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity, jotta voidaan varmistua ettei oireiden taustalla ole jokin muu lääkärin hoitoa vaativaa sairaus.

Jos käytät muita lääkeitä, lue myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Viscotears”.

Lapset ja enintään 18-vuotiaat nuoret

Aikuisille suositellun Viscotears-annostuksen turvallisuus ja teho lapsilla ja nuorilla on arvioitu klinisen kokemuksen perusteella. Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Viscotears

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetyksessä

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Viscotears-silmägeeliä voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Jos näkösi sumentuu hetkellisesti Viscotears-silmägeelin käyttämisen jälkeen, älä lähde ajamaan tai käytä koneita, ennen kuin näkösi on palautunut normaaliksi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana.

Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Viscotears sisältää setrimidiä

Jos käytät piilolinssejä:

Ota piilolinssit (kovat tai pehmeät) silmistä ennen kuin käytät Viscotearsia ja odota vähintään 15 minuuttia ennen kuin laitat piilolinssit uudelleen silmiin.

Viscotears sisältää säilytyssainetta (setrimidiä), joka voi aiheuttaa silmä-ärsytystä ja jonka tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien väryjäytymistä. Vältä kosketusta pehmeiden piilolinssien kanssa.

3. Miten Viscotearsia käytetään

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta on määritellyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on

Yksi tippa kumpaankin silmään 3-4 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan.

Käytä Viscotears-silmägeeliä vain silmään/silmiihin.

Lapset ja enintään 18-vuotiaat nuoret

Aikuisille suositellun Viscotears-annostuksen turvallisuus ja teho lapsilla ja nuorilla on arvioitu klinisen kokemuksen perusteella. Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla.

Viscotears-silmägeelin käyttöohje

1. Ota Viscotears-tuubi esille.
2. Pese kätesi ja istu peilin eteen, jos vain mahdollista.
3. Kierrä tuubin korkki auki.
4. Taivuta päättäsi taaksepäin ja vedä alaluomea puhtaalla sormella alaspäin.
5. Vie tuubin kärki lähelle silmää. Käytä tarvittaessa peiliä apuna.
6. Älä kosketa tuubin kärjellä silmää, silmäluomea, silmää ympäröiviä alueita tai muita pintoja, jotta tuubissa olevaan geeliin ei pääse epäpuhtauksia.
7. Pidä tuubia pystysuorassa niin, että kärki osoittaa alas (katso kuva). Näin kärkeen muodostuu pieni tippa, joka tippuu silmääsi (alaluomen ja silmämunan välisiin).
8. Jos käytät Viscotearsia toiseenkin silmään, toista vaiheet 4–7 toiselle silmälle.
9. Sulje tuubi heti käytön jälkeen.




Jos tippa ei osu silmään, tiputa uusi tippa.

Jos käytät muita silmätippoja, -voiteita tai -lääkeitä, odota kunkin valmisteen käytön jälkeen vähintään 5 minuuttia ennen toisen valmisteen käyttöä. Silmävoiteet ja -geelit (Viscotears) on annosteltava viimeiseksi.

Jos käytät enemmän Viscotears-silmägeeliä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut läkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisähjeiden saamiseksi.

Haittavaikutuksia ei ole odotettavissa tavanomaista suuremman Viscotears-annoksen käytöstä.



Jos unohdat käyttää Viscotearsia

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos seuraavan annoksen aika on pian, jätä seuraava annos väliin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan nütä saa.

Silmissäsi voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä):
näön hämärtyminen.

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):
epämukava tunne silmässä, silmäluomen reunan karstoittuminen, silmän ärsytyks.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):
silmän turvotus, silmäkipu, kutiseva silmä, punertava silmä, lisääntynyt kyynerterys.

Seuraava on mahdollinen haittavaikutus kehon muissa osissa:
Melko harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta): ihotulehdus.

Lääkkeen markkinoille tulon jälkeen on lisäksi ilmoitettu seuraava haittavaikutus, mutta sen yleisyyss on tuntumaton:
allergia (yliherkkyyys).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alta). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Viscotearin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Hävitä pullo 4 viikkoa avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Viscotears sisältää

- Vaikuttava aine on karbomeeri. Yksi gramma geeliä sisältää 2 mg karbomeeria.
- Muut aineet ovat setrimidi (säilytysaine), natriumhydroksidi (pH:n säätämistä varten), sorbitoli (E420) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot

Viscotears on kirkas, väritön geeli, joka toimitetaan 10 g:n tuubeissa.
Pakkauskoko: 1 x 10 g ja 3 x 10 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
Berlin
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.03.2017

Bipacksedel: Information till användaren

Viscotears 2 mg/g ögongel

Karbomer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I den här bipacksedeln finns information om följande:

1. Vad Viscotears är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Viscotears
3. Hur du använder Viscotears
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Viscotears ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Viscotears är och vad det används för

Viscotears innehåller den aktiva substansen karbomer som ersätter tårvätskan vid fall av torra ögon. Viscotears fuktar ögonen och bildar en skyddande film, som kan kvarstå i upp till 6 timmar.

Viscotears är receptfritt.

Karbomer som finns i Viscotears kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Viscotears

Använd inte Viscotears ögongel

- om du är allergisk (överkänslig) mot karbomer eller något annat innehållsstämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Viscotears.

Om du får ont i ögonen, synförändringar, irritation i ögonen, röda ögon (som inte går över) eller om tillståndet förvärras eller inte går över, ska du sluta använda Viscotears och rådfråga din läkare.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras, så han/hon kan säkerställa att ingen annan sjukdom som kräver behandling ligger bakom symtomen.

Om du tar andra läkemedel bör du även läsa avsnittet ”Andra läkemedel och Viscotears”.

Barn och ungdomar upp till 18 års ålder

Säkerhet och effekt vid användning av Viscotears till barn och ungdomar, med samma dosering som rekommenderas till vuxna, har faststälts genom klinisk erfarenhet, men inga data från kliniska studier finns tillgängliga.

Andra läkemedel och Viscotears

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Viscotears kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du får tillfällig dimsyn efter att ha använt Viscotears bör du inte köra bil eller använda maskiner förrän synen har klarnat.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viscotears inne håller cetrizid

Om du använder kontaktlinser:

Ta ut kontaktlinserna (hårda eller mjuka) innan du använder Viscotears och vänta i minst 15 minuter inna du sätter in linserna igen.

Viscotears innehåller ett konserveringsmedel (cetrizid) som kan orsaka ögonirritation och som missfärgar mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.

3. Hur du använder Viscotears

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är

1 droppe 3–4 gånger dagligen i varje öga eller efter behov.

Viscotears ska bara användas för att droppa i ögonen.

Barn och ungdomar upp till 18 års ålder

Säkerhet och effekt vid användning av Viscotears till barn och ungdomar, med samma dosering som rekommenderas till vuxna, har faststälts genom klinisk erfarenhet, men inga data från kliniska studier finns tillgängliga.

Så här använder du Viscotears på rätt sätt

1. Ta fram tuben med Viscotears.
2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel, om möjligt.
3. Skruva av hatten på tuben.
4. Luta huvudet bakåt och dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger.
5. Håll spetsen på tuben nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.
6. Undvik att låta tubspetsen röra vid ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller något annat. Det kan förörena gelen i tuben.

7. Håll tuben lodrätt med spetsen nedåt (se bilden). Då rinner det ut en liten droppe i spetsen som du sedan droppar i ögat (i mellanrummet mellan det undre ögonlocket och ögat).
8. Om du använder Viscotears i båda ögonen upprepar du steg 4–7 för det andra ögat.
9. Skruva på hatten på tuben så snart du är klar.



Om滴en missar ögat prövar du igen.

Om du använder andra ögondroppar, ögonsalva eller ögonläkemedel i gelform ska du vänta i minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor och geler (Viscotears) ska användas sist.

Om du har använt för stor mängd av Viscotears

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Inga oönskade effekter förväntas vid användning av en större dos än vanligt av Viscotears.

Om du har glömt att använda Viscotears

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos kan du hoppa över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Viscotears orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du kan få följande reaktioner i dina ögon:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):
Dimsyn.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
Obehag i ögonen, skorpbildning i ögonlockskanterna, ögonirritation.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
Svullna ögon, smärta i ögonen, klåda i ögonen, röda ögon, ökad tårproduktion.

Eller reaktioner i andra delar av kroppen:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
Hudinflammation.

Ytterligare biverkningar med okänd frekvens som har rapporterats efter godkännandet för försäljning:

Allergi (överkänslighet).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

5. Hur Viscotears ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel kräver inga särskilda temperaturvillkor vid förvaring.

Använts före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Kassera tuben 4 veckor efter öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är karbomer. Varje gram gel innehåller 2 mg karbomer.
- Övriga innehållsstoffen är cetrimid (konserveringsmedel), natriumhydroxid (för pH-justering), sorbitol (E420) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Viscotears är en klar, färglös gel som tillhandahålls i tuber om 10 g.

Förpackningsstorlek: 1 x 10 g och 3 x 10 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH

Berlin

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 13.03.2017