

## **Pakkausseloste: Tietoa potilaalle**

### **Oxytocin Orifarm 5 IU, injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten oksisosiini**

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

#### **Tässä pakkausselosteessa kerrotaan**

1. Mitä Oxytocin Orifarmon ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oxytocin Orifarm -valmistetta
3. Miten Oxytocin Orifarm -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Oxytocin Orifarm -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Oxytocin Orifarm on ja mihin sitä käytetään**

1 ml Oxytocin Orifarm -liuosta sisältää 5 IU (8,3 mikrogrammaa) oksitosiinia. Oxytocin Orifarm on hormoni, joka saa kohdun lihakset supistumaan

Oxytocin Orifarm -valmistetta voidaan käyttää synnytyksen käynnistämiseen, synnytyksen aikaisten supistusten helpottamiseen, synnytyksen jälkeisen verenvuodon hoitoon, sekä keisarileikkauksen aikana.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Oxytocin Orifarm -valmistetta**

##### **Älä käytä Oxytocin Orifarm -valmistetta:**

- jos olet allerginen oksitosiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on epätavallisen voimakkaita kohdun lihassupistuksia
- jos sinun on vältettävä spontaania synnytystä tai alatiesynnytystä
- jos olet saanut prostaglandiinilääkkeitä (joita käytetään synnytyksen käynnistämiseen tai mahahaavan hoitoon). Oksitosiinia ei tulisi käyttää 6 tunnin kuluessa emättimeen annettavan prostaglandiinin antamisen jälkeen, koska muuten näiden kummankin lääkkeen vaikutus voi vahvistua.

##### **Varoitukset ja varotoimet**

Terveystieteiden ammattilaisen on annettava Oxytocin Orifarm -valmiste sairaalassa.

##### **Älä käytä Oxytocin Orifarm -valmistetta pitkään:**

- jos lääke ei vaikuta sinuun
- jos sinulla on vakava pre-eklampsia eli raskausmyrkytys (24. raskausviikon jälkeen mahdollisesti ilmaantuva sairaus, jonka oireita ovat korkea verenpaine, valkuainen virtsassa ja turvotus)
- jos sinulla on vakavia sydän- tai verenkierto-ongelmia.

##### **Käytä Oxytocin Orifarm -valmistetta varoen:**

- jos sinulle on aiemmin tehty keisarileikkaus

- jos olet yli 35-vuotias
- jos sinulla on lievästi tai keskivaikeasti kohonnut verenpaine tai lieviä tai keskivaikeita sydänongelmia (esim. pitkä QT -oireyhtymä tai vastaavia oireita)
- jos käytät lääkkeitä, joiden tiedetään pidentävän QT-aikaa
- jos normaali synnytys voi olla sinulle vaikea lantiosi pienen koon vuoksi

Oxytocin Orifarm -valmistetta ei pidä antaa samanaikaisesti oksitosiinia sisältävän nenäsuihkeen kanssa.

#### *Lateksiallergia*

Valmisteen Oxytocin Orifarm vaikuttava aine voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion (anafylaksian) potilaille, joilla on lateksiallergia. Kerro lääkärille, jos tiedät olevasi allerginen lateksille.

#### **Muut lääkevalmisteet ja Oxytocin Orifarm**

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Seuraavat lääkkeet saattavat vaikuttaa Oxytocin Orifarm -valmisteseen:

- prostaglandiinit (käytetään synnytyksen käynnistämiseen tai mahahaavan hoitoon), sillä kummankin lääkkeen vaikutus voi tehostua;
- anesteetit (käytetään nukuttamiseen leikkauksen aikana), esim. syklopropani tai halotaani, sillä niiden käyttö Oxytocin Orifarm -valmisteen kanssa voi aiheuttaa sydämen sykkeeseen liittyviä ongelmia;
- lääkkeet, joiden tiedetään aiheuttavan pitkä QT -oireyhtymää (sydämen rytmihäiriöitä);
- epiduraalipuudutteet (käytetään kivunlievitykseen synnytyksen aikana). Oxytocin Orifarm saattaa tehostaa näiden lääkkeiden verisuonia supistavaa vaikutusta ja aiheuttaa verenpaineen nousua.

#### **Oxytocin Orifarm ruuan ja juoman kanssa**

Sinua saatetaan kehottaa juomaan mahdollisimman vähän.

#### **Raskaus ja imetys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

#### *Raskaus*

Oxytocin Orifarm saattaa käynnistää synnytyksen – sitä tulisi käyttää raskauden aikana vain lääkärin valvonnassa.

#### *Imetys*

Oxytocin Orifarm -valmisteesta ei ole vaaraa imetettävälle vastasyntyneelle.

#### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Oxytocin Orifarm saattaa käynnistää synnytyksen, minkä vuoksi ajamiseen ja koneiden käyttöön on suhtauduttava varovasti.

#### **Oxytocin Orifarm sisältää natriumia**

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per ampulli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

### **3. Miten Oxytocin Orifarm -valmistetta käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

#### *Suositteltu annos on*

Oxytocin Orifarm laimennetaan yleensä ennen käyttöä ja annetaan laskimoinfuusiona (tippana) johonkin laskimoosi. Annostus riippuu siitä, miten reagoit lääkkeeseen.

**Laskimonsisäisen infuusion valmistelemiseksi lääkäri voi käyttää puoli annosta Oxytocin Orifarm 16,7 mikrog/ml konsentraattia injektio-/infuusioliuosta varten.**

Sopivaa annostusta seurataan tarkasti ja muutetaan tarvittaessa lääkkeen vaikutuksen mukaan.

**Jos käytät enemmän Oxytocin Orifarm -valmistetta kuin sinun pitäisi**

Koska tämä lääke annetaan sinulle sairaalassa, yliannostuksen saaminen on hyvin epätodennäköistä. Jos joku saa tätä lääkettä vahingossa, kerro siitä heti sairaalan ensiapuun tai lääkärille. Oxytocin Orifarm -valmisteen yliannostus voi:

- vahingoittaa vauvaasi;
- aiheuttaa hyvin voimakasta kohdun supistelua;
- vahingoittaa kohtuasi, kohdun repeäminen mukaan lukien.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

#### **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

**Vakavat haittavaikutukset:**

**Äitiin kohdistuvat haittavaikutukset:**

**Harvinaiset haittavaikutukset** (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- Ihottuma, vaikea allerginen (anafylaktinen/anafylaktoidinen) reaktio ja hengenahdistus, verenpaineen äkillinen lasku tai sokki.

**Tuntematon** (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- Rintakipu (angina), epäsäännöllinen sydämen syke (EKG:ssa näkyvä QTc-ajan piteneminen), poikkeava veren hyytyminen, verenvuoto ja anemia (disseminoitunut intervaskulaarinen koagulaatio).
- Kohdun lihastonuksen suureneminen.
- Liian voimakkaat tai jatkuvat supistukset, kohdun repeäminen.
- Nesteen kertyminen (vesimyrkytys). Oireita voivat olla päänsärky, anoreksia (ruokahaluttomuus), pahoinvoinnin tunne tai oksentaminen, vatsakipu, velttaus, uneliaisuus, tajuttomuus, tiettyjen kemikaalien pieni pitoisuus veressä (esim. natrium tai kalium), kohtaukset.
- Veren pieni suolapitoisuus.
- Nesteen äkillinen liiallinen kertyminen keuhkoihin, äkillinen lyhytkestoinen kuumuuden tunne koko kehossa.
- Angioedeeman oireet, kuten kasvojen, kielen tai kurkunpään turpoaminen, nielemisvaikeudet tai nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.

**Muut haittavaikutukset:**

**Äitiin kohdistuvat haittavaikutukset:**

**Yleiset haittavaikutukset** (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

- Päänsärky, sydämen syketiheyden nopeutuminen ja hidastuminen, pahoinvointi ja oksentelu.

**Melko harvinaiset haittavaikutukset** (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- Epäsäännöllinen sydämen syke.

**Harvinaiset haittavaikutukset** (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- Ihottuma

**Vauvaan kohdistuvat haittavaikutukset:**

**Tuntematon** (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Liian voimakkaiden supistusten mahdollisia seurauksia:

- Hapenpuute, tukehtuminen ja kuolema.
- Veren pieni suolapitoisuus.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

## **5. Oxytocin Orifarm -valmisteen säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäättyä.

Kestoajan puitteissa Oxytocin Orifarm voidaan ennen käyttöä säilyttää enintään 25 °C:ssa korkeintaan 3 kuukauden ajan. Jos valmistetta ei käytetä tänä aikana, se tulee hävittää. Kun valmiste on otettu pois jääkaappisäilytyksestä, sitä ei enää saa palauttaa takaisin jääkaappiin. Päivämäärä, jolloin valmiste on otettu huoneenlämpöön, tulee merkitä pakkaukseen.

Ensimmäisen avaamisen jälkeen:

Ennen laimentamista: Tuote on käytettävä välittömästi, käyttämätön liuos tulee hävittää.

Laimentamisen jälkeen: Infuusioneste tulee käyttää 24 tunnin kuluessa 25 °C:een lämpötilassa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Oxytocin Orifarm sisältää**

- Vaikuttava aine on oksitosiini
- Muut aineet ovat natriumasetaattitrihydraatti, jäätikkahappo, natriumkloridi, natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen) ja injektionesteisiin käytettävä vesi

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoost**

Väritön, kirkas neste.

5 IU: 1 ml x 10 lasiampulli (läpinäkyvä).  
Ampulleissa on turkoosi värikoodirengas.

## **Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

*Myyntiluvan haltija*  
Orifarm Generics A/S  
Energivej 15  
DK-5260 Odense S  
Tanska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.  
info@orifarm.com

*Valmistaja*  
JSC GRINDEKS  
53 Krustpils St.  
Riga, LV-1057  
Latvia

**Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:**

Tanska, Suomi, Norja: Oxytocin Orifarm

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.11.2024**

-----  
Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

### **TIETOA HOITOALAN AMMATTILAISILLE VALMISTEEN OXYTOCIN ORIFARM INJEKTIO-/INFUUSIOKONSENTRAATTI, LIUOSTA VARTEN KÄYTÖSTÄ JA LAIMENTAMISESTA**

#### **Synnytyksen käynnistäminen:**

Oxytocin Orifarm -valmiste tulisi antaa tippainfuusiona laskimoon tai mieluiten käyttäen nopeussäädettävää suurinopeuksista infuusiopumppua.

**Oxytocin Orifarm -valmistetta saa antaa vain laskimoninfuusiona, ei koskaan subkutaanisena injektiona, intramuskulaarisena injektiona tai bolusinjektiona laskimoon.**

Oksitosiinin antamista ei tulisi aloittaa 6 tunnin kuluessa emättimeen annettavien prostaglandiinien antamisesta. Oxytocin Orifarm -valmiste tulisi antaa tippainfuusiona laskimoon tai mieluiten nopeussäädettävällä infuusiopumpulla. Tippainfuusiossa on suositeltavaa lisätä 5 IU oksitosiinia 500 ml:aan natriumkloridi-infuusio-liuosta, 5 % glukoosi-infuusio-liuosta, Ringer-acetat tai Ringer-liuosta.

Alkuperäinen infuusionopeus: 1–4 mU/min (6–24 ml/tunti, 2–8 tippaa/min). Infuusionopeutta voidaan suurentaa asteittain vähintään 20 minuutin välein (suurentaen nopeutta enintään 1–2 mU/min), kunnes saavutetaan normaalia synnytystä vastaavat supistukset. Jos raskaus on lähes täysiaikainen, tämä saavutetaan usein alle 10 mU/min infuusiolla (60 ml/tunti, 20 tippaa/min).

Suosittelava maksimi-infuusionopeus on 20 mU/min (120 ml/tunti, 40 tippaa/min). Poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa tarvitaan suurempaa nopeutta esimerkiksi kohtuun kuolleen sikiön ollessa kyseessä tai synnytyksen käynnistämiseen raskauden alkuvaiheessa, jolloin kohtu on vähemmän herkkä oksitosiinille, on suositeltavaa käyttää pitoisuudeltaan suurempaa oksitosiiniliuosta, esim. 5 IU 250 ml:ssa.

Jos käytössä on automaattinen infuusiopumppu, jolla annetaan pienempiä nestemääriä kuin tippainfuusiolla, sopiva infuusionesteen konsentraatio on laskettava pumpun valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Supistusten tiheyttä, voimakkuutta ja kestoja sekä sikiön sydämen sykettä on seurattava tarkasti koko infuusion ajan. Kun on saavutettu riittävä kohdun aktiivisuuden taso, infuusionopeutta voidaan usein pienentää.

Jos kohtu on liian aktiivinen ja/tai sikiö joutuu ahdinkotilanteeseen, infuusio on lopetettava välittömästi.

Jos raskaus on täysiaikainen tai lähes täysiaikainen eikä säännöllisiä supistuksia saada alkamaan, kun infuusiona annettu määrä on yhteensä 5 IU, synnytyksen käynnistysyritys on suositeltavaa lopettaa. Hoitoa voidaan jatkaa seuraavana päivänä siten, että se aloitetaan uudelleen nopeudella 1–4 mU/min.

#### **Epätäydellinen, alkava tai keskeytynyt keskenmeno:**

5 IU laskimoinfuusiona (5 IU fysiologiseen elektrolyyttiliuokseen laimennettuna ja tippainfuusiona annettuna tai mieluummin käyttämällä suurinopeuksista infuusiopumppua 5 minuutin ajan) tai 5–10 IU intramuskulaarisesti, minkä jälkeen laskimoninfuusio nopeudella 20–40 mU/min.

#### **Keisarileikkaus:**

5 IU laskimoinfuusiona (5 IU natriumkloridi-infuusio-liuokseen, 5 % glukoosi-infuusio-liuokseen, Ringer-acetat tai Ringer-liuokseen laimennettuna ja tippainfuusiona annettuna tai mieluummin käyttämällä nopeussäädettävää, suurinopeuksista infuusiopumppua 5 minuutin ajan) heti synnyttämisen jälkeen.

#### **Synnytyksen jälkeisen kohtuverenvuodon ehkäiseminen:**

Tavanomainen annos on 5 IU laskimoinfuusiona (5 IU natriumkloridi-infuusio-liuokseen, 5 % glukoosi-infuusio-liuokseen, Ringer-acetat tai Ringer-liuokseen laimennettuna ja tippainfuusiona annettuna tai mieluummin käyttämällä nopeussäädettävää, suurinopeuksista infuusiopumppua 5 minuutin ajan) tai 5-10 IU lihakseen heti istukan synnyttämisen jälkeen. Jos naista hoidetaan Oxytocin Orifarm -valmisteella synnytyksen käynnistämiseksi tai edistämiseksi, infuusiota on jatkettava tavanomaista suuremmalla nopeudella synnytyksen kolmannessa vaiheessa ja pari tuntia synnytyksen jälkeen.

#### **Synnytyksen jälkeisen kohtuverenvuodon hoitaminen:**

5 IU laskimoinfuusiona (5 IU natriumkloridi-infuusio-liuokseen, 5 % glukoosi-infuusio-liuokseen, Ringer-acetat tai Ringer-liuokseen laimennettuna mieluiten käyttämällä nopeussäädettävää, suurinopeuksista infuusiopumppua 5 minuutin ajan) tai 5-10 IU lihakseen. Vaikeissa tapauksissa annetaan infuusiona liosta, joka sisältää 5–20 IU oksitosiinia 500 ml:ssa elektrolyyttipitoista laimenninta, kohdun atonian hallitsemiseen riittäväällä nopeudella.

## **Bipacksedel: Information till patienten**

### **Oxytocin Orifarm 5 IU, koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning** oxytocin

**Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Oxytocin Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Oxytocin Orifarm
3. Hur du använder Oxytocin Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxytocin Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Oxytocin Orifarm är och vad det används för**

1 ml Oxytocin Orifarm-lösning innehåller 5 IU (8,3 mikrogram) oxytocin. Oxytocin är ett hormon som framkallar sammandragningar i livmoderns glatta muskulatur.

Oxytocin Orifarm används för att sätta igång underlätta sammandragningar under förlossning, för att förhindra och kontrollera blödning efter förlossning och vid kejsarsnitt.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Oxytocin Orifarm**

**Använd inte Oxytocin Orifarm:**

- om du är allergisk mot oxytocin eller mot något av de andra innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om sammandragningarna av livmodern är ovanligt kraftiga
- om du ska undvika förlossningsvärkar eller vaginal förlossning
- om du har fått läkemedel som kallas prostaglandiner (används för att sätta igång förlossning eller för att behandla magsår). Oxytocin får inte användas inom 6 timmar efter vaginala prostaglandiner eftersom effekterna av båda läkemedlen kan öka.

**Varningar och försiktighet**

Oxytocin Orifarm får endast administreras av hälso- och sjukvårdspersonal i sjukhusmiljö.

**Oxytocin Orifarm ska inte användas under någon längre period:**

- om medicinen inte har någon effekt på dig
- om du har ett tillstånd som kallas allvarlig havandeskapsförgiftning (sjukdom som uppträder efter 24:e graviditetsveckan och ger högt blodtryck, protein i urinen och ödem)
- om du har allvarliga problem med hjärtat och blodcirkulationen

**Var försiktig med att använda Oxytocin Orifarm:**

- om du tidigare har gjort kejsarsnitt
- om du är äldre än 35 år

- om du har lindrigt eller måttlig höjt blodtryck eller hjärtproblem (t.ex. "långt QT-syndrom" eller relaterade symtom)
- om du tar läkemedel som är kända för att orsaka förlängt QT-intervall
- om normal förlossning kan vara svår för dig på grund av att du har litet bäcken

Oxytocin Orifarm får inte ges samtidigt med nässpray som innehåller oxytocin.

#### *Latexallergi*

Den aktiva substansen i Oxytocin Orifarm kan orsaka en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) hos patienter med latexallergi. Tala om för din läkare om du vet att du är allergisk mot latex.

#### **Andra läkemedel och Oxytocin Orifarm**

Tala om för din läkare om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Följande mediciner kan påverka Oxytocin Orifarm:

- prostaglandiner (används för att inleda förlossning eller för att behandla magsår) och liknande mediciner, då effekten kan öka för båda dessa läkemedel;
- narkosläkemedel (för sövning vid operation) t. ex. cyklopropan eller halotan, då dessa tillsammans med Oxytocin Orifarm kan orsaka problem med hjärtrytmen;
- Mediciner som är kända för att orsaka rubbningar i hjärtrytmen som kallas "långt QT-syndrom";
- ryggmärgsbedövning (används som smärtlindring vid förlossning). Oxytocin Orifarm kan öka dessa mediciners avsmalnande effekt på blodkärlen och orsaka en ökning av blodtrycket.

#### **Oxytocin Orifarm med mat och dryck**

Du kan bli tillsagd att dricka så lite som möjligt.

#### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

#### *Graviditet*

Oxytocin Orifarm kan starta förlossningsvärkar och ska endast användas under medicinsk uppsikt vid graviditet.

#### *Amning*

Oxytocin Orifarm skadar inte ditt nyfödda barn när du ammar.

#### **Körförmåga och användning av maskiner**

Oxytocin Orifarm kan framkalla förlossningsvärkar, och därför rekommenderas försiktighet vid bilkörning och användning av maskiner.

#### **Oxytocin Orifarm innehåller natrium**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ampull, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

### **3. Hur du använder Oxytocin Orifarm**

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

#### *Rekommenderade dos är*

Oxytocin Orifarm späds vanligen före användning och ges som intravenöst dropp i en ven. Din dos beror på hur du svarar på medicinen.

**För att bereda intravenös infusion kan din läkare använda en halv dos Oxytocin Orifarm 16,7 mikrogram/ml koncentrat som lösning för injektion/infusion.**



Lämplig dosering övervakas noga och justeras vid behov, beroende på effekten av medicinen.

### **Om du har använt för stor mängd av Oxytocin Orifarm**

Då detta läkemedel ges på sjukhus är det osannolikt att du får en överdos. Ges detta läkemedel till någon av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen omedelbart. En överdos av Oxytocin Orifarm kan orsaka:

- skada på barnet;
- mycket kraftiga sammandragningar av livmodern;
- skada på livmodern som kan innefatta bristning.

Om du har ytterligare frågor om hur du använder läkemedlet, kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

### **Allvarliga biverkningar:**

#### **Biverkningar hos modern:**

**Sällsynta biverkningar** (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare)

- Hudutslag, allvarlig allergisk (anafylaktisk/anafylaktoid) reaktion med andnöd, blodtrycksfall eller chock.

**Inga kända** (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- Bröstmärter (angina), oregelbundna hjärtslag (QTc-förlängning som syns på elektrodiagram), onormal blodkoagulation, blödning och anemi (disseminerad intravaskulär koagulation).
- Ökad livmodertonus.
- Överdrivna eller kontinuerliga sammandragningar, bristning i livmodern.
- Vätskeretention (vattenförgiftning). Symtomen kan omfatta huvudvärk, anorexi (aptitförlust), illamående, buksmärter, tröghet, trötthet, medvetlöshet, låg halt av vissa kemikalier i blodet (t.ex. natrium och kalium), kramper.
- Låga blodsalt nivåer.
- Plötslig vätskeöverbelastning i lungorna, plötslig kort känsla av värme ofta över hela kroppen.
- Symtom på angioödem, såsom svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och svårigheter att andas.

### **Andra biverkningar:**

#### **Biverkningar hos modern:**

**Vanliga biverkningar** (förekommer hos upp till 1 av 10 användare)

- Huvudvärk, snabba och långsamma hjärtslag, illamående och kräkningar.

**Mindre vanliga biverkningar** (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)

- Oregelbundna hjärtslag.

**Sällsynta biverkningar** (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare)

- Hudutslag.

#### **Biverkningar hos barnet:**

**Inga kända** (kan inte beräknas från tillgängliga data) \_

Överdrivna sammandragningar kan orsaka:

- Brist på syre, kvävning och död.
- Låga blodsalt nivåer.

## Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55  
00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

## 5. Hur Oxytocin Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas.

Inom hållbarhetstiden kan Oxytocin Orifarm förvaras vid högst 25 °C i upp till 3 månader före användning. Om den inte används under den här tidsperioden måste den kasseras. När produkten har tagits ut ur kylskåp får den inte ställas tillbaka i kylskåp. Det datum då produkten placeras i rumstemperatur ska noteras på förpackningen.

### Efter första öppnandet:

Före spädning: Produkten ska användas omedelbart, oanvänd lösning ska kasseras.

Efter spädning: Infusionsvätskan ska användas inom 24 timmar vid 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är oxytocin
- Övriga innehållsämnen är natriumacetattrihydrat, isättiksyra, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färglös, klar vätska.

5 IU: 1 ml x 10 glasampull (genomskinlig).  
Ampullerna är märkta med en färgad ring – turkos

### Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

*Innehavare av godkännande för försäljning*

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

DK-5260 Odense S

Danmark

*Tillverkare*  
JSC GRINDEKS  
53 Krustpils St.  
Riga, LV-1057  
Lettland

**Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde under namnen:**  
Danmark, Finland, Norge: Oxytocin Orifarm

**Bipacksedeln reviderades senast 13.11.2024**

-----  
Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

## **INFORMATION TILL VÅRDPERSONALN OM ANVÄNDNING OCH SPÄDNING AV OXYTOCIN ORIFARM KONCENTRAT TILL INJEKTIONS-/INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING**

### **Inledning av förlossning:**

Oxytocin Orifarm ska administreras som intravenös (i.v.) droppinfusion eller företrädesvis med hjälp av hög hastighet infusionspump med variabel dropptakt.

**Oxytocin Orifarm får endast administreras som intravenös infusion, aldrig genom subkutan injektion, intramuskulär injektion eller intravenös bolusinjektion.**

Oxytocin får inte användas inom 6 timmar efter administration av vaginala prostaglandiner. Oxytocin ska administreras som intravenös (i.v.) droppinfusion eller företrädesvis med hjälp av infusionspump med variabel dropptakt. För droppinfusion rekommenderas att 5 IU oxytocin tillsätts i 500 ml koksaltlösning för infusion, 5 % glukoslösning för infusion, Ringer-acetat eller Ringer-lösning.

Initial infusionshastighet: 1 till 4 mU/min (6–24 ml/tim, 2–8 droppar/min). Infusionshastigheten kan ökas gradvis med minst 20 minuters intervall (högsta ökningshastighet 1 till 2 mU/min) tills ett sammandragningsmönster som vid normal förlossning har uppnåtts. Vi långt framskriden graviditet kan detta ofta uppnås med infusion av mindre än 10 mU/min (60 ml/tim, 20 droppar/min).

Rekommenderad högsta dropphastighet är 20 mU/min (120 ml/tim, 40 droppar/min). I ovanliga fall när en högre hastighet önskas, vilket kan inträffa vid hantering av intra uterin fosterdöd eller för framkallande av värkar i ett tidigare skede av graviditeten när livmodern är mindre känslig för oxytocin, är det tillrådligt att använda en oxytocinlösning med högre koncentration, t.ex. 5 IU i 250 ml.

Vid användning av motordriven infusionspump som levererar mindre volymer än de som ges genom droppinfusion, måste den lämpliga koncentrationen för infusion beräknas enligt specifikationerna för pumpen.

Frekvensen, styrkan och varaktigheten av sammandragningarna samt fostrets hjärtfrekvens måste övervakas noggrant under infusionen. När tillräcklig grad av aktivitet i livmodern har uppnåtts kan infusionshastigheten ofta minskas.

I händelse av uterin hyperaktivitet och/eller fosternöd måste infusionen avbrytas omedelbart. Om regelbundna sammandragningar hos kvinnor i fullgången eller nästan fullgången tid inte uppnås efter infusion av en total mängd av 5 IU, rekommenderas att upphöra försöken att framkalla förlossning. Behandlingen kan fortsätta nästa dag, återigen inledd med 1–4 MU/min.

**Ofullständigt, oundvikligt eller kvarhållet missfall**

5 IU genom intravenös infusion (5 IU utspätt i fysiologisk elektrolytlösning och administrerat som droppinfusion eller företrädesvis med hjälp av infusionspump i 5 minuter) eller 5–10 IU intramuskulärt följt av intravenös infusion med en hastighet av 20–40 mU/min.

**Vid kejsarsnitt:**

5 IU genom intravenös infusion (5 IU utspätt i koksaltlösning för infusion, 5 % glukoslösning för infusion, Ringer-acetat eller Ringer-lösning och administrerat som intravenös droppinfusion eller företrädesvis med hjälp av hög hastighet infusionspump i 5 minuter) omedelbart efter förlossningen.

**Förebyggande av livmoderblödning efter förlossning:**

Normal dos är 5 IU genom intravenös infusion (5 IU utspätt i koksaltlösning för infusion, 5 % glukoslösning för infusion, Ringer-acetat eller Ringer-lösning och administrerat som intravenös droppinfusion eller företrädesvis med hjälp av hög hastighet infusionspump i 5 minuter) eller 5-10 IU i.m. omedelbart efter placentaavgången. Hos kvinnor som behandlats med Oxytocin Orifarm för framkallande eller förstärkning av förlossningsvärkar ska infusionen fortsätta i ökande takt under den tredje fasen av förlossningen och i några timmar därefter.

**Behandling av livmoderblödning efter förlossning:**

5 IU genom intravenös infusion (5 IU utspätt i koksaltlösning för infusion, 5 % glukoslösning för infusion, Ringer-acetat eller Ringer-lösning eller företrädesvis med hjälp av infusionspump med variabel dropptakt i 5 minuter) eller 5-10 IU i.m. I allvarliga fall genom intravenös infusion av en lösning som innehåller 5 till 20 IU oxytocin i 500 ml av en spädningslösning med elektrolyter, administrerat i en takt som är tillräcklig för att kontrollera uterin atoni.