

Pakkausseloste: Tie toa potilaalle

Ivermectine ratiopharm 3 mg tabletti ivermektiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käytöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro näistä lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Ivermectine ratiopharm on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ivermectine ratiopharm -valmistetta
3. Miten Ivermectine ratiopharm -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Ivermectine ratiopharm -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Ivermectine ratiopharm on ja mielin sitä käytetään

Ivermectine ratiopharm sisältää lääkeaineen nimeltä ivermektiini. Tätä lääkettä käytetään tiettyjen loisten (parasiittien) aiheuttamien infektioiden hoitoon.

Ivermectine ratiopharm -lääke on tarkoitettu seuraavien infektioiden hoitoon:

- suolistoinfektioiden nimeltä suoliston strongyloidiaasi (strongyloides-infektieli eli anguilluloosi). Tämän taudin aiheuttaa *Strongyloides stercoralis* -sukkulamato.
- veressä oleva infektioiden nimeltä mikrofilaremia, joka johtuu lymfaattisesta filariaasista. Tämän taudin aiheuttaa kypsymätön *Wuchereria bancrofti* -mato. Ivermectine ratiopharm ei tehoa täysikasvuisiin matoihin, ainoastaan vielä kypsymättömiin matoihin.
- syyhy. Syyhyssä pienet syyhypunkit kaivautuvat ihmisen alle, mikä voi aiheuttaa vaikeaa kutinaa. Ivermectine ratiopharm -valmistetta saa käyttää vain, kun lääkäri on todennut syyyn tai epäilee sitä.

Ivermectine ratiopharm ei kykene estämään sinua saamaan edellä mainittuja tartuntoja. Se ei myöskään tehoa täysikasvuisiin matoihin. Ivermectine ratiopharm -valmistetta tulee käyttää vain, jos lääkäri on todennut, tai hän epäilee sinulla olevan käyttöaiheisiin kuuluva loistartunta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ivermectine ratiopharm -valmistetta

Älä käytä Ivermectine ratiopharm -valmistetta

- jos olet allerginen ivermektiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Lääkkeen aiheuttamaan allergiseen reaktioon voi liittyä esim. ihottumaa, hengitysvaikeuksia tai kuumetta.
- jos sinulla on joskus esiintynyt vaikeaa ihottumaa tai ihmisen kuoriutumista, rakkuloita ja/tai suun haavaumia ivermektiinin ottamisen jälkeen.

Älä otta Ivermectine ratiopharm -valmistetta, jos edellä mainittu koskee sinua. Jos olet epävarma, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen ennen Ivermectine ratiopharm -valmisteen käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ivermectine ratiopharm -valmistetta.

On erityisen tärkeää, että keskustelet lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos:

- elimistösi puolustusjärjestelmä (immuunipuolustus) on heikko
- asut tai olet viettänyt aikaa sellaisissa Afrikan maissa, joissa ihmisiillä esintyy "*Loa loa*" - filariamadon (kutsutaan myös silmämadoksi) aiheuttamia infektioita.
- asut tai olet viettänyt aikaa Afrikassa. Samanaikainen dietyylikarbamatsiinisitraatti (DEC) - nimisen lääkkeen käyttö *Onchocerca volvulus* -madon aiheuttaman infektion hoidossa voi johtaa haittavaikutuksiin, jotka voivat joskus olla vakavia.

Jos jokin yllä mainituista koskee sinua (tai olet epävarma asiasta), keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ivermectine ratiopharm -valmistetta.

Ivermektiinihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavista ihoreaktioista, kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymästä ja toksisesta epidermaalisesta nekrolyysistä. Lopeta ivermektiinin käyttö ja hakeudu lääkäriin välittömästi, jos huomaat mitä tahansa oireita, jotka liittyvät kohdassa 4 kuvattuihin vakaviin ihoreaktioihin.

Lapset

Ei tiedetä, onko Ivermectine ratiopharm -valmisteen käyttö alle 15 kg:n painoisille lapsille turvallista.

Muut lääkevalmisteet ja Ivermectine ratiopharm

Kerro lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai aptekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

- Keskustele heti lääkärin kanssa ennen Ivermectine ratiopharm -lääkkeen ottamista, jos olet raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Jos olet raskaana, tätä lääkettä on käytettävä vain, jos se on ehdottomasti tarpeen. Lääkäri tulee päättämään hoidosta yhdessä sinun kanssasi.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen, sillä Ivermectine ratiopharm erittyy rintamaitoon. Lääkäri saattaa päättää aloittaa Ivermectine ratiopharm -hoitosi siinä vaiheessa, kun lapsesi syntymästä on kulunut viikko.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Ivermectine ratiopharm -lääkkeen oton jälkeen voit kokea huimausta, uneliaisuutta, vapinaa tai pyörrytystä. Jos näin käy, sinun ei pidä ajaa autoa tai käyttää työkaluja tai koneita.

3. Miten Ivermectine ratiopharm -valmiste tta käytetään

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt tai apteekkienkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäristä tai aptekista, jos olet epävarma.

Lääkkeenotto

- Ota nämä tabletit suun kautta.
- Alle 6-vuotiaille lapsille tabletit on murskattava ennen nielemistä.
- Ota kaikki lääkärin määräämään kerta-annokseen kuuluvat tabletit yhtä aikaa, veden kera ja tyhjään mahaan. Älä syö mitään kahteen tuntiin ennen eikä jälkeen tablettien oton, sillä ei tiedetä, miten ruoka vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen elimistöösi.

Miten paljon lääkeettä ote taan

Hoito muodostuu yhdestä kerta-annoksesta.

- Ota kaikki lääkärin määräämät tabletit samalla kertaa.
- Annos riippuu sairaudestasi sekä painostasi tai pituudestasi.
- Lääkäri kertoo montako tablettia sinun on otettava.

Suoliston strongyloidiasin (anguilluloosin) hoito

Suositellut annokset ovat:

Potilaan paino (kg)	Annos: 3 mg:n tablettien lukumäärä
15–24	yksi
25–35	kaksi
36–50	kolme
51–65	neljä
66–79	viisi
≥ 80	kuusi

Lymfaattista filariaasia johtuvan, *Wuchereria bancrofti* -madon aiheuttaman mikrofilareian hoito

Suositellut annokset ovat:

Potilaan paino (kg)	Annos, kun hoitoa annetaan 6 kk välein: 3 mg:n tablettien lukumäärä	Annos, kun hoitoa annetaan 12 kk välein: 3 mg:n tablettien lukumäärä
15–25	yksi	kaksi
26–44	kaksi	neljä
45–64	kolme	kuusi
65–84	neljä	kahdeksan

Tämä hoito toistetaan 6 kuukauden tai 12 kuukauden välein.

Vaihtoehtoisesti, ja jos vaakaa ei ole käytössä, ivermektiiniannos voidaan määritää potilaan pituuden perusteella seuraavasti:

Potilaan pituus (cm)	Annos, kun hoitoa annetaan 6 kk välein: 3 mg:n tablettien lukumäärä	Annos, kun hoitoa annetaan 12 kk välein: 3 mg:n tablettien lukumäärä
90–119	yksi	kaksi
120–140	kaksi	neljä
141–158	kolme	kuusi
> 158	neljä	kahdeksan

Syyhyn hoito

- Annos on 200 mikrogrammaa ivermektiiniä painokiloa kohden.

Tämä vastaa:

Potilaan paino (kg)	Annos: 3 mg:n tablettien lukumäärä
15–24	yksi
25–35	kaksi
36–50	kolme
51–65	neljä
66–79	viisi
≥ 80	kuusi

- Hoidon onnistuminen voidaan lopullisesti todeta vasta 4 viikon kuluttua lääkkeen oton jälkeen.
- Lääkäri saattaa päättää antaa sinulle uuden kerta-annoksen 8–15 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Jos koet, että Ivermectine ratiopharm -lääkkeen teho on liian voimakas tai heikko, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

Jos otat enemmän Ivermectine ratiopharm -valmiste tta kuin sinun pitäisi

On tärkeää että otat lääkärin määräämän annoksen. Tajunnan tason laskua, mukaan lukien koomaa on raportoitu potilailla, jotka ovat saaneet ivermektiiniin yliannostuksen.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Ivermectine ratiopharm -lääkkeen

Pyri ottamaan Ivermectine ratiopharm -annoksesi lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset eivät yleensä ole vakavia ja ne kestävät vain vähän aikaa. Haittavaikutukset voivat olla yleisempää henkilöillä, joilla usean eri loisen aiheuttama infektio. Tämä koskee erityisesti henkilötä, joilla on *Loa loa*-matoinfektio. Seuraavia haittavaikutuksia voi ilmetä tämän lääkkeen käytön yhteydessä:

Allergiset reaktiot

Jos saat allergisen reaktion, hakeudu heti lääkäriin. Oireita voivat olla:

- äkillinen kuume
- äkillinen ihoreaktio (kuten ihottuma tai kutina) tai muut vakavat ihoreaktiot
- hengitysvaikeudet.

Hakeudu heti lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin yllä mainituista.

Lopeta ivermektiinin käyttäminen ja hakeudu lääkäriin välittömästi, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista:

- punoittavat läiskät keholla (maalitaulun näköiset tai rengasmaiset läiskät, joiden keskellä saattaa olla rakkuloita); ihmisen kesiminen, haavaumat suussa, nielussa, nenässä, sukuvoileimissä ja silmissä. Näitä vakavia ihottumia voivat edeltää kuume ja flunssankalaiset oireet (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

Muut haittavaikutukset

- maksasairaus (akuutti hepatiitti)
Joidenkin laboratorioarvojen muutokset (makaentsyyymi nousu, veren bilirubiinin nousu, tietyjen veren valkosolujen määärän lisääntyminen)
- verivirtsaus
- Tajunnan tason lasku mukaan lukien kooma.

Alla mainitut haittavaikutukset riippuvat siitä, minkä loistartunnan hoitoon käytät Ivermectine ratiopharm -lääkettä. Haittavaikutuksiin vaikuttaa myös se, onko sinulla muita infektioita.

Henkilöillä, joilla on suoliston strongyloidiaasi (anguilluloosi), voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

- epätavallinen voimattomuus
- ruokahaluttomuus, mahakipu, ummetus tai ripuli
- pahoinvointi tai oksentelu

- uneliaisuus tai huimaus
 - vapina tai tärinä
 - valkosolujen määärän vähenneminen (leukopenia)
 - punasolujen määärän vähenneminen tai verenpunan eli hemoglobiinin vähyyys (anemia).
- Suolen strongyloidiaasin (*anguillulloosin*) yhteydessä ulosteesta voi myös löytyä aikuisia sukkulamatoja.

Henkilöillä, joilla on *Wuchereria bancrofti*n aiheuttama lymfaattisesta filariaasista johtuva mikrofilaremia, voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

- hikoilu tai kuume
- päänsärky
- epätavallinen voimattomuus
- lihaskipu, nivelkipu tai laaja-alainen kipu
- ruokahaluttomuus, pahoinvoindi
- mahakipu (vatsan seudun kipu tai ylävatsakipu)
- yskä tai kurkkukipu
- epämukava tunne hengitettäessä
- matala verenpaine pystyn nostessa tai seisessä – sinulla voi esiintyä huimausta tai pyörrytystä
- vilunväristykset
- heitehuimaus
- kipu tai epämukava tunne kiveksissä.

Henkilöillä, joilla on syyhy, voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

- kutina saattaa pahentua hoidon alussa. Tämä ei yleensä kestä pitkään.

Henkilöillä, joilla on *Loa loa*-madon aiheuttama voimakas infektio, voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

- poikkeava aivotoiminta
- niska- tai selkäkipu
- silmänvalkuisten verenvuoto (punasilma)
- hengästyneisyys
- virtsan tai ulosten karkailu
- vaikeudet seisää tai kävellä
- psyykkisen tilan muutokset
- uneliaisuus tai sekavuus
- reagoimattomuus muihin ihmisiin tai vaipuminen koomaan.

Henkilöillä, joilla on jokisokeutta aiheuttava *Onchocerca volvulus*-madon aiheuttama infektio, voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

- kutina tai ihottuma
- nivel- tai lihaskipu
- kuume
- pahoinvoindi tai oksentelu
- imusolmukkeiden turpoaminen
- turvotus, etenkin kässissä, nilkoissa tai jaloissa
- ripuli
- heitehuimaus
- matala verenpaine (hypotensio). Sinulla voi esiintyä huimausta tai pyörrytystä pystyn nostessa.
- nopea sydämen syke
- päänsärky tai väsymys
- muutokset näkökyvyssä ja muut silmävaivot, kuten infektio, punoitus tai epätavalliset tuntemukset
- silmänvalkuisten verenvuoto tai silmälouomien turvotus
- pahentunut astma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienhenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

5. Ivermectine ratiopharm -valmisten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä kotelossa ja läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän "EXP" jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ivermectine ratiopharm sisältää

- Vaikuttava aine on ivermektiini. Jokainen tabletti sisältää 3 mg ivermektiiniä.
- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa (E 460), esigelatinoitu maissitärkkelys, butyylihydroksianisol (E 320), sitruunahappo (E 330), magnesiumstearaatti (E 572).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkaukoot

Ivermectine ratiopharm tabletti on valkoinen ja pyöreä ja sen toiselle puolelle on painettuna merkintä "A 300".

Tabletit toimitetaan kotelissa, joissa on 1, 4, 6, 8, 10 tai 20 tablettia läpipainolevyissä.
Kaikkia pakkaukkoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Teva B.V.
Swensweg 5
2031GA Haarlem
Alankomaat

Valmistaja

Coripharma EHF
Reykjavíkvegur 78
220 Hafnarfjordur
Islanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

Teva Finland Oy
PL 67
02631 Espoo
Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.5.2023

Bipacksedel: Information till patienten

Ivermectine ratiopharm 3 mg tablett ivermektin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande:

1. Vad Ivermectine ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ivermectine ratiopharm
3. Hur du använder Ivermectine ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ivermectine ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ivermectine ratiopharm är och vad det används för

Ivermectine ratiopharm innehåller ett läkemedel som kallas ivermektin. Det är en typ av läkemedel som används för behandling av vissa parasitinfektioner.

Ivermectine ratiopharm används för att behandla:

- en infektion i tarmen som kallas intestinal strongyloidiasis (strongyloidesinfektion, d.v.s. anguillulos). Denna infektion orsakas av en rundmask som kallas *Strongyloides stercoralis*.
- en infektion i blodet som kallas mikrofilaremia orsakad av lymfatisk filariasis. Infektionen orsakas av en omogen mask som kallas *Wuchereria bancrofti*. Ivermectine ratiopharm är inte effektiv mot vuxna maskar, utan endast mot omogna maskar.
- skabbinfektion. Skabb är ett litet kvalster som gräver sig in under huden. Detta kan orsaka svår kläda. Ivermectine ratiopharm ska endast användas om din läkare har påvisat eller misstänker att du har skabb.

Ivermectine ratiopharm förhindrar inte att du får någon av dessa infektioner. Det är inte verksamt mot vuxna maskar. Du ska endast ta Ivermectine ratiopharm om din läkare har påvisat eller misstänker att du har en parasitinfektion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ivermectine ratiopharm

Ta inte Ivermectine ratiopharm

- om du är allergisk mot ivermektin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion mot läkemedlet kan vara hudutslag, andningssvårigheter och feber.
- om du någon gång har fått ett allvarligt hudutslag eller hudfjällning, blåsbildning och/eller sår i munnen efter att du tagit ivermektin.

Ta inte Ivermectine ratiopharm om något av det ovannämnda gäller för dig. Vänd dig till läkare eller apotekspersonal innan du tar Ivermectine ratiopharm om du känner dig osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ivermectine ratiopharm.

Det är särskilt viktigt att du talar med läkare eller apotekspersonal om:

- ditt immunförsvar är nedslatt
- du bor eller har vistats i sådana områden i Afrika där det förekommer parasitinfektion hos mänskor med filariamasken *Loa loa* (kallas även ögonmask)
- du bor eller har vistats i Afrika. Samtidig användning av dietylkarbamazincitrat (DEC) för behandling av infektion med *Onchocerca volvulus* kan medföra risk för biverkningar som ibland kan vara svåra.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du känner dig osäker), rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Ivermectine ratiopharm.

Allvarliga hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolyt har rapporterats i samband med behandling med ivermektin. Sluta ta ivermektin och uppsök omedelbart läkare om du får något av symptom på de allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt 4.

Barn

Det är inte känt om det är tryggt att använda Ivermectine ratiopharm till barn som väger mindre än 15 kg.

Andra läkemedel och Ivermectine ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

- Tala omedelbart med läkare innan du använder Ivermectine ratiopharm om du är gravid eller kan tänkas bli gravid. Om du är gravid ska detta läkemedel endast användas om det är absolut nödvändigt. Din läkare kommer att besluta om detta i samråd med dig.
- Tala med läkaren om du ammar eller planerar att börja amma, eftersom Ivermectine ratiopharm utsöndras i bröstmjölk. Läkaren kan bestämma sig för att inleda din läkemedelsbehandling en vecka efter att ditt barn har fötts.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva yrsel, dåsighet, skakningar eller svindel efter att du tagit Ivermectine ratiopharm. Om du upplever dessa biverkningar ska du inte köra bil eller använda redskap eller maskiner.

3. Hur du använder Ivermectine ratiopharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Administrering av läkemedlet

- Ta tabletterna via munnen.
- Vid behandling av barn under 6 år ska tabletterna krossas innan de sväljs.
- Ta alla de tabletter som läkaren ordinerat som engångsdos på en och samma gång, tillsammans med vatten och på tom mage. Ät inget inom två timmar före och två timmar efter att du tagit läkemedlet. Detta eftersom man inte känner till hur föda inverkar på upptaget av läkemedlet i kroppen.

Hur mycket läkemedel ska man ta

Behandlingen består av en engångsdos.

- Ta alla de tabletter som din läkare ordinerat dig på en gång.

- Dosen beror på din sjukdom samt på din vikt eller längd.
- Läkaren talar om för dig hur många tablettor du ska ta.

Behandling av intestinal strongyloidiasis (anguillulos)

Rekommenderade doser är:

Patientens vikt (kg)	Dosis: antal 3 mg tablettor
15–24	en
25–35	två
36–50	tre
51–65	fyra
66–79	fem
≥ 80	sex

Mikrofilaremi orsakad av lymfatiske filariasis som beror på en infektion orsakad avs *Wuchereria bancrofti*

Rekommenderade doser är:

Patientens vikt (kg)	Dos vid administrering en gång var 6:e månad: antal 3 mg tablettor	Dos vid administrering en gång var 12:e månad: antal 3 mg tablettor
15–25	en	två
26–44	två	fyra
45–64	tre	sex
65–84	fyra	åtta

Denna behandling upprepas med 6 eller 12 månaders mellanrum.

Alternativt, och om ingen våg finns tillgänglig, kan dosen av ivermektin fastställas enligt patientens längd enligt följande:

Patientens längd (cm)	Dos vid administrering en gång var 6:e månad: antal 3 mg tablettor	Dos vid administrering en gång var 12:e månad: antal 3 mg tablettor
90–119	en	två
120–140	två	fyra
141–158	tre	sex
> 158	fyra	åtta

Behandling av skabb

- Dosen är 200 mikrogram ivermektin per kilo kroppsvikt.

Detta motsvarar:

Patientens vikt (kg)	Dosis: antal 3 mg tablettor
15–24	en
25–35	två
36–50	tre
51–65	fyra
66–79	fem
≥ 80	sex

- En lyckad behandling kan slutgiltigt konstateras först 4 veckor efter läkemedelsdosen.
- Läkaren kan bestämma sig för att ordnera dig att ta en andra dos 8–15 dygn efter den första.

Om du upplever att effekten av Ivermectine ratiopharm är för stark eller för svag ska du vända dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Ivermectine ratiopharm

Det är viktigt att du tar den dos läkaren har ordinerat dig. Minskad medvetandenivå inkluderande koma har rapporterats hos patienter med överdos av ivermektin. Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Ivermectine ratiopharm

Försök ta Ivermectine ratiopharm i enlighet med läkarens ordination. Ta inte dubbeldos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna är vanligtvis inte allvarliga eller långvariga. Biverkningar kan vara vanligare hos personer som är smittade med flera typer av parasiter. Detta gäller särskilt personer med *Loa loa*-mask. Följande biverkningar kan förekomma vid användning av detta läkemedel:

Allergiska reaktioner

Uppsök omedelbart läkare om du får en allergisk reaktion. Tecken på en allergisk reaktion kan inkludera:

- plötslig feber
- plötsliga hudreaktioner (såsom hudutslag eller kåda) eller andra allvarliga hudreaktioner
- andningssvårigheter.

Uppsök omedelbart läkare om du får någon av ovanstående biverkningar.

Sluta använda ivermektin och sök vård omedelbart om du får något av följande symtom:

- rödaktiga, platta, måltavleliknande eller runda fläckar på bålen, ofta med blåsor i mitten, fjällande hud, sår i mun, svalg, näsa, på könsorganen och i ögonen. Dessa allvarliga hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

Andra biverkningar

- leversjukdom (akut hepatitis)
Förändringar i vissa laboratorietester (ökning av leverenzym, ökning av bilirubin i blodet, ökning av antalet av en viss typ av vita blodkroppar)
- blod i urinen
- minskad medvetandenivå inkluderande koma.

Biverkningarna nedan beror på vilken typ av parasitinfektion som behandlas med Ivermectine ratiopharm. Biverkningarna beror även på om du har några andra infektioner.

Personer med intestinal strongyloidiasis (anguillulos) i tarmen kan få följande biverkningar:

- ovanlig svaghetskänsla
- aptitlöshet, buksmärta, förstopning eller diarré
- illamående eller kräkningar
- sömnighet eller yrsel
- skakningar eller darrningar
- minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)
- minskat antal röda blodkroppar eller minskad mängd av det röda blodfärgämnet hemoglobin (anemi).

Vid intestinal strongyloidiasis (anguillulos) i tarmen kan vuxna rundmaskar förekomma i avföringen.

Personer med mikrofilaremi på grund av lymfatisk filariasis orsakad av *Wuchereria bancrofti* kan få följande biverkningar:

- svettning eller feber
- huvudvärk
- ovanlig svaghetskänsla
- smärta i muskler, leder eller på flera ställen i kroppen
- aptitlöshet, illamående
- magont (smärta i buken eller maggropen)
- hosta eller halsont
- obehagskänsla vid andning
- lågt blodtryck när du står eller stiger upp - du kan känna dig yr eller svag
- frossa
- svindel
- smärta eller obehagskänsla i testiklarna.

Personer med skabb kan få följande biverkningar:

- klådan kan bli värre i början av behandlingen. Detta brukar inte vara långt.

Personer med kraftig infektion med *Loa loa*-mask kan få följande biverkningar:

- onormal hjärn Funktion
- smärta i nacke eller rygg
- blödning i ögonvitorna (röda ögon)
- andfåddhet
- urin- eller avföringsinkontinens
- svårigheter att stå eller gå
- förändringar i det psykiska tillståndet
- dåsighet eller förvirring
- att inte reagera på andra personer eller att hamna i koma.

Personer infekterade med masken *Onchocerca volvulus* som orsakar flodblindhet kan få följande biverkningar:

- klåda eller hudutslag
- led- eller muskelsmärta
- feber
- illamående eller kräkningar
- svullna lymfkörtlar
- svullnad särskilt i händer, vrister eller fötter
- diarré
- svindel
- lågt blodtryck (hypotension). Du kan känna dig yr eller svag när du stiger upp.
- snabb hjärtfrekvens
- huvudvärk eller trötthet
- synförändringar och andra ögonproblem såsom infektion, rodnad eller ovanliga känselförnimmelser
- blödning i ögonvitorna eller svullna ögonlock
- förvärrad astma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

5. Hur Ivermectine ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterskivan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ivermektin. Varje tablett innehåller 3 mg ivermektni.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E 460), pregelatiniserad majsstärkelse, butylhydroxianisol (E 320), citronsyra (E 330), magnesiumstearat (E 572).

Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

Ivermectine ratiopharm är runda, vita tablettor försedda med märkningen ”A300” på den ena sidan.

Tabletterna tillhandahålls i kartongförpackningar på 1, 4, 6, 8, 10 och 20 tablettor i blisterskivor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.
Swensweg 5
2031GA Haarlem
Nederlanderna

Tillverkare

Coripharma EHF
Reykjavikvegur 78
220 Hafnarfjordur
Island

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning

Teva Finland Oy
PB 67
02631 Esbo
Tel: 020 180 5900

Denna bipacksedel ändrades senast den 25.5.2023