

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Ventoline 1 mg/ml ja 2 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä

salbutamolisuulfaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Ventoline-sumutinliuos on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ventoline-sumutinliuosta
3. Miten Ventoline-sumutinliuosta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Ventoline-sumutinliuoksen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Ventoline-sumutinliuos on ja mihin sitä käytetään

Ventolinen vaikuttava aine, salbutamoli, vähentää keuhkoputkien seinämien lihasjännitystä ja avartaa keuhkoputkia, jolloin hengitys helpottuu.

Ventoline-sumutinliuosta käytetään astman ja muiden hengityselinsairauksien hoitoon.

Ventoline 1 mg/ml ja 2 mg/ml sumutinliuokset on tarkoitettu aikuisille, nuorille ja yli 4-vuotiaille lapsille. Imeväisille ja alle 4-vuotiaille lapsille voidaan käyttää Ventoline 1 mg/ml ja 2 mg/ml sumutinliuoksia lääkärin harkinnan mukaan.

Ventoline-sumutinliuos on tarkoitettu ainoastaan inhalaatiokäyttöön. Sitä ei saa antaa injektiona eikä sitä saa niellä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ventoline-sumutinliuosta

Älä käytä Ventoline-sumutinliuosta

- jos olet allerginen salbutamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Ventolinea, jos

- sinulla on tai on ollut sydänsairaus, rytmihäiriöitä tai rintakipua
- sinulla on todettu kilpirauhasen liikatoimintaa tai veresi kaliumarvot ovat alhaiset
- sinulla on diabetes, etenkin jos saat myös kortikosteroidihoitoa tai
- sinulla on silmänpainetauti (viherkaihi).

Jos astmaoireesi lisääntyvät tai Ventoline-hoidon teho heikkenee, ota heti yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Ventoline

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Eräiden muiden lääkeaineiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa Ventoline-hoidon tehoon. Keskustele sen vuoksi lääkärin kanssa, ennen kuin otat muita lääkkeitä yhtä aikaa Ventolinin kanssa.

Joillakin verenpaineelääkkeillä (beetasalpaajat) saattaa olla Ventoline-sumutinliuoksen tehoa heikentävä vaikutus.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

On todennäköistä, että salbutamoli erittyy äidinmaitoon. Kysy sen vuoksi neuvoa lääkäriltä, ennen kuin imetät lastasi Ventoline-sumutinliuoshoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ventoline-sumutinliuos ei vaikuta suorituskykyysi liikenteessä eikä kykyysi käyttää koneita.

3. Miten Ventoline-sumutinliuosta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ventoline-sumutinliuosta käytetään yleensä oireenmukaisesti. Tavallinen aloitusannos aikuisille ja lapsille on 2,5 mg. Yli 1,5-vuotiaille, annos voidaan suurentaa 5 mg:aan, joka annetaan enintään neljä kertaa vuorokaudessa. Lääkärisi määrää sinulle sopivan yksilöllisen annostuksen. Noudata aina lääkärin määräämiä annostusohjeita.

Älä ylitä sinulle tai lapsellesi määrättyä annostusta. Lääkkeen annoksen ja annostelutiheyden muuttamisesta on aina keskusteltava lääkärin kanssa. Tarkista annostus lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, mikäli olet epävarma.

Ventoline-sumutinliuosta on käytettävä tarvittaessa eikä säännöllisesti.

Käännä välittömästi lääkärin puoleen, jos astmasi on aktiivinen (esim. jos seuraavanlaista oireilua tai pahenemisvaiheita esiintyy usein: hengenahdistus, joka vaikeuttaa puhumista, syömistä tai nukkumista, yskä, hengityksen vinkuminen, puristava tunne rintakehällä, fyysinen toimintarajoite). Lääkäri voi aloittaa tai lisätä hoitoon astman hallintaa parantavan lääkkeen, kuten inhaloitavan kortikosteroidin.

Kerro mahdollisimman pian lääkärille, jos sinusta tuntuu, että lääkkeen vaikutus on liian heikko (jos esim. tarvitset hengenahdistukseen tavallista suurempia annoksia tai inhalaation vaikutus kestää alle 3 tuntia), sillä astmasi saattaa olla pahenemassa ja saatat tarvita jonkin toisen lääkkeen.

Jos käytät Ventoline-sumutinliuosta useammin kuin kahdesti viikossa astmaoireiden hoitoon, lukuun ottamatta ennaltaehkäisevää käyttöä ennen räsitusta, tämä viittaa astman huonoon hoitotasapainoon, joka voi suurentaa vaikeiden astma-kohtausten riskiä (astman paheneminen). Vaikeat astma-kohtaukset voivat aiheuttaa vakavia komplikaatioita ja saattavat olla henkeä uhkaavia tai johtaa jopa kuolemaan. Käännä lääkärin puoleen mahdollisimman pian, jotta hän voi arvioida astmanhoitoasi.

Jos käytät päivittäin keuhkojen tulehdusta hoitavaa lääkettä, kuten inhaloitavia kortikosteroideja, on tärkeää jatkaa käyttöä säännöllisesti voimnin paranemisesta huolimatta.

Ventoline-sumutinliuoksen ottamiseksi irrota muovisäiliö liuskasta ja avaa se vääntämällä yläosa kevyesti irti välittömästi ennen käyttöä. Ventoline-sumutinliuos on käyttövalmis laimentamattomana. Tarvittaessa liuos voidaan kuitenkin laimentaa käyttämällä fysiologista keittosuolaliuosta. Käyttämätön sumutinliuos on hävitettävä.

Ventoline-sumutinliuos annetaan asianmukaisen lääkesumuttimen avulla lääkärin ohjeiden mukaan.

Älä ota Ventoline-sumutinliuosta ruiskeena tai suun kautta.

Ventoline-sumutinliuos otetaan 5–15 minuutin kuluessa, jolloin vaikuttava aine (salbutamoli) jakautuu tasaisesti ja tehokkaasti keuhkoihin. Samanaikaisesti hengitystiet kostuvat, mikä edistää sitkeiden eritteiden poistumista keuhkoista.

Puhdista lääkesumutin ja anna sen kuivua jokaisen käyttökerran jälkeen.

Jos sinusta tuntuu, että Ventoline-sumutinliuoksen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos otat enemmän Ventoline-sumutinliuosta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tavanomaisessa käytössä Ventoline ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia.

Ota heti yhteyttä lääkäriin ja lopeta tämän lääkkeen käyttö, jos sinulla ilmenee seuraavia oireita:

- jos hengityksesi vaikeutuu tai alkaa vinkua heti lääkkeenoton jälkeen (paradoksinen bronkospasmi). Jos saatavillasi on toinen nopeavaikutteinen astmalääke, kokeile sitä mahdollisimman pian.
- jos lääke aiheuttaa sinulle yliherkkyysoireita, kuten silmien, kasvojen, huulten ja suunielun turvotusta, ihottumaa, keuhkoputkien supistumista, matalaa verenpainetta tai pyörtymistä.
- jos sinulle aiheutuu maitohappoasidoosi (tila, jossa veren laktaattipitoisuus on suurentunut). Se ilmenee useimmiten potilailla, joilla on vaikea munuaissairaus. Maitohappoasidoosin oireita ovat hengityksen nopeutuminen, hengenahdistus (vaikka hengityksen vinkuna saattaa lieviytyäkin), viluntunne, vatsakipu, pahoinvointi ja oksentelu.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

- vapina, päänsärky
- sydämen tiheälyöntisyys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

- sydämentykytykset
- suun ja kurkun ärsytys
- lihaskouristelu.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

- veren pieni kaliumarvo

- ääreisverisuonten laajeneminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestä tuhannesta):

- yliherkkyysoireet, kuten silmien, kasvojen, huulten ja suunielun turvotus, ihottumaa, keuhkoputkien supistelu, matala verenpaine ja pyörtyminen
- yliaktiivisuus
- sydämen rytmihäiriöt
- hengityksen vinkuna lääkkeen käytön jälkeen (ns. paradoksinen bronkospasmi)
- maitohappoasidoosi.

Tuntematon (tiedot saatu kliinisen käytön haittavaikutusraporteista, minkä vuoksi yleisyyttä ei tunneta)

- rintakipu.

Kerro lääkärille, jos sinulla on tällaisia oireita käyttäessäsi salbutamolia. Älä kuitenkaan lopeta lääkkeen käyttöä kysymättä neuvoa lääkäriltä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Ventoline-sumutinliuoksen säilyttäminen

- Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
- Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
- Kun olet avannut foliopakkauksen, käytä sen sisältö 3 kuukauden kuluessa. Jos kerta-annossäiliöön on jäänyt sumutinliuosta käyttämättä, hävitä säiliön sisältö.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ventoline-sumutinliuos sisältää

- Vaikuttava aine on salbutamolisuльфaatti. Sitä on yhdessä millilitrassa määrä, joka vastaa 1 mg:aa tai 2 mg:aa salbutamolia.
- Muut aineet ovat natriumkloridi, rikkihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkaus koko

Ventoline-sumutinliuosta on kaksi eri vahvuutta, 1 mg/ml ja 2 mg/ml. Pakkauksessa on 20 kerta-annossäiliötä, joissa kussakin on 2,5 ml sumutinliuosta.

Liuos on väriltään joko vaaleankeltaista tai väritöntä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy, Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki, Suomi

Valmistaja

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

GlaxoSmithKline Oy

Porkkalankatu 20 A

00180 Helsinki

puh. 010 303 030

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.8.2024

© GlaxoSmithKline Oy 2024

Bipacksedel: Information till användaren

Ventoline 1 mg/ml och 2 mg/ml lösning för nebulisator i endosbehållare

salbutamolsulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ventoline lösning för nebulisator är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline lösning för nebulisator
3. Hur du använder Ventoline lösning för nebulisator
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ventoline lösning för nebulisator ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ventoline lösning för nebulisator är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet i Ventoline, salbutamol, minskar muskelspänningen i luftrörens väggar och vidgar dem, vilket gör att andningen underlättas.

Ventoline lösning för nebulisator är avsedd för behandling av astma och andra luftvägssjukdomar.

Ventoline 1 mg/ml ja 2 mg/ml lösningar för nebulisatorer är avsedda för vuxna, ungdomar och barn över 4 år. Spädbarn och barn under 4 år kan få Ventoline 1 mg/ml och 2 mg/ml lösning i nebulisator enligt läkarordination.

Ventoline lösning för nebulisator är avsedd endast för inhalation. Den får inte injiceras eller sväljas.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline lösning för nebulisator

Använd inte Ventoline lösning för nebulisator

- om du är allergisk mot salbutamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Ventoline om du

- har eller har haft hjärtsjukdom, arytmier eller bröstsmärta
- konstaterats ha ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos) eller låga kaliumvärden i blodet
- har diabetes, särskilt om du samtidigt använder kortikosteroider eller
- har glaukom (förhöjt tryck i ögat, grön starr).

Om dina astmabesvär tilltar eller effekten av Ventoline försämras, kontakta läkare utan dröjsmål.

Andra läkemedel och Ventoline

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig användning av vissa andra läkemedel kan påverka effekten av din behandling med Ventoline. Tala därför med läkare innan du tar något annat läkemedel samtidigt med Ventoline.

Vissa blodtryckssänkande medel (betablockerare) kan försämra effekten av Ventoline lösning för nebulisator.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Det är sannolikt att salbutamol går över i modersmjölk. Rådfråga därför läkare innan du ammar ditt barn i samband med behandling med Ventoline.

Körförmåga och användning av maskiner

Ventoline lösning för nebulisator inverkar varken på din prestationsförmåga i trafiken eller på din förmåga att använda maskiner.

3. Hur du använder Ventoline lösning för nebulisator

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ventoline lösning för nebulisator används vanligen som symtomatisk behandling. En vanlig startdos för vuxna och barn är 2,5 mg. Dosen kan ökas till 5 mg högst fyra gånger om dagen för barn äldre än 1,5 år. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den särskilt för dig. Följ alltid läkarens doseringsanvisningar.

Överskrid inte ordinerad dosering. Konsultera alltid läkare innan dosen eller doseringsfrekvensen ändras. Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på vilken dos du skall ta.

Ventoline lösning för nebulisator ska användas inte regelbundet utan vid behov.

Om din astma är aktiv (om du exempelvis ofta har astmaanfall eller symtom, t.ex. andfåddhet som gör det svårt att tala, äta eller sova, hosta, väsande andning, trängthet i bröstet eller begränsning av fysisk aktivitet), ska du omedelbart tala om det för din läkare, som kan sätta in eller öka dosen av exempelvis inhalerade kortikosteroider för att kontrollera din astma.

Tala om för din läkare så snart som möjligt om ditt läkemedel inte verkar fungera lika bra som förut (om du exempelvis behöver högre dos för att lindra andningsbesvär eller det inhalerade läkemedlet inte ger lindring i minst 3 timmar) eftersom din astma kan vara på väg att försämrats och du kan behöva ett annat läkemedel.

Om du använder Ventoline lösning för nebulisator oftare än två gånger i veckan för att behandla astmasymtom, bortsett från förebyggande behandling före ansträngning, tyder det på dåligt kontrollerad astma, vilket kan öka risken för svåra astmaanfall (förvärrad astma) som kan ha allvarliga följder och kan vara livshotande eller t.o.m. dödliga. Du bör kontakta din läkare så snart som möjligt för översyn av din astmabehandling.

Om du dagligen använder ett läkemedel mot inflammation i lungorna, t.ex. inhalerade kortikosteroider, är det viktigt att du fortsätter att använda det regelbundet, även om du mår bättre.

Då det är dags att ta Ventoline lösning för nebulisator, avskilj en plastbehållare och öppna den genom att försiktigt vrida av den översta delen strax före dosen skall tas. Ventoline lösning för nebulisator är färdig att användas utan spädning. Vid behov kan dock lösningen spädas med fysiologisk koksaltlösning. Oanvänd lösning för nebulisator skall kasseras.

Ventoline lösning för nebulisator ges via ett särskilt hjälpmedel (en s.k. nebulisator) enligt läkarens anvisningar.

Ta inte Ventoline lösning för nebulisator som injektion eller oralt (via munnen).

En dos Ventoline lösning för nebulisator inandas i 5–15 minuters tid. På detta sätt uppnås en effektiv och jämn distribuering av det verksamma ämnet (salbutamol) i lungorna. Samtidigt fuktas också luftrören, vilket gör att segt slem lättare avlägsnas från lungorna.

Rengör nebulisatorn och låt den torka efter varje doseringstillfälle.

Om du upplever att effekten av Ventoline lösning för nebulisator är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Ventoline lösning för nebulisator

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

I samband med normal användning framkallar Ventoline i allmänhet inga biverkningar.

Kontakta läkare omedelbart och sluta använda detta läkemedel, om du får följande symtom:

- om din andning försvåras eller börjar väsa/pipa genast efter att du tagit läkemedlet (paradoxal bronkospasm). Om du har tillgång till ett annat snabbverkande läkemedel för astma ska du pröva det så fort som möjligt.
- om du får överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ögonen, ansiktet, läpparna och svalget, hudutslag, sammandragningar i luftrören, lågt blodtryck och svimning .
- ifall du får mjölksyraacidosis (ett tillstånd med förhöjd laktathalt i blodet). Detta tillstånd uppstår oftast hos patienter med svår njursjukdom. Symtom av mjölksyraacidosis är försnabbad andning, andnöd (även om andningens väsande/pipande kan mildras), känsla av kyla, magsmärta, illamående och kräkningar.

Vanliga biverkningar (hos mer än 1 patient av hundra):

- skakning, huvudvärk
- ökad hjärtfrekvens.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 patient av hundra):

- hjärtklappning
- irritation i munnen och halsen
- muskelspasmer.

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tusen):

- lågt kaliumvärde i blodet

- utvidgning av perifera blodkärl.

Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen):

- överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ögonen, ansiktet, läpparna och svalget, hudutslag, sammandragningar i luftrören, lågt blodtryck och svimning
- hyperaktivitet
- hjärtrytmstörningar
- pipande andning efter intagandet av läkemedlet (paradoxal bronkospasm)
- mjölksyraacidosis.

Okänd (uppgifterna är tagna från biverkningsrapporter som givits under klinisk användning varför frekvensen inte kan beräknas)

- bröstsmärta.

Tala om för läkare om du har dessa symtom när du tar salbutamol. Sluta ändå inte att ta läkemedlet utan att rådgöra med läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Ventoline lösning för nebulisator ska förvaras

- Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
- Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Efter det att du öppnat folieförpackningen skall dess innehåll användas inom 3 månader. Om det vid något doseringstillfälle blir kvar lösning i endosbehållaren, skall detta överblivna innehåll kasseras.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är salbutamolsulfat och en milliliter innehåller en mängd som motsvarar 1 mg eller 2 mg salbutamol.
- Övriga innehållsämnen är natriumklorid, svavelsyra och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Ventoline lösning för nebulisator finns att få i styrkor på 1 mg/ml och 2 mg/ml.

Varje förpackning innehåller 20 endosbehållare, som alla innehåller 2,5 ml lösning för nebulisator. Lösningen är svagt gul eller färglös.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Oy, Porkalagatan 20 A, 00180 Helsingfors, Finland

Tillverkare

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning

GlaxoSmithKline Oy

Porkalagatan 20 A

00180 Helsingfors

tel. 010 303 030

Denna bipacksedel ändrades senast 30.8.2024

© GlaxoSmithKline Oy 2024