

Pakkaus seloste : Tie toa käyttäjälle

**Ciclesonide Sandoz 80 mikrog/annos inhalaatios umute, liuos
Ciclesonide Sandoz 160 mikrog/annos inhalaatios umute, liuos**

siklesonidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkäriin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkikenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Ciclesonide Sandoz on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ciclesonide Sandoz -valmistetta
3. Miten Ciclesonide Sandoz -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Ciclesonide Sandoz -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Ciclesonide Sandoz on ja mielin sitä käytetään

Mitä Ciclesonide Sandoz on

Ciclesonide Sandoz sisältää vaikuttavana aineena siklesonidia. Ciclesonide Sandoz on kirkas ja väritön aerosolisuihke, joka hengitetään suun kautta keuhkoihin. Se on ehkäisevä lääke (kortikosteroidi), jota on käytettävä päivittäin. Se aktivoituu vasta, kun se on hengitetty keuhkoihin.

Mihin Ciclesonide Sandoz -valmistetta käytetään

Ciclesonide Sandoz -valmistetta käytetään aikuisten ja nuorten (vähintään 12-vuotiaiden) kroonisen astman hoidossa. Se auttaa hengittämään helpommin vähentämällä astman oireita ja astmakohtausten todennäköisyyttä. Koska vaikutus muodostuu ajan kanssa, tästä lääketä on käytettävä päivittäin, vaikka tuntisitkin voitisi hyväksi.

Tämä lääke ei sovi käytettäväksi akuutin hengenahdistuskohtauksen yhteydessä. Käytä sellaisen kohtauksen nopeaan lievytkseen ainoastaan erillistä kohtausinhalaattoria.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ciclesonide Sandoz -valmistetta

Älä käytä Ciclesonide Sandoz -valmistetta

- jos olet allerginen siklesonidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ciclesonide Sandoz -valmistetta.

- **Ennen kuin aloitat** hoidon, kerro lääkärillesi, jos:
olet aiemmin saanut lääkitystä tai saat parhaillaan lääkitystä keuhkotuberkuuloosiin tai sieni-, virus- tai bakteeri-infektioon.

Tarkista asia lääkärltäsi, mikäli olet epävarma. On tärkeää varmistua siitä, että Ciclesonide Sandoz on oikea lääke sinulle.

Ota Ciclesonide Sandoz -hoidon aikana **välittömästi** yhteyttä lääkäriksi

- jos hengityksesi vaikeutuu ja oireesi, kuten yskä, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen, puristava tunne rinnassa, lisääntynyt rahina tai muut hengitysteiden ahtauman oireet, pahenevat. (Käytä kohtausinhalaattoria, joka normaalisti lievittää oireita nopeasti.)
- jos heräät öisin oireidesi takia.
- jos kohtausinhalaattorisit ei lievitä oireitasi.

Lääkäriksi päättää lisätoimenpiteistä.

Eriyis et potilasryhmät

Vaikeaa astmaa sairastavilla potilailla on riski saada akuutteja astmakohtauksia. Lääkäri tekee säännöllisesti astmakontrollitestejä, mm. keuhkojen toimintakokeita, tällaisille potilaille.

Kortikosteroiditabletteja käyttävät potilaat:

Ciclesonide Sandoz -valmistetta voidaan käyttää tablettien sijasta tai vähentämään tarvitsemiesi tablettien määrää. Noudata lääkäriksi ohjeita huolellisesti.

- Tämä aloitetaan noin viikon kuluttua Ciclesonide Sandoz -inhalaatioiden aloittamisesta.
- Ottamiesi tablettien määrää vähennetään harkiten tietyllä aikavälillä.
- Saatat joskus tänä aikana tuntea yleistä huonovointisuutta.
- Tästä huolimatta on tärkeää jatkaa Ciclesonide Sandoz -inhalaatioiden käyttämistä ja ottamiesi tablettien määrän vähittäistä vähentämistä.
- Jos sinulla esiintyy vakavia oireita, kuten pahoinvoittia (sairauden tunnetta), oksentelua (huonovointisuutta), ripulia tai korkeaa kuumetta, ota yhteyttä lääkäriisi.
- Tässä yhteydessä voi joskus paljastua lieviä allergioita, kuten riniittiä (nenän sisäosan tulehdus; nuha) tai ekseema (kutiava ja punoittava iho).
- Jos lopetat tablettioidon, sinulla on edelleen jonkin aikaa lisämuunuaisten vajaatoiminnan riski, joka liittyy käyttämäsi kortikosteroiditabletteihin. Lisämuunuaisten vajaatoiminnan oireet (kuten huimaus, pyörtyminen, pahoinvohti, ruokahaluttomus, apeus, karvoituksen väheneminen, kyvyttömyys sietää stressiä, heikkous, päänsärky, muistongelmat, allergiat, ruokahimot ja verensokeriin liittyvät häiriöt) saattavat myös jatkua jonkin aikaa.
- Erikoislääkärin saattaa myös olla tarpeen määrittää lisämuunuaisten vajaatoiminnan aste.
- Lääkäriksi seuraa myös säännöllisesti lisämuunuaistesi toimintaa.
- Stressiä aiheuttavissa tilanteissa, kuten kirurgisten toimenpiteiden tai pahenevien astmakohtausten yhteydessä, saatat tarvita lisäkortikosteroiditabletteja. **Siksi sinun on pidettävä mukanasi "steroidivaroituskorttia", josta tämä käy ilmi.**

Maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Siklesoniidiantosta ei tarvitse muuttaa, jos sinulla on maksan- tai munuaisvaivoja. Jos sairastat valkeaa maksasairautta, lääkäriksi tarkkailee tilaasi erityisen huolellisesti normaalilta steroidituotannon häiriöstä aiheutuvien mahdollisten haittavaikutusten varalta.

Alle 12-vuotiaat lapset:

Tätä lääkettä ei suositella alle 12-vuotiaalle lapsille, sillä tiedot sen mahdollisista haittavaikutuksista ovat puutteelliset.

Muut lääkevalmisteet ja Ciclesonide Sandoz

Kerro lääkärille ennen Ciclesonide Sandoz -valmisteen käyttöä, mikäli sinua hoidetaan parhaillaan sieni- tai virustulehuksen vuoksi lääkkeellä, joka sisältää:

- ketokonatsolia
- itrakonatsolia
- kobilistaattia
- ritonaviiria
- nelfinaviiria.

Ne saattavat voimistaa Ciclesonide Sandoz -valmisten vaikutusta niin, että haittavaikutusten mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea pois, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua huolellisesti, jos käytät näitä lääkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käytänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkeitä.

Ciclesonide Sandoz ruuan ja juoman kanssa

Ciclesonide Sandoz -valmistetta voi käyttää ruuasta ja juomasta riippumatta.

Raskaus, imetyks ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

- Koska Ciclesonide Sandoz -valmisten vaikutuksista raskaana olevilla naisilla ei ole riittävästi tietoa, lääkäriksi keskustelee kanssasi Ciclesonide Sandoz -valmisten käytön riskeistä ja hyödyistä.
- Siklesonidia (Ciclesonide Sandoz -valmisten vaikuttavaa ainetta) saa ottaa raskauden aikana ainoastaan silloin, kun mahdollinen hyöty äidille ylittää kehittyvälle sikiölle mahdollisesti aiheutuvan riskin. Jos lääkäriksi päättää, että voit jatkaa Ciclesonide Sandoz -valmisten käyttöä, astman hoitotasapainon ylläpitoon käytetään pienintä mahdollista siklesoniidiannosta.
- Raskauden aikana kortikosteroideja saaneiden äitien lapsien lisämuunuaisten toimintaa seurataan tarkkaan.
- Kerro lääkärillesi, jos haluat käyttää Ciclesonide Sandoz -valmistetta imetyksen aikana.
- Inhaloitavan siklesonidin eritymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa.
- Ciclesonide Sandoz -valmisten määräämistä imettäville naisille tulee harkita vain, jos odotettu hyöty äidille ylittää mahdollisen riskin lapselle.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Ciclesonide Sandoz ja sen aineet eivät vaikuta tai eivät merkittävästi vaikuta ajokykyyn tai koneidenkäytökykyyn.

Ciclesonide Sandoz sisältää etanolia (alkoholia)

Tämä lääkevalmiste sisältää 4,7 mg alkoholia (etanolia) per annos. Alkoholimäärä annoksessa tästä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml:aa olutta tai viiniä. Tämän lääkevalmisten sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaitavia vaikutuksia.

3. Miten Ciclesonide Sandoz -valmistetta käytetään

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäristä tai apteekista, jos olet epävarma.

- Jos olet juuri aloittanut tämän lääkkeen käyttämisen kortikosteroiditblettien sijasta tai niiden lisäksi, katso kohta 2 *Kortikosteroiditbletteja käyttävät potilaat*.

Miten paljon Ciclesonide Sandoz -valmistetta minun tulee ottaa päivittäin?

Lääkäriksi on kertonut sinulle, kuinka paljon lääkettä Sinun tulee ottaa päivittäin. Tämä riippuu yksilöllisestä tarpeestasi.

- Ciclesonide Sandoz -valmisteen suositeltu annos on 160 mikrogrammaa kerran vuorokaudessa, millä saavutetaan astman hoitotasapaino suurimmalle osalle potilaista.
- Joillakin potilailla pienennetty annos 80 mikrogrammaa kerran vuorokaudessa saattaa olla sopiva annos astman hoitotasapainon tehokkaaseen ylläpitoon.
- Ciclesonide Sandoz -annoksen suurentaminen lyhytaikaisesti saattaa olla tarpeen potilailla, joiden astmaoireet vaikeutuvat merkittävästi. Annos voi olla korkeintaan 640 mikrogrammaa vuorokaudessa, mutta ei ole olemassa tietoa, joka vahvistaisi näiden suurempien annosten lisätehon kolmen kuukauden jälkeen.

Tarvittaessa lääkäri määrä sinulle myös kortikosteroiditabletteja ja/tai tulehduksen yhteydessä antibiootin.

- Lääkäri sovitaa annoksesi niin, että käyttämäsi määrä on pienin mahdollinen annos, jolla astmasi pysyy hallinnassa.
- Sinun pitäisi alkaa huomata oireidesi (hengityksen vinkuminen, puristava tunne rinnassa ja yskä) helpottumista 24 tunnin kulussa.

Milloin käytän Ciclesonide Sandoz -inhalaattoriani?

Useimmissa tapauksissa inhalaattoria käytetään joko aamulla tai illalla – yksi tai kaksi suihkeannosta kerran vuorokaudessa. Noudata lääkäri ohjeita hyvin huolellisesti. On tärkeää ottaa Ciclesonide Sandoz -valmistetta säännöllisesti joka päivä, vaikka voitisi olisi parempi.

Jos joudut käyttämään kohtausinhalaattoria useammin kuin 2–3 kertaa viikossa, sinun tulee ottaa yhteys lääkäriisi lääkityksesi tarkistamista varten.

Miten käytän Ciclesonide Sandoz -inhalaattoriani?

On tärkeää, että lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkikenkilökunta näyttää sinulle, miten Ciclesonide Sandoz -inhalaattoria käytetään oikein. Oikea tekniikka varmistaa, että saat oikean määren läkettä keuhkoihisi. Tämän selosten ohjeita voi käyttää muistin tukena.

Saattaa olla hyödyksi harjoitella peilin edessä muutaman kerran, kunnes olet varma, että osaat käyttää Ciclesonide Sandoz -inhalaattoria oikein. Varmista, ettei läkettä karkaa suun yläosasta tai suupielistäsi.


Jos kyseessä on uusi inhalaattori tai ellet ole käyttänyt inhalaattorisasi vähintään viikkoon, se **on** testattava ennen käyttöä. Poista suukappaleen suojuus ja paina inhalaattorin sisällä olevaa säiliötä **kolme** kertaa vapauttaaksesi **kolme** suihketta ilmaan, itsestääsi poispäin.

Sinun **ei** tarvitse ravistaa Ciclesonide Sandoz -inhalaattorisasi ennen käyttöä. Lääke on jo valmiaksi sekotettu erittäin hienojakoiseksi liuokseksi, jotta varmistutaan, että saat jokaisesta suihkeesta oikean annoksen.

Lääkkeen inhalaation aikana voit joko istua tai seistä.

Noudata näitä ohjeita tarkasti:

1. Poista suukappaleen suojuksen ja tarkista, että suukappale on puhdas ja kuiva sekä sisä- että ulkopuolelta.



2. Pidä inhalaattoria ylösalaisin (säiliön pohja ylöspäin) asettamalla etusormesi säiliön pohjaan ja peukalosi suukappaleen alle.




3. Hengitää ulos niin pitkään kuin tuntuu miellyttävältä. Älä hengitää ulos inhalaattorin kautta.
4. Vie suukappale suuhusi ja sulje huulesi tiiviisti suukappaleen ympärille.




5. Heti kun olet aloittanut sisäähengityksen suun kautta, paina inhalaattorin yläosaa alaspäin etusormellasi, jolloin suihkeannos vapautuu samalla, kun edelleen hengität sisään hitaasti ja syvään. Varmista, ettei lääkesuihketta karkaa suun ylä- tai alaosasta eikä suupielistä.
6. Pidätä hengitystä, ota inhalaattori pois suustasi ja sormesi pois inhalaattorin yläsan päältä. Pidätä hengitystä edelleen noin kymmenen sekuntia tai niin kauan kuin tuntuu miellyttävältä.

Hengitä ulos hitaasti suun kautta. Älä hengitä ulos inhalaattorin kautta.




On tärkeää, ettet hätköi vaiheissa 3–6.

7. Jos sinua on neuvottu ottamaan toinen suihke, odota noin puoli minuuttia ja toista vaiheet 3–6.



8. Aseta suukappaleen suojuksen inhalaattoriin aina käytön jälkeen pölyyntymisen välttämiseksi. Paina se tiiviisti kiinni niin, että se naksataa paikalleen.



9. Hygienian ylläpitämiseksi

- puhdistaa suukappale viikoittain **kuivalla** liinalla sekä sisä- että ulkopuolelta. Irrota suukappaleen suojuksen, mutta älä irrota inhalaattorin säiliötä muovikotelosta
- pyyhi kuivalla taitetulla liinalla lääkkeen ulostuloon tarkoitettun pienen reiän etuosa
- **älä** käytä vettä tai muita nesteitä.

Oikea tekniikka varmistaa, että oikea määrä Ciclesonide Sandoz -valmisteesta kulkeutuu keuhkoihisi aina, kun käytät inhalaattorisasi. Lääkäri tarkistaa inhalaatiotekniikkasi säännöllisesti varmistuakseen siitä, että hoitosi vaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun säiliö on täysin tyhjä, et tunne etkä kuule ponneaineen vapautumista.

Jos hengityksesi alkaa vinkua tai tunnet puristavaa tunetta rinnassasi Ciclesonide Sandoz -inhalaattorin käytön jälkeen:

- älä ota enempää suihkeita
- käytä kohtausinhalaattoria hengityksen helpottamiseksi
- ota välittömästi yhteystä lääkäriisi.

Lääkäriisi saattaa suositella tilajatkeen käyttöä, jos inhalaattorin käyttö tuntuu vaikealta. AeroChamber Plus Flow-Vu on Ciclesonide Sandoz -inhalaattoriin sopiva tilajatke. Jos käytössäsi on AeroChamber Plus Flow-Vu -laite, noudata sen mukana seuraavia ohjeita.

Lääkäriisi tai apteekkienhenkilökunta voi neuvoa sinua laitteen käytössä.

Jos käytät enemmän Ciclesonide Sandoz -valmistetta kuin sinun pitäisi

On tärkeää, että otat annoksen lääkärin ohjeen mukaan. Älä suureenna tai pienennä annosta kysymättä ensin neuvoa hoitohenkilökunnilta.

Mitään erityistä hoitoa ei tarvita, jos olet käyttänyt liikaa Ciclesonide Sandoz -valmistetta, mutta sinun tulisi ilmoittaa asiasta lääkärillesi. Jos korkeita annoksia käytetään pitkään, lisämunuaisen vajaatoiminta on mahdollinen. Lisämunuaistoiminnan seuranta saattaa olla tarpeen.

Jos unohtat käyttää Ciclesonide Sandoz -valmisteita

Jos olet unohtanut käyttää Ciclesonide Sandoz -valmisteita, ota seuraava annos ajallaan. Älä ota kaksinkertaista määrästä suihkeita korvataksesi unohtuneen kerta-annoksen.

Jos lopetat Ciclesonide Sandoz -valmisteen käytön

Älä lopeta Ciclesonide Sandoz -inhalaattorin käyttöä, vaikka olosi tuntuisikin paremmalta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan puoleen.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön, kerro siitä välittömästi lääkärillesi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset seuraavia vakavia haittavaikutuksia, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriisi:

- vaikeat allergiset reaktiot, kuten huulten, kielen ja kurkun turvotus (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)
- allergiset reaktiot: ihottumat, punoitus, kutina ja nokkosihottuman kaltaiset paukamat (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)
- yskä tai hengityksen vinkuminen, joka pahenee nopeasti inhalation ottamisen jälkeen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

Muut Ciclesonide Sandoz -valmisteella todetut haittavaikutukset ovat yleensä lieviä. Useimmissa tapauksissa voit jatkaa hoitoasi. Haittavaikutukset, joita voit kokea, ovat:

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- käheys
- suun tai kurkun kirvelly, tulehdus tai ärsytys
- sammas (suun sienitulehdus)
- päänsärky
- paha maku suussa

- suun tai kurkun kuivuus
- pahoinvoindi tai oksentelu.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- sydämentykyys (palpitaatiot)
- vatsavaiva tai vatsakipu
- korkea verenpaine.

Seuraavia haittavaikutuksia saattaa myös esiintyä (esiintymistäveys tuntematon):

- univaikeudet, masennus, huolestuneisuus, rauhattomuus, hermostuneisuus, yli-innostuneisuus tai ärtyneisyys. Näitä esiintyy todennäköisemmin lapsilla.

Ciclesonide Sandoz saattaa vaikuttaa elimistön normaalisiin kortikosteroidituotantoon. Tätä todetaan yleensä potilailla, jotka käyttävät suuria annoksia pitkään. Näitä vaikutuksia voivat olla:

- nuorilla kasvun hidastuminen
- luuston haurastuminen
- silmän mykiön sumenemisen (kaihi) aiheuttama näön hämärtyminen
- normaalialia korkeamman silmänpaineen (glaukooma) aiheuttama näön heikkeneminen
- kuukasvot, yläkehon lihominen sekä käsivarsien ja jalkojen oheneminen (Cushingin oireyhymälle tyypilliset piirteet tai Cushingin oireyhymä).

Lääkärin tulisi seurata säännöllisesti pitkäaikaista hoitoa saavien nuorten pituutta. Jos kasvu hidastuu, lääkäri varmistaa, että käytät pienintä mahdollista annosta, jolla astma pysyy tehokkaasti hallinnassa.

Kortikosteroiditabletit voivat aiheuttaa enemmän haittavaikutuksia kuin kortikosteroidi-inhalatori, kuten Ciclesonide Sandoz. Jos olet ottanut steroiditabletteja ennen Ciclesonide Sandoz -hoitoa tai sen kanssa, näiden haittavaikutusten riski säilyy jonkin aikaa. Säännöllisin lääkärintarkastuksin voidaan varmistaa, että käytät sinulle oikeaa Ciclesonide Sandoz -annosta. Säännöllisissä lääkärintarkastuksissa voidaan myös tunnistaa mahdolliset haittavaikutukset varhaisessa vaiheessa ja estää niiden pahaneminen.

Muista:

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaiketus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärlle Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Ciclesonide Sandoz -valmisten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Säiliö sisältää paineistettua nestettä. Älä altista yli 50 °C:n lämpötiloille.

Säiliötä ei saa puhkaista, rikkoa eikä polttaa, vaikka se vaikuttaisikin tyhjältä.

Useimpien sumutemuotoisten painesäiliössä säilytettävien lääkevalmisteiden tavoin tämän lääkevalmisten terapeuttinien vaikutus saattaa heiketä säiliön ollessa kylmä. Ciclesonide Sandoz vapauttaa kuitenkin yhtäläisiä annoksia $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$:n lämpötilassa.

Jos lääkäri päättää lopettaa hoidon tai jos inhalaattori on tyhjä, palauta se apteekkiin turvallista hävittämistä varten. Tämä on tärkeää, sillä säiliöön saattaa jäädä lääkejäämiä, vaikka se vaikuttaisikin tyhjältä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ciclesonide Sandoz sisältää

- Vaikuttava aine on siklesonidi. Yhden painalluksen vapauttama suihke (suukappaleesta vapautuva annos) sisältää 80 tai 160 mikrogrammaa siklesonidia.
- Muut aineet ovat vedetön etanol ja ponneaine.

Lääkevalmisen kuvaus ja pakauskoot

Ciclesonide Sandoz käsitteää kirkasta ja väritöntä nestettä sisältävän alumiinista valmistetun paineilmäsäiliön, joka vapauttaa suukappaleen kautta tarkasti mitatun annoksen siklesonidia suihkeen muodossa.

Ciclesonide Sandoz 80 mikrog/annos inhalaatiосумute, liuos

Lääkesäiliö on muovisessa kotelossa, jossa on sumutussuutin ja vihreä suojuks.

Ciclesonide Sandoz 160 mikrog/annos inhalaatiосумute, liuos

Lääkesäiliö on muovisessa kotelossa, jossa on sumutussuutin ja violetti suojuks.

Pakkauuskoko

120 mitattua suihketta

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja:

Genetic S.p.A., Contrada Canfora Z I, Fisciano SA 84084, Italia

Tämä pakkaukseloste on tarkistettu viimeksi 23.01.2024

Bipacksedel: Information till användaren

Ciclesonide Sandoz 80 mikrogram/dos inhalations spray, lösning Ciclesonide Sandoz 160 mikrogram/dos inhalations spray, lösning

ciklesonid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande

1. Vad Ciclesonide Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ciclesonide Sandoz
3. Hur du använder Ciclesonide Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ciclesonide Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ciclesonide Sandoz är och vad det används för

Vad Ciclesonide Sandoz är:

Ciclesonide Sandoz innehåller den aktiva substansen ciklesonid. Ciclesonide Sandoz är en klar och färglös aerosolspray som du andas in genom munnen och ned i lungorna. Det är ett förebyggande läkemedel (en kortikosteroid) som måste tas varje dag och som verkar först när det har nått ned till lungorna.

Vad Ciclesonide Sandoz används för:

Ciclesonide Sandoz används för att kontrollera kronisk astma hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre).

Det hjälper dig att andas lättare genom att minska symptomen på astma och minska risken för astmaanfall. Effekten byggs upp över tid, och därför måste du ta detta läkemedel varje dag, även när du mår bra.

Detta läkemedel är inte lämpligt att använda vid ett akut anfall av andnöd. Vid sådana anfall ska du endast använda din snabbverkande astmamedicin.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ciclesonide Sandoz

Använd inte Ciclesonide Sandoz

om du är allergisk mot ciklesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ciclesonide Sandoz

- **Innan du börjar** behandling med detta läkemedel ska du tala om för din läkare om: du någonsin har fått behandling eller för närvarande genomgår behandling för lungtuberkulos (TB) eller en svamp-, virus- eller bakterieinfektion.

Fråga din läkare om du är osäker. Det är viktigt att säkerställa att Ciclesonide Sandoz är rätt läkemedel för dig.

Under behandling med Ciclesonide Sandoz ska du **omedelbart** kontakta läkare om:

- du får svårt att andas, och symtom som hosta, andfåddhet, pipande/väsande andning, trånghetskänsla i bröstet, ökade andningsljud (ronki) eller andra symtom på trängre luftvägar förvärras.

(Du ska använda din snabbverkande inhalator som normalt ger snabb förbättring.)

- du vaknar på natten av dina symtom.
- symtomen inte lindras av din snabbverkande inhalator.

Läkaren kommer att besluta om den fortsatta behandlingen.

Särskilda patientgrupper

Patienter med svår astma riskerar att drabbas av akuta astmaanfall. För sådana patienter kommer läkaren att genomföra regelbundna och noggranna astmakontroller, även lungfunktionstester.

Patienter som redan tar kortikosteroidtablett(er)

Ciclesonide Sandoz kan användas som ersättning för dina tabletter eller för att minska antalet tabletter som du behöver ta. Följ läkarens anvisningar noga.

- Det här inleds ungefär en vecka efter det att du börjar med inhalationerna av Ciclesonide Sandoz.
- Antalet tabletter som du ska ta kommer att trappas ned försiktigt under en tidsperiod.
- Under denna period kan du ibland må allmänt dåligt.
- Det är viktigt att du trots det fortsätter att både inhalera Ciclesonide Sandoz och långsamt trappa ned antalet tabletter som du tar.
- Om du får allvarliga symtom som illamående, kräkningar, diarré eller feber ska du kontakta läkare.
- Denna process kan ibland avslöja lindrigare allergier, som rinit (inflammation i näsan) eller eksem (kliande, röd hud).
- Om du har gått över från tabletter kommer den risk för nedsatt binjurefunktion som är förenad med kortikosteroidtablettarna att kvarstå under en tid. Symtomen på nedsatt binjurefunktion (t.ex. yrsel, svimning, illamående, nedsatt aptit, nedslagenhet minskad kroppsbehåring, oförmåga att hantera stress, svaghet, huvudvärk, minnesproblem, allergier, matbegär och rubbning av blodsockerhalten) kan också kvarstå under en tid.
- Du kan behöva gå till en specialist för att ta reda på i vilken grad binjurefunktionen är nedsatt.
- Din läkare kommer också att regelbundet kontrollera din binjurefunktion.
- Under stressiga perioder, t.ex. om du ska genomgå en operation eller har förvärrade astmaanfall, är det möjligt att du behöver extra kortikosteroidtablett(er). **I så fall måste du alltid bära ett steroidvarningskort** med denna information.

Patienter med lever- eller njursjukdom

Det finns ingen anledning att justera dosen av ciklesonid om du har lever- eller njurproblem. Om du har en svår leversjukdom kommer din läkare att undersöka dig noggrant med tanke på eventuella biverkningar till följd av rubbad steroidproduktion.

Barn under 12 års ålder:

Detta läkemedel rekommenderas inte för barn under 12 år eftersom data om eventuella effekter saknas.

Andra läkemedel och Ciclesonide Sandoz

Innan du använder Ciclesonide Sandoz ska du tala om för din läkare om du för närvarande behandlas för en svamp- eller virusinfektion med läkemedel som innehåller:

- ketokonazol
- itrakonazol
- kobicistat
- ritonavir
- nelfinavir.

Dessa läkemedel kan förstärka Ciclesonide Sandoz verkan på ett sådant sätt att det inte går att utesluta risken för eventuella biverkningar, och din läkare kan vilja hålla dig under noggrann uppsikt om du tar dessa läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Ciclesonide Sandoz med mat och dryck

Ciclesonide Sandoz påverkas inte av mat och dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

- Eftersom det inte finns tillräcklig information om Ciclesonide Sandoz effekter på gravida kvinnor kommer din läkare att diskutera fördelarna och riskerna med att använda Ciclesonide Sandoz med dig.
- Ciklesonid (den aktiva substansen i Ciclesonide Sandoz) får tas under graviditet endast när den möjliga nyttan för modern anses väga tyngre än den potentiella risken för det växande fostret. Om din läkare bestämmer att du kan fortsätta att använda Ciclesonide Sandoz kommer du att få ta den längsta möjliga dos ciklesonid som krävs för att kontrollera astman.
- Binjurefunktionen kommer att övervakas noga hos barn till mödrar som fått kortikosteroider under graviditeten.
- Prata med din läkare om du vill använda Ciclesonide Sandoz under amning.
- Det är inte känt om inhalerat ciklesonid går över i bröstmjölk.
- Förskrivning av Ciclesonide Sandoz till ammande kvinnor övervägs därfor endast om den förväntade nyttan för modern anses väga tyngre än den potentiella risken för barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Ciclesonide Sandoz och dess innehållsämnen har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Ciclesonide Sandoz innehåller etanol (alkohol)

Detta läkemedel innehåller 4,7 mg alkohol (etanol) per dos. Mängden i en dos av detta läkemedel motsvarar mindre än 1 ml öl eller vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

3. Hur du använder Ciclesonide Sandoz

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- Om du nyss har börjat använda detta läkemedel i stället för, eller tillsammans med kortikosteroidtablett(er), se avsnitt 2, *Patienter som redan tar kortikosteroidtablett(er)*.

Hur mycket Ciclesonide Sandoz ska du ta varje dag?

Din läkare har talat om för dig hur mycket läkemedel du ska ta varje dag. Detta beror på hur mycket just du behöver.

- Den rekommenderade dosen av Ciclesonide Sandoz är 160 mikrogram en gång om dagen, vilket ger astmakontroll hos de flesta patienter.
- Hos vissa patienter kan en lägre dos om 80 mikrogram en gång om dagen vara tillräcklig för att effektivt kontrollera astman.
- För patienter som drabbas av en kraftig försämring av astmasymtomen kan det vara nödvändigt att öka dosen under en kort period. Detta kan innebära upp till 640 mikrogram per dag, men det finns inga data som visar ytterligare effekt med dessa högre doser efter 3 månader.

Vid behov kan läkaren också förskriva kortikosteroidtablettter och/eller, vid infektion, antibiotika.

- Läkaren kommer att ställa in din dos till den längsta dos som behövs för att kontrollera astman.
- Du bör börja märka en förbättring av symtomen (pipande/väsande andning, trånghetskänsla i bröstet och hosta) inom 24 timmar.

När ska du använda Ciclesonide Sandoz?

I de flesta fall, antingen på morgonen eller på kvällen – en eller två puffar en gång om dagen. Följ läkarens anvisningar mycket noga. Det är viktigt att du tar Ciclesonide Sandoz regelbundet varje dag, även om du mår bättre.

Om du märker att du behöver använda din snabbverkande astmamedicin mer än 2–3 gånger i veckan ska du kontakta läkare för en genomgång av medicineringen.

Hur använder du Ciclesonide Sandoz-inhalatorn?

Det är viktigt att en läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal har visat dig hur du använder Ciclesonide Sandoz-inhalatorn på rätt sätt. Med rätt teknik kommer du att få rätt mängd läkemedel till lungorna. Använd instruktionerna i den här bipacksedeln som minnesstöd.

Du kan öva framför spegeln de första gångerna tills du är säker på att du använder Ciclesonide Sandoz-inhalatorn rätt. Se till att läkemedelspuffen inte läcker ut ovanför, nedanför eller vid sidan av munnen.


Om inhalatorn är ny eller om du inte har använt den på en vecka eller mer, **måste** du kontrollera den före användningen. Ta bort skyddslocket från munstycket och tryck **tre** gånger på behållaren i inhalatorn så att det kommer ut **tre** puffar i luften – i riktning från dig.

Du behöver **inte** skaka Ciclesonide Sandoz-inhalatorn innan du använder den. Läkemedlet har redan formen av en mycket finfördelad lösning som är blandad så att du får rätt dos vid varje puff.

När du inhalerar ska du helst sitta ellerstå.

Följ anvisningarna noga:

1. Ta av munstyckets skyddslock och kontrollera på in- och utsidan att munstycket är rent och torrt.



2. Håll inhalatorn upp och ned (med behållarens botten uppåt) med pekfingret på behållarens botten och tummen på undersidan, under munstycket.




3. Andas ut så mycket du kan utan att överanstränga dig. Andas inte ut i inhalatorn.

4. Sätt munstycket i munnen och slut läpparna tätt omkring det.




5. Just när du börjar andas in genom munnen trycker du på inhalatorns ovansida med pekfingret så att det kommer en puff. Fortsätt att andas in långsamt och djupt. Se till att läkemedelspuffen inte läcker ut ovanför, nedanför eller vid sidan av munnen.

6. Håll andan, ta bort inhalatorn från munnen och ta bort fingret från inhalatorns ovansida. Fortsätt att hålla andan i ungefär tio sekunder eller så länge som det känns bra. Andas ut långsamt genom munnen. Andas inte ut genom inhalatorn.




Det är viktigt att du inte har för bråttom med stegen 3–6.

7. Om du ska ta en puff till, vänta i ungefär en halv minut och upprepa sedan stegen 3 till 6.



8. När du är klar ska du alltid sätta på skyddslocket på munstycket så att det hålls rent från damm. Sätt på det ordentligt så att det klickar på plats.



9. Av hygienskäl ska du
 - en gång per vecka rengöra inhalatorns munstycke med en **torr** pappersservett både på in- och utsidan. Ta av munstyckets skyddslock, men avlägsna inte inhalatorns behållare ur plastfodralet.
 - använda en torr, vikt pappersservett och torka över det lilla hålet på framsidan där läkemedlet kommer ut.
 - **inte** använda vatten eller annan vätska.

Med rätt teknik får du rätt mängd Ciclesonide Sandoz till lungorna varje gång du använder inhalatorn. Läkaren kommer att kontrollera din inhalationsteknik regelbundet för att försäkra sig om att behandlingen har bästa möjliga effekt.

När behållaren är helt tom kommer du att känna eller höra att det inte kommer någon drivgas.

Om din andning blir pipande/väsande eller om det känns trångt i bröstet när du har använt Ciclesonide Sandoz:

- **ta inte fler puffar.**
- **använd din snabbverkande inhalator för att andas lättare.**
- **kontakta omedelbart läkare.**

Läkaren kan rekommendera att du använder en spacer om du tycker att det är svårt att använda inhalatorn. Den spacer som passar till Ciclesonide Sandoz-inhalatorn heter AeroChamber Plus Flow-Vu spacer. Följ den medföljande bruksanvisningen om du använder AeroChamber Plus Flow-Vu spacer.

Läkare eller apotekspersonal kan ge dig råd om spacern.

Om du har använt för stor mängd av Ciclesonide Sandoz

Det är viktigt att du tar dosen enligt läkarens anvisningar. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta vårdpersonal.

Du behöver inte någon särskild behandling om du har använt för stor mängd Ciclesonide Sandoz, men du ska tala om det för din läkare. Vid användning av höga doser under lång tid går det inte att utesluta att binjurefunktionen sätts ned i viss grad, och det kan vara nödvändigt att kontrollera binjurefunktionen.

Om du har glömt att använda Ciclesonide Sandoz

Om du har glömt att använda Ciclesonide Sandoz tar du helt enkelt nästa dos på rätt tid. Ta inte dubbla antalet puffar för att kompensera för den glömda dosen.

Om du slutar att använda Ciclesonide Sandoz

Även om du mår bättre ska du inte sluta att använda Ciclesonide Sandoz.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att använda detta läkemedel måste du omedelbart tala om det för din läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du märker någon av följande allvarliga biverkningar, sluta använda detta läkemedel och kontakta omedelbart din läkare:

- svåra allergiska reaktioner, såsom svullnad av läppar, tunga och svalg (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)
- allergiska reaktioner: hudutslag, rodnad, kåda och nässelutslag, (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
- hosta eller pipande/väsande andning som förvärras snabbt efter inhalation (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Övriga biverkningar som observerats med Ciclesonide Sandoz är vanligen lindriga. I de flesta fall kan du fortsätta med behandlingen. Du kan komma att känna av följande biverkningar:

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- heshet
- sveda, inflammation, irritation i mun eller hals
- muntorsk (svampinfektion i munnen)
- huvudvärk
- förändrad smakupplevelse

- torrhet i mun eller hals
- illamående eller kräkningar.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- hjärtklappning (palpitationer)
- obehag eller smärta i buken
- högt blodtryck.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- sömnpproblem, depression, ängslighet, rastlös, oro, känsla av att vara väldigt uppjagad och/eller retlig. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.

Ciclesonide Sandoz kan påverka kroppens normala produktion av kortikosteroider. Detta händer vanligen patienter som tar höga doser under lång tid. Dessa effekter kan omfatta:

- förlängsammad tillväxt hos ungdomar
- benskört
- eventuellt grumling av ögats lins (katarrakt/grå starr) som orsakar dimsyn
- synnedsättning på grund av onormalt högt tryck i ögat (glaukom/grön starr)
- månformat ansikte, viktökning i den övre delen av kroppen och smalare armar och ben (cushingoida drag eller Cushings syndrom).

Ungdomar som behandlas under lång tid ska gå på regelbundna längdkontroller hos läkare. Vid tillväxthämning kommer din läkare om möjligt att justera dosen till den lägsta dosen som behövs för att fortfarande kontrollera astman effektivt.

Kortikosteroidtablettor kan ge fler biverkningar än en inhalerad kortikosteroid som Ciclesonide Sandoz. Om du har tagit steroidtablettor innan du började använda Ciclesonide Sandoz eller under behandling med Ciclesonide Sandoz kan risken för biverkningar från tablettorna kvarstå under en tid. Regelbundna läkarkontroller kommer att säkerställa att den dos Ciclesonide Sandoz du tar är rätt dos för dig. Regelbundna läkarkontroller innebär också att eventuella biverkningar upptäcks tidigt, och därmed minskar risken för att de förvärras.

Kom ihåg:

Om några biverkningar blir värre eller om du märker biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Ciclesonide Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Behållaren innehåller en spraylösning. Förvaras vid högst 50 °C.

Behållaren får inte punkteras, skadas eller bränna ens om den förefaller att vara tom.

Liksom för de flesta inhalationsläkemedel i tryckbehållare kan behandlingseffekten av detta läkemedel minska när behållaren är kall. Ciclesonide Sandoz ger emellertid en jämn dos från -10 °C till +40 °C.

Om läkaren bestämmer att du ska sluta med behandlingen eller om inhalatorn är tom ska du lämna tillbaka den till apoteket för säkert omhändertagande. Detta är viktigt eftersom det kan finnas små mängder läkemedel kvar i behållaren, även om du tycker att den verkar vara tom.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ciklesonid. Varje tryckning på behållaren ger en puff (dos som avges genom munstycket) som innehåller antingen 80 eller 160 mikrogram ciklesonid.
- Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol och drivgas.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ciclesonide Sandoz innehåller en klar och färglös vätska i en tryckbehållare av aluminium som avger en noga uppmätt dos ciklesonid i form av spray genom munstycket.

Ciclesonide Sandoz 80 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning

Läkemedelsbehållaren är placerad i ett plastfodral med ett spraymunstycke och grönt skyddslock.

Ciclesonide Sandoz 160 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning

Läkemedelsbehållaren är placerad i ett plastfodral med ett spraymunstycke och violett skyddslock.

Förpackningsstorlek

120 uppmätta doser

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Genetic S.p.A., Contrada Canfora Z I, Fisciano SA 84084, Italien

Den här bipacken ändrades senast 23.01.2024