

## Pakkausselostetiedot

### Amorion 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Amorion 750 mg kalvopäällysteiset tabletit

amoksisilliini

**Lue tämä pakkausselostetiedot huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tiedot.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle (tai lapsellesi) eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselostetiedossa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselostetiedotessa kerrotaan:**

1. Mitä Amorion on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Amorion-tabletteja
3. Miten Amorion-tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Amorion-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### 1. Mitä Amorion on ja mihin sitä käytetään

##### Mitä Amorion on

Amorion on antibiootti. Vaikuttava aine on amoksisilliini. Se kuuluu penisilliinien lääkeaineryhmään.

##### Mihin Amorion-tabletteja käytetään

Amorion-tabletteja käytetään eri puolilla elimistöä esiintyvien bakteeri-infektioiden hoitoon. Amorion-tabletteja voidaan käyttää myös mahahaavan hoitoon yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

#### 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Amorion-tabletteja

##### Älä otta Amorion-tabletteja

- jos olet allerginen amoksisilliinille, penisilliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos olet joskus saanut vaikean allergisen reaktion mistä tahansa antibiootista. Tällainen reaktio voi olla ihottuma tai kasvojen tai kurkun turvotus.

Älä otta Amorion-tabletteja, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amorion-tabletteja.

##### Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amorion-tabletteja, jos:

- sairastat rauhaskuumetta (kuume, kurkkukipu, turvonneet rauhaset ja äärimmäinen väsymys)
- sinulla on munuaisongelma
- virtsaaminen ei ole säännöllistä.

Ellet ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amorion-tabletteja.

### **Veri- ja virtsakokeet**

Jos sinulle tehdään:

- virtsakokeita (glukoosin määritys) tai verikokeita maksan toiminnan tutkimiseksi
- estriolikokeita (käytetään raskauden aikana tarkistamaan, kehittykyö sikiö normaalisti)kerro lääkärille tai apteekkienhenkilökunnalle, että käytät Amorion-tabletteja. Tämä sen vuoksi, että Amorion voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin.

### **Muut lääkevalmisteet ja Amorion**

Kerro lääkärille tai apteekkienhenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

- jos käytät allopurinolia (kihtilääke) yhtäkaa Amorion-tablettien kanssa, todennäköisyyss saada allerginen ihoreaktio voi suurentua
- jos käytät probenesidiä (kihtilääke), lääkäri saattaa päättää muuttaa Amorion-tablettien annosta. Probenesidin samanaikainen käyttö voi vähentää amoksisiiliinin eritymistä, eikä samanaikaista käyttöä suositella
- jos käytät verenohennuslääkeitä (kuten varfariinia), ylimääräiset verikokeet saattavat olla tarpeen
- jos käytät muita antibiootteja (kuten tetrasykliiniä), Amorion-tablettien teho saattaa heikentyä
- jos käytät metotreksaattia (käytetään syövän ja vaikean psoriaasin hoitoon), penisilliinit voivat vähentää metotreksaatin eritymistä ja saattavat täten lisätä haittavaikutuksia.

### **Raskaus ja imetyks**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

### **Ajamineen ja koneiden käyttö**

Amorion voi aiheuttaa haittavaikutuksia joiden oireet (kuten esim. allergiset reaktiot, huimaus ja kouristukset) saattavat heikentää ajokykyäsi. Älä aja tai käytä koneita, ellet voi hyvin.

### **Apuaineet**

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

## **3. Miten Amorion-tabletteja otetaan**

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt tai apteekkienhenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäristä tai apteekista, jos olet epävarma.

- Tabletit voidaan ottaa joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä
- Ota annokset tasaisin välein vuorokauden aikana siten, että annosten välissä on vähintään 4 tuntia.

Tavanomainen annos on:

### **Alle 40 kg painavat lapset**

Kaikki annokset perustuvat lapsen painoon kilogrammoina.

- Lääkäri määräää, kuinka paljon Amorion-tabletteja vauvalle tai lapselle pitää antaa.

- Tavanomainen annos on 40–90 mg painokiloa kohti vuorokaudessa, ja se annetaan jaettuna kahteen tai kolmeen annokseen.
- Suurin suositeltu annos on 100 mg painokiloa kohti vuorokaudessa.

### **Aikuiset, iäkkääät potilaat ja vähintään 40 kg painavat lapset**

Tavanomainen Amorion-annos on 250–500 mg kolme kertaa vuorokaudessa tai 750 mg–1 g 12 tunnin välein infektion vaikeusasteesta ja tyypistä riippuen.

- **Vaikeat infektiot:** 750 mg–1 g kolme kertaa vuorokaudessa.
- **Virtsatieinfektiot:** 3 g kahdesti päivässä yhden päivän ajan.
- **Lymen tauti (puutiaisten levittämä infekktio):** Yksittäinen *erythema migrans* eli vaeltava punoitus (varhaisvaihe – punainen tai vaaleanpunainen pyöreä ihottuma-alue): enintään 4 g vuorokaudessa. Yleisoireita (myöhäisvaihe – oireet ovat vakavampia tai tauti on yleistynyt elimistöön): enintään 6 g vuorokaudessa.
- **Mahahaavat:** yksi 750 mg:n annos tai yksi 1 g:n annos kaksi kertaa vuorokaudessa 7 vuorokauden ajan yhdessä muiden antibioottien ja lääkkeiden kanssa mahahaavan hoitoon.
- **Sydäntulehdusten ehkäisy leikkausten aikana:** annos vaihtelee leikkaustyypistä riippuen. Myös muita lääkkeitä voidaan antaa samanaikaisesti. Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja voi kertoa tästä tarkemmin.
- Suurin suositeltu annos on 6 g vuorokaudessa.

### **Munuaistongelmat**

Jos sinulla on munuaisten toimintaan liittyviä ongelmia, sinulle saatetaan määräätä normaalialia pienempia annoksia.

### **Jos otat enemmän Amorion-tabletteja kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

Liian suuri Amorion-annos voi aiheuttaa mahaärsytystä (pahoinvointia, oksentelua tai ripulia) tai kidevirtsaisuutta, jonka oireita voivat olla samaa virtsa tai virtsaamisvaikeudet. Ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin. Ota lääke mukaasi ja näytä sitä lääkärille.

### **Jos unohdat ottaa Amorion-tabletteja**

- Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat sen.
- Älä otta seuraavaa annosta liian aikaisin. Odota noin 4 tuntia ennen kuin otat seuraavan annoksen.
- Älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

### **Kuinka pitkään Amorion-tabletteja ote taan**

- Jatka Amorion-tablettien käyttöä niin kauan kuin lääkäri on määränyt, vaikka olosi tuntuisi paremmalta. Tarvitset jokaisen annoksen, jotta tulehduskesi paranee. Jos elimistöön jää bakteereja lääkekuvurin jälkeen, tulehdus saattaa uusiutua.
- Jos tunnet itsesi sairaaksi vielä, kun olet lopettanut hoidon, ota uudelleen yhteyttä lääkäriin.

Pitkään jatkuva Amorion-hoito saattaa johtaa hiivasieni-infektion kehittymiseen limakalvoille tai kosteille ihoalueille, joka voi aiheuttaa arkuutta, kutinaa ja valkovuotoa. Kerro lääkärille, jos näin tapahtuu.

Jos saat Amorion-hoitoa pitkään, lääkäri saattaa määräätä ylimääräisiä munuaisten ja maksan toimintakokeita ja verikokeita näiden normaalilta tarkistamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.

#### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

##### **Lopeta Amorion-tablettien käyttö ja hake udu heti lääkärin hoitoon, jos havaitset jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista – saat tarvita kiireellistä hoitoa:**

Seuraavat haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta):

- allergiset reaktiot, joiden oireita voivat olla: ihmisen kutina tai ihottuma, kasvojen, huulten, kielen tai kehon turpoaminen tai hengitysvaikeudet. Nämä oireet voivat olla vakavia, ja joissakin tapauksissa ne ovat johtaneet kuolemaan.
- ihottuma tai hyvin pienet litteät pyöreät punaiset täplät ihmisen alla tai mustelmat. Tämä johtuu allergisen reaktion aiheuttamasta verisuonten seinämien tulehdusreaktiosta. Siihen voi liittyä myös nivelpipua (niveltulehdus) ja munuaisten toimintahäiriötä.
- viivästynyt allerginen reaktio voi ilmaantua yleensä 7–12 vuorokauden kuluttua Amorion-tablettien ottamisesta. Sen oireita voivat olla: ihottumat, kuume, nivelpiput ja suurentuneet imusolmukkeet, erityisesti kainaloissa.
- ihmerekaktio, josta käytetään nimitystä *erythema multiforme* (eli monimuotoinen punavihoittuma). Siihen liittyviä oireita voivat olla: kutiavat violetinpunaiset läiskät ihmelle, erityisesti kämmenissä tai jalkapohjissa, nokkosihottumaa muistuttavat koholla olevat turvonneet ihoalueet, aristavat alueet suun, silmien ja sukuelinten limakalvoilla. Myös kuumetta ja voimakasta väsymystä saattaa esiintyä.
- muita vaikeita ihmerekatioita voivat olla: ihmisen värimuutokset, kyyhmyt ihmisen alla, rakkulat, märkärakkulat, ihmisen kuoriutuminen, punoitus, kipu, kutina, hilseily. Näihin oireisiin voi liittyä kuumetta, päänsärkyä ja särkyjä eri puolilla kehoa.
- flunssan kaltaiset oireet ja ihottuma, kuume, rauhasten turvotus ja epänormaalit verikokeiden tulokset (mukaan lukien lisääntynyt valkosolujen määrä (eosinofilia) ja maksentsyyminen määrä) (lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofilinen reaktio (DRESS))
- kuume, vilunväristykset, kurkkukipu tai muut infektion merkit tai altius mustelmien muodostumiselle. Nämä voivat olla merkki verisoluihin liittyvistä ongelmista.
- *Jarisch-Herxheimerin reaktio*, joka ilmenee Amorion-hoidon aikana Lymen taudin hoidossa, ja joka aiheuttaa kuumetta, vilunväristyksiä, päänsärkyä, lihaskipua ja ihmisen.
- paksusuolitulehdus, johon liittyy ripulia (toisinä veristä ripulia), kipua ja kuumetta
- vakavia maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia voi esiintyä. Niitä esiintyy pääasiassa pitkään hoitoa saaneilla potilailla, miehillä ja jäkkäillä potilailla. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla esiintyy:
  - vaikeaa ripulia, johon liittyy verenvuotoa
  - rakkuloita, punoitusta tai mustelmia ihmelle
  - virtsan tummumista ja vaaleampia ulosteita
  - ihmisen tai silmänvalkuisten keltaisuutta (keltatauti). Katso jäljemppä myös anemiaa koskevat tiedot, sillä anemiakin voi aiheuttaa keltaisuutta.

Näitä voi esiintyä lääkkeen käytön aikana tai jopa useita viikkoja sen jälkeen.

##### **Lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin edellä mainittu oire.**

##### **Joskus voi ilmaantua lievämpiä ihmerekatioita, kuten:**

- lievästi kutiavaa ihmisenaa (pyöreitä, vaaleanpunaisia tai punaisia läiskiä), nokkosihottumaa muistuttavia turvonneita alueita kyynärvarsissa, jaloissa, kämmenissä, käissä tai jalkaterissä. Tämä on melko harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta).

## **Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista, sillä tällöin Amorion-hoito on lopetettava.**

Muut mahdolliset haittavaikutukset ovat:

### **Yleiset** (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

- ihottuma
- pahoinvointi
- ripuli.

### **Melko harvinaiset** (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

- oksentelu.

### **Hyvin harvinaiset** (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta):

- hiivasieni-infektio (emättimessä, suussa tai ihopoimuissa). Voit saada hoitoa hiivasieni-infektioon lääkäriltä tai apteekista.
- munuaisongelmat
- kouristuskohtaukset (kouristukset). Näitä on esiintynyt suuria annoksia saaneilla potilailla tai potilailla, joilla on munuaisongelmia.
- huimaus
- yliaktiivisuus
- kieli voi muuttua keltaiseksi, ruskeaksi tai mustaksi, ja sen pinta saattaa näyttää karvaiselta
- tietyntyypinen anemia, joka johtuu punasolujen liiallisesta hajoamisesta. Oireita ovat: väsymys, päänsärky, hengenahdistus, huimaus, kalpeus ja ihmisen ja silmänvalkuisten keltaisuus.
- alhainen valkosolujen määrä
- alhainen veren hytytymiseen osallistuvien solujen määrä
- veren hytytyminen voi kestää normaalista kauemmin. Saatat huomata sen, jos sinulla on nenäverenvuotoa tai saat haavan.

### **Esiintymistihes tuntematon** (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arvioointiin):

- rintakipu allergisen reaktion yhteydessä, mikä voi olla oire allergian aiheuttamasta sydäninfarktista (Kounisin oireyhtymä).
- lääkkeen aiheuttamaa enterokoliittista oireyhtymää (DIES) on raportoitu pääasiassa amoksisilliinia saavilla lapsilla. Se on tietynlainen allerginen reaktio, jonka pääoire on toistuvaa oksentamista (1–4 tuntia lääkkeen otosta). Muita oireita voivat olla vatsakipu, voimakas väsymys (letargia), ripuli ja matala verenpaine.
- kidevirtsaisuus, joka johtaa akuuttiin munuaisvauroon. Kidevirtsaisuus voi aiheuttaa virtsan sameutta, virtsaamisvaikeuksia tai kipua virtsatessa. Juo riittävästi nesteitä vähentääksesi näiden oireiden riskiä.
- rakkulainen ihottuma, joka muodostaa ympyrän, jonka keskusta karstoittuu tai on helminaumainen (lineaarinen IgA-sairaus).
- aivoja ympäröivien kalvojen ja selkäytimen tulehdus (aseptinen aivokalvontulehdus).

## **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

## 5. Amorion-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämääärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### Mitä Amorion sisältää

- Vaikuttava aine on amoksisilliinitrihydraatti vastaten amoksisilliinia joko 500 mg tai 750 mg per tabletti.
- Muut aineet tablettiyytimessä ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtarikkelysglykolaatti (Tyyppi A), magnesiumstearaatti ja povidoni.
- Muut aineet kalvopäällysteessä ovat hypromelloosi, titaanidioksiidi (E171) ja talkki.

### Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai kermanväriinen, pitkänomainen, kaksoiskupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti.

PVC/PVDC/alumiini -läpipainopakkaus.

Pakkauskoot:

500 mg: 14, 20 ja 30 tablettia

750 mg: 14 ja 20 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### Myyntiluvan haltija

Orion Corporation  
Orionintie 1  
02200 Espoo

### Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma  
Orionintie 1  
02200 Espoo

Sandoz GmbH  
Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Itävalta

**Tämä pakkausselostet on tarkistettu viimeksi 23.2.2023.**

## **Yleisohjeita antibioottien käytöstä**

Antibiootteja käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Ne eivät tehoa virusten aiheuttamiin infekcioihin.

Joskus antibioottikuuri ei tehoa bakterien aiheuttamaan infektoon. Yleisimpiä syitä hoidon tehottomuuteen on se, että infektion aiheuttaneet bakterit ovat vastustuskykyisiä eli resistenttejä käytetylle antibiootille. Siksi ne eivät kuole vaan voivat jopa lisääntyä antibioottiroidosta huolimatta.

Bakterit voivat muuttua resistenteiksi antibiooteille monista eri syistä. Antibioottien huolellinen käyttö auttaa vähentämään bakterien muuttumista resistenteiksi antibiooteille.

Kun lääkäri määrää antibioottikuurin, se on tarkoitettu ainoastaan tämänhetkisen sairautesi hoitoon. Seuraavien ohjeiden noudattaminen auttaa ehkäisemään sellaisten resistenttien bakterien kehittymistä, jotka heikentävät antibioottioidon tehoa.

1. On erittäin tärkeää, että otat antibiootteja oikeina annoksina, oikeisiin aikoihin ja niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt. Lue ohjeet lääkepakkaukseen kiinnitetystä lipukkeesta, ja ellei ymmärrä niitä, pyydä lääkäriä tai apteekkikenkilökuntaa selittämään ne.
2. Älä ota antibioottia, ellei sitä ole määrätty nimenomaan sinulle ja käytä antibioottia vain sen infektion hoitoon, johon se on määrätty.
3. Älä ota antibiootteja, jotka on määrätty jollekin toiselle, vaikka hänenlää olisikin samanlainen infektio kuin sinulla.
4. Älä anna sinulle määrättyjä antibiootteja kenellekään muulle.
5. Jos sinulle jää antibiootetta lääkärin määräämän antibioottikuurin jälkeen, vie jäljelle jääneet antibiootit apteekkiin, jossa ne hävitetään asianmukaisesti.

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Amorion 500 mg filmdragerade tabletter Amorion 750 mg filmdragerade tabletter**

amoxicillin

**Läs noga igenom den här bipackselet innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig (eller ditt barn). Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I den här bipackselet finns information om följande:**

1. Vad Amorion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Amorion
3. Hur du tar Amorion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amorion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Amorion är och vad det används för**

##### **Vad Amorion är**

Amorion är ett antibiotikum. Det aktiva innehållsämnet är amoxicillin, som tillhör läkemedelsgruppen "penicilliner".

##### **Vad Amorion används för**

Amorion används för att behandla infektioner, orsakade av bakterier, i olika delar av kroppen. Amorion kan även användas i kombination med andra läkemedel för att behandla magsår.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Amorion**

##### **Ta inte Amorion**

- om du är allergisk mot amoxicillin, penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du tidigare har fått en svår allergisk reaktion mot något antibiotikum. Det kan till exempel vara hudutslag eller svullnad i ansikte eller svalg.

Ta inte Amorion om något av det ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amorion om du är osäker.

##### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amorion om du:

- har körtelfeber (feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och svår trötthet)
- har njurproblem
- inte urinerar med jämn mellanrum.

Om du är osäker på om något av det ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amorion.

### **Blod- och urinprover**

Om du ska lämna:

- urinprover (glukos) eller blodprover för att kontrollera leverfunktionen
  - östradiolprover (tas under graviditet för att kontrollera att barnet utvecklas normalt)
- ska du tala om för läkare eller apotekspersonal att du tar Amorion. Amorion kan påverka testresultaten.

### **Andra läkemedel och Amorion**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

- om du tar allopurinol (mot gikt) tillsammans med Amorion, kan risken för att få en allergisk hudreaktion öka
- om du tar probenecid (mot gikt) kan läkaren ändra dosen av Amorion. Samtidig användning av probenecid kan minska utsöndringen av amoxicillin och rekommenderas inte.
- om du tar läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin), kan du behöva lämna fler blodprover
- om du tar andra antibiotika (t.ex. tetracyklin) kan Amorion bli mindre effektivt
- om du tar metotrexat (används för cancerbehandling och vid svår psoriasis), penicilliner kan minska utsöndringen av metotrexat, vilket kan leda till en ökning av biverkningar.

### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Amorion kan ha biverkningar och symtomen (till exempel allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan göra dig olämplig som förare. Kör inte något fordon eller använd maskiner om du inte mår bra.

### **Innehållsämne**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

## **3. Hur du tar Amorion**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- Amorion kan tas antingen i samband med måltid eller på tom mage.
- Fördela doserna jämnt över dygnet, med minst 4 timmars mellanrum.

Vanlig dos är:

### **Barn som väger under 40 kg**

Alla doser beräknas grundat på barnets kroppsvekt i kg.

- Läkaren kommer att tala om hur mycket Amorion du ska ge till ditt barn.
- Den vanliga dosen är 40–90 mg per kg kroppsvekt under ett dygn, fördelat på två eller tre doser.
- Den högsta rekommenderade dosen är 100 mg per kg kroppsvekt per dygn.

## **Vuxna, äldre patienter och barn som väger 40 kg eller mer**

Den vanliga dosen Amorion är 250–500 mg tre gånger per dygn, eller 750 mg–1 gram var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.

- **Allvarlig infektion:** 750 mg–1 gram tre gånger per dygn.
- **Urinvägsinfektion:** 3 gram två gånger per dygn under ett dygn.
- **Borrelia (infektion som sprids av fästningar):** Enstaka erythema migrans (tidigt stadium – ett rött eller rosa cirkelformat utslag): upp till 4 gram per dygn. Vid systemiska symtom (sent stadium – vid mer allvarliga symtom eller när sjukdomen sprids i kroppen): Upp till 6 gram per dygn.
- **Magsår:** En dos på 750 mg eller 1 gram två gånger dagligen i 7 dagar tillsammans med andra antibiotika och läkemedel mot magsår.
- **För att förhindra infektion i hjärtat under operation:** Dosen varierar beroende på typen av operation. Andra läkemedel kan också ges samtidigt. Läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kan ge dig närmare information.
- Den högsta rekommenderade dosen är 6 gram per dygn.

### **Njurproblem**

Om du har njurproblem kan du få lägre dos.

### **Om du har tagit för stor mängd av Amorion**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har tagit för mycket Amorion kan du få orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller kristaller i urinen, vilket visar sig som grumlig urin eller problem med att urinera. Tala med läkare så tidigt som möjligt. Ta med dig läkemedlet och visa det för läkaren.

### **Om du har glömt att ta Amorion**

- Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det.
- Ta inte nästa dos alltför snart, utan vänta cirka 4timmar innan du tar nästa dos.
- Ta inte dubbeldos för att kompensera för glömd dos.

### **Hur länge ska du ta Amorion**

- Fortsätt ta Amorion så länge läkaren har sagt, även om du känner dig bättre. Alla doser behövs för att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan infektionen komma tillbaka.
- Om du fortfarande inte mår bra när behandlingen är avslutad ska du söka läkare igen.

Torsk (en svampinfektion som kan uppkomma på fuktiga områden på kroppen och orsaka ömhet, klåda och en vit flytning) kan utvecklas om man använder Amorion under längre tid. Om du får torsk ska du berätta det för din läkare.

Om du tar Amorion under en längre tid kan läkaren vilja ta extra prover för att kontrollera att njurar, lever och blod har normala funktioner.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

**Sluta ta Amorion och sök läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:**

Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- allergiska reaktioner, som kan visa sig som klåda eller hudutslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller kroppen, eller andningssvårigheter. Dessa kan vara allvarliga och dödsfall har förekommit.
- utslag eller platta, knappnärlsstora röda runda prickar under hudytan, eller blåmärken. Dessa orsakas av en inflammation i blodkärlens väggar på grund av en allergisk reaktion. Ledsmärter (artrit) och njurproblem kan förekomma samtidigt.
- fördöjd allergisk reaktion, som oftast uppkommer 7 till 12 dagar efter att man tagit Amorion. Några av tecknen på en sådan reaktion är hudutslag, feber, ledsmärter och förstorade lymfkörtlar, särskilt i armhålorna.
- en hudreaktion kallad ”erythema multiforme”, då du kan få kliande rödlila fläckar på huden, särskilt på handflator och fotsulor, nässelutslagsliknande upphöjda svullnader i huden, ömmande områden i munhåla, ögon och på könsorgan. Du kan få feber och känna dig mycket trött.
- andra allvarliga hudreaktioner kan vara förändrad hudfärg, knölar under huden, blåsor, varblåsor, fjällning, rodnad, smärter, klåda och flagande hud. Feber, huvudvärk och värk i kroppen kan förekomma samtidigt.
- influensaliknande symtom med utslag, feber, svullna körtlar och onormala resultat från blodprov (inklusive ökat antal vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzymer) (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS))
- feber, frossbrytningar, halsont och andra tecken på infektion, eller att du lätt får blåmärken. Detta kan vara tecken på att blodkropparna påverkats.
- *Jarisch-Herxheimers reaktion* kan uppträda då borrelia behandlas med Amorion, och orsaka feber, frossbrytningar, huvudvärk, muskelvärk och hudutslag
- inflammation i tjocktarmen med diarré (ibland blodblandad), smärta och feber
- allvarliga leverbiverkningar kan förekomma. De drabbar främst personer som behandlas under lång tid, män och äldre. Du måste omedelbart tala om för läkaren om du får:
  - svår diarré med blödning
  - blåsor eller rodnader på huden, eller blåmärken
  - mörkare urin eller ljusare avföring
  - gulfärgning av hud eller ögonvitor (gulsot). Läs även om anemi nedan, som kan orsaka gulsot.Dessa biverkningar kan uppkomma under behandlingen eller flera veckor efteråt.

**Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du sluta ta läkemedlet och söka läkare omedelbart.**

**I bland kan det hända att mindre allvarliga hudreaktioner uppstrår, till exempel:**

- lätt kliande utslag (runda, rosaröda fläckar), nässelutslagsliknande svullna områden på underarmar, ben, handflator, händer eller fötter. Detta är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

**Om du får någon av dessa biverkningar ska du tala med din läkare. Behandlingen med Amorion måste avbrytas.**

Andra eventuella biverkningar är:

**Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):**

- hudutslag
- illamående
- diarré.

Mindre vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare*):

- kräkningar.

Mycket sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare*):

- torsk (en jästinfektion i vagina, mun eller hudveck). Läkare eller apotekspersonal kan ge dig läkemedel mot torsk.
- njurproblem
- kramper. Förekommer hos personer som tar höga doser eller har njurproblem.
- yrsel
- hyperaktivitet
- tungan kan missfärgas och bli gul, brun eller svart och få ett hårigt utseende
- kraftig nedbrytning av röda blodkroppar som orsakar en viss typ av anemi (blodbrist). Tecken på detta är: Trötthet, huvudvärk, andfåddhet, yrsel, blekhet och gulaktig hud och ögonvitor.
- lågt antal vita blodkroppar
- lågt antal av den typ av blodkroppar som medverkar i blodkoagulationen
- det kan ta längre tid än normalt för blodet att koagulera. Du kan märka detta om du får näsljud eller skär dig.

Har rapporterats (*förekommer hos ett okänt antal användare*):

- bröstsmärta i samband med allergiska reaktioner, vilket kan vara ett symtom på allergiutlöst hjärtinfarkt (Kounis syndrom).
- Läkemedelsutlöst tarminflammation (enterokolit) har främst rapporterats hos barn som får amoxicillin. Det är en särskild typ av allergisk reaktion med upprepade kräkningar som främsta symtom (1-4 timmar efter intag av läkemedlet). Ytterligare symtom kan vara magont, håglöshet, diarré och lågt blodtryck.
- kristaller i urinen som orsakar akut njurskada. Kristaller i urinen kan visa sig som grumlig urin, eller svårigheter eller smärtor när man kissar. Se till att dricka mycket så minskar risken att få sådana symtom.
- utslag med blåsor i form av en cirkel med en skorpa i mitten eller som ett pärlband (linjär IgA-sjukdom).
- inflammation i membranen som omger hjärnan och ryggmärgen (aseptisk hjärnhinneinflammation).

### Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

### 5. Hur Amorion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen.

Använd inte detta läkemedel om det har synliga tecken på förändringar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är amoxicillintrihydrat, som motsvarar amoxicillin antingen 500 mg eller 750 mg per tablett.
- Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, natriumstarkelseglykolat (Typ A), magnesiumstearat och povidon.
- Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är hypromellos, titandioxid (E171) och talk.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Vit eller gräddfärgad, avlång, dubbelkonvex, filmdragerad tablett med brytskåra.

Blister (PVC/PVDC/Aluminium).

Förpackningsstorlekar:

500 mg: 14, 20 och 30 tablett(er)

750 mg: 14 och 20 tablett(er)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

### **Tillverkare**

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Österrike

**Denna bipacksedel ändrades senast 23.2.2023.**

## Allmänna råd om användning av antibiotika

Antibiotika används för behandling av infektioner orsakade av bakterier. De har ingen verkan på infektioner orsakade av virus.

Ibland händer det att en antibiotikakur inte hjälper mot en bakterieinfektion. En av de vanligaste orsakerna till detta är att den bakterie som orsakar infektioner är resistent (motståndskraftig) mot det antibiotikapreparat som används. Det innebär att bakterien kan överleva och till och med föröka sig trots antibiotikabehandlingen.

Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika på många olika sätt. Genom att vara återhållsam med antibiotika kan man minska risken för att bakterierna blir resistenta.

När du ordineras en antibiotikakur av din läkare är den endast till för att behandla den pågående infektionen. Följ nedanstående rekommendationer så kan du bidra till att förhindra resistensutveckling hos bakterierna, som kan göra att antibiotikapreparatet inte längre har någon verkan.

1. Det är mycket viktigt att du tar ditt antibiotikum med rätt dos, vid rätt tidpunkt och så länge som det är avsett. Läs anvisningarna som medföljer läkemedlet och be läkare eller apotekspersonal att förklara om det är något du inte förstår.
2. Ta inte antibiotika som inte har ordinerats speciellt för dig. Använd det bara för att behandla den infektion för vilket det ordinerades.
3. Ta inte antibiotika som skrivits ut till andra personer, även om de har en infektion som liknar din.
4. Ge inte antibiotika som skrivits ut till dig till någon annan.
5. Om du har antibiotika över när du har tagit en kur enligt läkarens anvisningar ska du ta med dig resterna till apoteket, som tar hand om avfallet på lämpligt sätt.