

Pakkausseloste: Tie toa potilaalle

Deca-Durabolin 50 mg/ml injektioneste, liuos

nandrolonidekanoaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Deca-Durabolin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Deca-Durabolin-valmistetta
3. Miten Deca-Durabolin-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Deca-Durabolin-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Deca-Durabolin on ja mihin sitä käytetään

Vaikuttava aine, nandrolonidekanoaatti, kuuluu anabolisten steroidien ryhmään. Nämä lääkeaineet ovat sukua mieshormonille, testosteronille. Testosteroni saa aikaan miehen tyypilliset sukupuoliominaisuudet (androgeeninen vaikutus). Se myös kiihyttää valkuaisainetuotantoa kudoksissa (anabolinien vaikutus). Nämä lääkeaineet edistävät pitkääikaisen sairauden tai vakavan vamman heikentämien kudosten uudistumista.

Deca-Durabolin-ruiskeen jälkeen nandrolonidekanoaatti vapautuu hitaasti öljypohjaisesta injektionesteestä vereen, missä elimistö muuntaa sen nandroloniksi. Nandroloni on varsinainen vaikuttava aine. Dekanoaatti on lisättynä valmisteeseen siksi, että se identtää annoksen vaikutuksen keston kolmeen viikkoon. Nandrolonilla on voimakkaampi anabolinien vaikutus, mutta heikompi androgeeninen vaikutus kuin testosteronilla. Nandroloni voimistaa kudosten valkuaisainetuotantoa ja edistää siten myös luukudoksen muodostusta. Siksi Deca-Durabolinia voidaan käyttää muun muassa luukudoksen vahvistamiseen osteoporoosin (luukadon) hoidossa. Osteoporoosia esiintyy pääasiassa naisilla vähdevuosien jälkeen. Se johtaa luiden haurastumiseen, mikä lisää luunmurtumien vaaraa, ja siihen liittyy usein ristiselkäsärkyä ja luustokipuja. Deca-Durabolin voi lisätä luumassaa ja lievittää siten näitä oireita.

Deca-Durabolinia voidaan käyttää myös:

- tiettytyyppisten etäpesäkkeiden lähettilälien rintasyöpien hoidossa naisilla
- edistämään painon lisäämistä vaikean tai pitkääikaisen sairauden yhteydessä tai vakavan vammautumisen jälkeen

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Deca-Durabolin-valmistetta

Älä käytä Deca-Durabolin-valmistetta

- jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana (ks. kohta 2 ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”).
- jos olet mies ja sinulla on tai on ollut eturauhassyöpä tai rintasyöpä tai sinulla epäillään tällaista kasvainta.

- jos olet allerginen nandrolonidekanoaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6 ”Mitä Deca-Durabolin sisältää”).
- jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle (ks. kohta 2 ”Deca-Durabolin sisältää maapähkinäöljyä ja bentsyylialkoholia”).

Valmisteen sisältämän bentsyylialkoholin vuoksi valmistetta ei saa antaa keskosille tai vastasyntyneille. Bentsyylialkoholi voi aiheuttaa toksisia ja allergisia reaktioita imeväisikäisillä ja lapsilla jopa 3-vuotiaaseen asti.

Varoitukset ja varotoimet

Jos huomaat maskulinisaation merkkejä (esimerkiksi äänen madaltuminen tai karvoituksen lisääntyminen kasvoissa), ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Anabolisia steroideja sisältävät lääkkeet voivat suurentaa eturauhasta, varsinkin iäkkäillä miehillä. Lääkäri saattaa tutkia miehen eturauhasen ennen Deca-Durabolin-hoidon aloittamista ja säännöllisin väliajoin sen jälkeen tunnustelemalla sitä sormella peräsuolen kautta ja seuraamalla verikokeiden avulla PSA:n (prostataspesifisen antigenin) määrää veressä.

Sinulta voidaan määritää ennen hoidon aloitusta ja säännöllisin väliajoin sen jälkeen hemoglobiini (happea kuljettava osa veren punasoluissa) sekä punasolujen määrä. Hyvin harvoissa tapauksissa punasolujen määrä suurennee siinä määrin, että se aiheuttaa haittoja.

Lääkärintarkastukset saattavat olla tarpeen myös seuraavissa tapauksissa.

Ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, kerro lääkäriille, jos sinulla on ollut, on edelleen tai epäillään olevan:

- rintasyöpä, joka on levinnyt luustoon
- munuais- tai keuhkosyöpä
- sydänsairaus (kuten sydämen vajaatoiminta tai sydäninfarkti)
- munuaissairaus (kuten munuaisten vajaatoiminta)
- maksasairaus (kuten maksan vajaatoiminta, oireena esimerkiksi keltaisuus)
- korkea verenpainet
- diabetes
- epilepsia
- migreeni
- eturauhasvaivoja, kuten virtsaamisvaikeuksia

Lapset ja nuoret

Tämän lääkkeen turvallisuutta ja tehoa lapsilla ja nuorilla ei ole osoitettu.

Lääkäri seuraa lapsen tai nuoren terveydentilaan erityisen tarkkaan hoidon aikana, sillä yleisesti anaboliset steroidit voivat aiheuttaa liian varhaista seksuaalista kehitymistä ja hidastaa kasvua (ks. kohta 4 ”Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla”).

Muut lääkevalmisteet ja Deca-Durabolin

Kerro lääkäriille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä, myös lääkeitä, joita lääkäri ei ole määrennyt.

Muu samanaikainen lääkitys saattaa vaikuttaa Deca-Durabolinin tehoon tai Deca-Durabolin saattaa vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon. Siksi sinun on kerrottava lääkäriille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät tai aiot käyttää:

- insuliinia ja/tai muita lääkeitä verensokeriarvon alentamiseen
- erytropoetiini-valmisteita (anemiaa vähentäviä lääkeitä)
- varfariinia (veren hyttymistä estävä lääke eli antikoagulantti).

Edellä mainittujen lääkkeiden annoksia voidaan joutua pienentämään, mikäli niitä käytetään yhdessä anabolisten steroidien, kuten Deca-Durabolin-valmisteen, kanssa.

Kerro myös lääkärille tai apteekkien henkilökunnalle, jos käytät tai aiot käyttää kortikotropiinia (ACTH) tai kortikosteroideja (käytetään muun muassa reuman, niveltulehduksen, allergisten reaktioiden ja astman hoitoon). Anabolisten steroidien, kuten Deca-Durabolin-valmisteen, käyttö voi lisätä nesteen kertymistä elimistöön, varsinkin jos sydämesi tai maksasi ei toimi kunnolla.

Anabolisten steroidien käyttö voi myös vaikuttaa joihinkin laboratoriolutkimuksiin (esim. kilpirauhastutkimuksiin). Kerro lääkärille tai näitä tutkimuksia tekevälle laboratoriohenkilökunnalle, että käytät Deca-Durabolin-valmistetta.

Deca-Durabolin ruuan ja juoman kanssa

Koska tämä lääke annetaan injektiona, se voidaan antaa huomioimatta ruokailuaikoja tai juomista. Jotta lääke tehoaisi mahdollisimman hyvin, kaikkia lääkärin tai ravitsemusterapeutin antamia ruokavalio-ohjeita on noudatettava huolellisesti. On hyvä noudattaa ruokavaliota, josta saa riittävästi vitamiineja, kivennäisaineita, valkuaisaineita ja energiata.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Naiset, jotka ovat raskaana tai epäilevät olevansa raskaana tai jotka imettävät, eivät saa käyttää tätä lääkettä.

Miehillä Deca-Durabolin voi aiheuttaa hedelmällisyshäiriötä estämällä siittiöiden muodostumista.

Naisilla Deca-Durabolin voi aiheuttaa epäsäännöllisiä kuukautisia tai kuukautisten puuttumisen.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole tunnettuja haitallisia vaikutuksia ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Deca-Durabolin sisältää maapähkinäöljyä ja bentsylyalkoholia

- **Maapähkinäöljyä.** - Jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle, älä käytä tätä lääkevalmistetta (ks. kohta ”Älä käytä Deca-Durabolin-valmistetta”).
- **Bentsylyalkoholia (100 mg/ml).** – Bentsylyalkoholia sisältäviä valmisteita ei saa antaa keskosiille eikä vastasyntyneille. Bentsylyalkoholi voi aiheuttaa myrkytyksen ja allergisia reaktioita imeväisille ja alle 3-vuotiaille lapsille.

Väärinkäyttö

Tämän lääkkeen väärinkäyttö urheilusuoritusten parantamiseksi voi aiheuttaa vakavan terveysriskin eikä Deca-Durabolin-valmistetta saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Lääkkeiden väärinkäyttö ja riippuvuus

Tämän lääkkeen antaa aina lääkäri tai sairaanhoitaja, ja sitä tulee käyttää juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Anabolis-androgeenisten steroidien käyttö voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, jotka kohdistuvat sydämeen ja verisuoniin (ja voivat johtaa kuolemaan), mielenterveyteen ja/tai maksaan. Tämä pitää paikkansa etenkin, jos käytät liian paljon tätä lääkettä joko yksin tai yhdessä testosteronin kanssa. Anabolis-androgeenisia sterioideja väärinkäyttävät henkilöt voivat tulla niistä riippuvaisiksi ja saada vieroitusoireita, jos annostus muuttuu merkittävästi tai lääkkeen ottaminen lopetetaan äkillisesti. Älä väärinkäytä tätä lääkettä yksin tai yhdessä testosteronin kanssa, sillä siihen liittyy vakavia terveysriskejä. (Ks. kohta 4. ”Lääkkeiden väärinkäyttö ja riippuvuus”).

3. Miten Deca-Durabolin-valmistetta käytetään

Tämän lääkkeen voi antaa vain lääkäri tai sairaanhoitaja.

Pistos annetaan syvälle lihakseen (esimerkiksi pakaraan, reiteen tai olkavarteen).

Annostus riippuu sairauden vaikeusasteesta ja elimistön reaktiosta lääkkeeseen. Lääkäri määräää kuhunkin tilanteeseen sopivan annoksen. Yleensä riittävä annos on yksi pistos kolmen viikon välein.

Jos sinusta tuntuu, että tämän lääkkeen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta heti lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Käyttö lapsille ja nuorille

Tämän lääkkeen turvallisuutta ja tehoa lapsilla ja nuorilla ei ole osoitettu. Lääkäri seuraa tästä lääketä käyttävien esimurrosikäisten lasten terveydentilaan tarkasti (ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”).

Jos olet saanut enemmän Deca-Durabolin-valmis tetta kuin sinun pitäisi

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa tämän lääkkeen injektiona sinulle. Jos sinusta tuntuu, että tämän lääkkeen vaikutus on liian voimakas, kerro asiasta heti lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Jos unohdat Deca-Durabolin-injektion

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa tämän lääkkeen injektiona sinulle. Jos sinulta jää aikataulun mukainen injektiota saamatta, kerro asiasta lääkärille tai sairaanhoitajalle niin pian kuin mahdollista. Älä otta kaksinkertaista injektiota korvatakseen unohtamasi injektion.

Jos lopetat Deca-Durabolin-valmisten käytön

Tämän lääkkeen vaikutus ei lakkaa heti, vaan vähitellen lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Jos Deca-Durabolin-hoito lopetetaan, oireesi voivat lisääntyä tai palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Deca-Durabolinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Riippuen annoksesta, annostustihetydestä ja Deca-Durabolin-hoidon kestosta seuraavia androgeeneille tai anabolisille steroidille tunnusomaisia haittavaikutuksia voi esiintyä:

- nesteen kertyminen kudoksiin, mikä ilmenee yleensä nilkkojen tai jalkaterien turvotuksena tai kohonneena verenpaineena
- akne
- masentuneisuus, hermostuneisuus, mielialan muutokset
- muutokset seksuaalisessa halukkuudessa
- pahoinvoiointi
- kutina
- lihaskipu
- hemoglobiiniarvojen nousu
- muutokset veren rasva-arvoissa
- veren punasolujen määärän lisääntyminen (solut, jotka kuljettavat happea veressä)
- maksan toimintahäiriö
- maksan rakennemuutokset
- käheys
- äänen muuttuminen
- karvoituksen lisääntymisen vartalossa ja kasvoissa
- kuukautisten epäsäännöllisyys (tai kuukautiset saattavat jäädä kokonaan pois)
- klitoriksen suureneminen
- siihtimen suureneminen
- rintojen suureneminen miehillä (gynekomastia)

- havaitsematta jääneen pienen eturauhassyöpäkasvaimen kasvun kiihtyminen (piileväoireisen eturauhassyövän eteneminen)
- veren merkkiaineen määränsuureneminen, joka voi liittyä eturauhassyöpään (kohonnut PSA)
- eturauhasen liikakasvu, johon liittyy virtsaamisvaikeuksia
- pitkittyneet, kivuliaat erektilot
- siemennesteen muodostumisen häiriöt
- pituuskasvun hidastuminen
- maskulinisaatio
- tahallinen väärinkäyttö

Deca-Durabolin-valmisten pitkän vaikutusajan vuoksi haittavaikutuksia ei voida nopeasti kumota lopettamalla lääkkeen käyttö. Kaikki injektiovalmisteet voivat aiheuttaa reaktioita pistoskohdassa.

Lääkkeiden väärinkäyttö ja riippuvuus

Tämän lääkkeen väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, etenkin jos käytät liian paljon anabolisia-androgeenisia steroideja joko yksin tai yhdessä testosteronin kanssa. Näitä terveysongelmia voivat olla esimerkiksi merkittävät haittavaikutukset, jotka kohdistuvat sydämeen ja verisuoniin (ja voivat johtaa kuolemaan), mielenterveysteen ja/tai maksaan. (Ks. kohta 2. ”Lääkkeiden väärinkäyttö ja riippuvuus”.)

Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

Anabolisia steroideja käyttävillä esimurrosikäisillä pojilla on havaittu seuraavia haittavaikutuksia:

- varhainen seksuaalinen kehitys
- siittimen suureneminen
- tihentyneet erektilot
- kasvun hidastuminen (pituuskasvun päättyminen)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausloseetessä. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Deca-Durabolin-valmisten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääketä pakkuksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätäytyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Nämä menetellään suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Deca-Durabolin sisältää

- Vaikuttava aine on nandrolonidekanoaatti.
- Yksi ml injektionestettä sisältää 50 mg nandrolonidekanoaattia.
- Muut aineet ovat bentsyylialkoholi (E 1519) ja maapähkinänöljy (puhdistettu).
- Yksi ml injektionestettä sisältää 100 mg bentsyylialkoholia (E 1519).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Deca-Durabolin injektioneste on kirkas, keltainen öljyliuos.

Ampulli: Kirkas lasinen 1 ml:n ampulli, jossa on 1 ml injektionestettä.

Deca-Durabolinia on saatavilla 1 x 1 ml tai 10 x 1 ml pakkuksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti

Tel.: 00358 974790156

Valmistaja

Ever Pharma Jena GmbH,

Otto-Schott-Str. 15,

07745 Jena,

Saksa

tai

Ever Pharma Jena GmbH,

Bruesseler Str. 18,

07747 Jena,

Saksa

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 31.05.2023

Bipacksedel: Information till patienten

Deca-Durabolin 50 mg/ml injektionsvätska, lösning

nandrolondekanoat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande:

1. Vad Deca-Durabolin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Deca-Durabolin
3. Hur du använder Deca-Durabolin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Deca-Durabolin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Deca-Durabolin är och vad det används för

Den aktiva substansen, nandrolondekanoat, tillhör gruppen anabola steroider. Dessa läkemedel är besläktade med det manliga könshormonet, testosteron. Testosteron framkallar typiskt manliga könsskaraktärer (androgen effekt). Substansen stimulerar även bildningen av vävnadsproteiner (anabol effekt). Dessa läkemedel främjar återuppbyggnaden av vävnader som försvagats till följd av en långvarig sjukdom eller svår skada.

Efter insprutning av Deca-Durabolin frisätts nandrolondekanoat långsamt från den oljebaserade injektionsvätskan till blodet där organismen omvandlar det till nandrolon. Nandrolon är den egentliga verksamma substansen. Dekanoat har tillsatts till läkemedlet eftersom det förlänger doseeffekten till tre veckor. Nandrolon har en kraftigare anabol effekt, men en svagare androgen effekt än testosteron. Nandrolon stimulerar alltså vävnadernas produktion av äggvitämnen, men stimulerar även bildningen av benvävnad. Därför Deca-Durabolin kan bland annat användas för att stärka skelettet vid behandling av osteoporos (benskörhet). Osteoporos drabbar huvudsakligen kvinnor efter klimakteriet. Då inträder benskörhet vilket ökar risken för frakturer, varje tillståndet är ofta förknippat med värk i korsryggen och skelettsmärtor. Deca-Durabolin kan öka benmassan och lindrar därigenom dessa symtom.

Deca-Durabolin kan även användas i följande fall:

- vid behandling av kvinnor med vissa former av bröstcancer som tenderar att metastasera
- för att främja viktuppgång i anslutning till svår eller långvarig sjukdom och efter allvarliga trauman

2. Vad du behöver veta innan du använder Deca-Durabolin

Använd inte Deca-Durabolin

- om du är gravid, eller tror att du kan vara gravid (se avsnitt 2 "Graviditet, amning och fertilitet").
- om du är en man som har eller har haft prostata- eller bröstcancer eller misstänks ha en av dessa.
- om du är allergisk mot nandrolondekanoat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 "Innehållsdeklaration").

- om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor (se avsnitt 2 ”Deca-Durabolin innehåller jordnötsölja och bensylalkohol”).

Preparatet innehåller bensylalkohol och bör därför inte ges åt prematurer eller nyfödda. Bensylalkohol kan orsaka toxiska och allergiska reaktioner hos spädbarn och högst 3-åriga barn.

Varningar och försiktighet

Om du märker tecken på maskulinisation (t.ex. rösten djupnar eller ansiktet får behåring), kontakta omedelbart läkare.

Läkemedel som innehåller anabola steroider, kan framkalla prostataförstoring, speciellt hos äldre män. Läkaren kan undersöka din prostata innan du börjar använda Deca-Durabolin samt regelbundet efter det genom ändtarmsöppningen med hjälp av ett finger och genom att ta blodprov för bestämning av prostataspecifikt antigen (PSA).

Ytterligare kan det tas prover av hemoglobin (det protein som transporterar syre i blodet) och av antalet röda blodkroppar innan du börjar använda detta läkemedel samt regelbundet efter det. I mycket sällsynta fall ökar antalet röda blodkroppar så mycket att det orsakar besvär.

Läkarkontroller kan vara nödvändiga även i följande fall.

Därför skall du tala med läkare innan du börjar använda detta läkemedel om du har eller har haft eller misstänks ha:

- bröstcancer, som har spridit sig till benbyggnaden
- njur- eller lungcancer
- en hjärtsjukdom (såsom hjärtsvikt eller hjärtinfarkt)
- en njursjukdom (såsom njursvikt)
- en leversjukdom, (såsom leverinsufficiens, med symtom som t.ex. guldot)
- högt blodtryck
- diabetes
- epilepsi
- migrän
- prostatabesvär, såsom urineringssvårigheter.

Barn och ungdomar

Läkemedlets säkerhet och effekt har inte påvisats hos barn och ungdomar.

Läkaren följer extra noggrant upp hälsotillståndet hos barn och ungdomar eftersom anabola steroider kan framkalla alltför tidig sexuell utveckling och begränsa tillväxten (se avsnitt 4 ”Barn och ungdomar”).

Andra läkemedel och Deca-Durabolin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Annan samtidig medicinering kan påverka effekten av Deca-Durabolin och Deca-Durabolin kan påverka effekten av andra läkemedel. Därför ska du tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller tänker använda:

- insulin och/eller andra läkemedel för att sänka blodsockernivån
- erythropoietin (läkemedel som minskar blodbrist)
- warfarin (läkemedel som hämmar blodets koagulering dvs. antikoagulant).

Användning av anabola steroider, såsom Deca-Durabolin, kan leda till en minskning av dosen för dessa läkemedel.

Tala även om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller tänker använda adrenokortikotropiskt hormon (ACTH) eller kortikosteroider (används bland annat vid reumatism, ledinflammation, allergiska tillstånd och astma). Användning av anabola steroider, såsom Deca-

Durabolin, kan öka risken för vätskeansamling i vävnaderna, i synnerhet om hjärtat eller levern inte fungerar som de ska.

Anabola steroider kan även påverka vissa laboratorieundersökningar (t.ex. sköldkörtelundersökning). Tala om för läkare eller laboratoriepersonal, som utför undersökningarna, ifall du använder Deca-Durabolin.

Deca-Durabolin med mat och dryck

Eftersom detta läkemedel injiceras, kan det ges utan att ta i beaktande måltider eller dryck.

För att läkemedlet skall ha bästa möjliga effekt måste de kostföreskrifter som lämnas av läkaren eller en dietist följas strikt. Det är bra att följa en diet som innehåller riktigt med vitaminer, mineralämnen och proteiner samt mycket energi.

Graviditet, amning och fertilitet

Detta läkemedel får inte användas hos kvinnor som är gravida, misstänker att de är gravida eller ammar.

Hos män kan behandling med Deca-Durabolin leda till fertilitetsstörningar genom att hämma spermieproduktionen.

Hos kvinnor kan behandling med Deca-Durabolin leda till oregelbunden eller utebliven menstruation.

Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen känd effekt på körförstågan och användning av maskiner.

Deca-Durabolin innehåller jordnötsolja och bensylalkohol

- **Jordnötsolja.** - Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor (se ”Använd inte Deca-Durabolin”).
- **Bensylalkohol (100 mg/ml).** - Läkemedel som innehåller bensylalkohol får ej ges till pre maturen eller spädbarn. Bensylalkohol kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år.

Missbruk

Missbruk av detta läkemedel för att förbättra idrottsprestationer kan innehåra allvarlig hälsorisk och Deca-Durabolin får inte användas till sådant ändamål.

Läkemedelsmissbruk och beroende:

Detta läkemedel ska bara ges av läkare eller sjuksköterska. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Missbruk av anabola androgena steroider, särskilt om du använder för mycket av detta läkemedel ensamt eller tillsammans med testosteron, kan orsaka allvarliga hälsoproblem för hjärta och blodkärl (vilket kan leda till döden), den psykiska hälsan och/eller levern. Personer som missbrukar anabola androgena steroider kan bli beroende och uppleva abstinenssymtom när dosen förändras avsevärt eller plötsligt stoppas. Du ska inte missbruka detta läkemedel ensamt eller tillsammans med testosteron eftersom det medför allvarliga hälsorisker. (Se avsnitt 4. ”Läkemedelsmissbruk och beroende”.)

3. Hur du använder Deca-Durabolin

Detta läkemedel får endast injiceras av läkare eller sjuksköötare.

Läkemedlet injiceras djupt in i muskeln (exempelvis i stussen, låret eller överarmen).

Doseringen beror på sjukdomens svårighetsgrad och på hur organismen reagerar på medicinen. Läkaren ordinerar en individuellt anpassad dos. I allmänhet är den tillräckliga dosen en injektion var tredje vecka.

Om du upplever att effekten av detta läkemedel är för stark eller för svag, ska du genast informera läkare eller sjuksköterska om det.

Användning för barn och ungdomar

Läkemedlets säkerhet och effekt har inte påvisats hos barn och ungdomar. Läkaren följer noggrant hälsotillståndet hos prepubertala barn, som använder detta läkemedel (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Om du har fått för stor mängd av Deca-Durabolin

Detta läkemedel injiceras av läkare eller sjuksköterska. Om du upplever att effekten av detta läkemedel är för stark, ska du genast informera läkare eller sjuksköterska om det.

Om du har glömt Deca-Durabolin-injektionen

Detta läkemedel injiceras av läkare eller sjuksköterska. Om du har glömt en injektion enligt tidsschemat, kontakta läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt. Ta inte dubbel dos av injektionen för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Deca-Durabolin

Effekten av detta läkemedel slutar inte omedelbart, utan den avtar så småningom efter avslutad behandling.

Om behandlingen med Deca-Durabolin avslutas, kan dina symtom öka eller återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Deca-Durabolin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Beroende på dosen, dosfrekvensen och längden på Deca-Durabolin-behandlingen kan följande biverkningar, som är karakteristiska för androgener eller anabola steroider, uppkomma:

- vätskeansamling i vävnaderna, vilket i allmänhet yttrar sig som svullnad av vristerna eller fotbladen eller förhöjt blodtryck
- akne
- depression, nervositet, humörändringar
- ändringar i sexuell lust
- illamående
- klåda
- muskelvärk
- förhöjda hemoglobinvärden
- förändringar i blodets fettvärden
- förhöjt antal röda blodkroppar i blodet (celler som transporterar syre)
- funktionsstörning i levern
- strukturella förändringar i levern
- heshet
- röstförändring
- ökad kropps- och ansiktsbehåring
- oregelbundna menstruationer (alternativt uteblir menstruationerna helt)
- tillväxt av klitoris
- ökad penisstorlek
- förstoring av bröst hos män (gynekomasti)

- snabb utveckling av en liten prostatacancer-tumör, som ännu inte konstaterats (utveckling av latent prostatacancer)
- förekomsten av ett ämne som kan tyda på prostatacancer ökar i blodet (förhöjt PSA)
- förstorad prostatasvull, i samband med urineringsproblem
- långvariga, smärtsamma erektoner
- störningar i spermieproduktionen
- tillväxten blir långsammare
- maskulinisering
- avsiktligt missbruk

På grund av Deca-Durabolins långa verkningstid kan biverkningarna inte snabbt upphävas genom att avsluta medicineringen. Injicerade läkemedel kan i allmänhet orsaka reaktioner på injektionsplatsen.

Läkemedelsmissbruk och beroende

Missbruk av detta läkemedel kan orsaka allvarliga hälsoproblem, särskilt om du använder för mycket androgena anabola steroider ensamt eller tillsammans med testosteron. Några av dessa hälsoproblem är betydande biverkningar på hjärta och blodkärl (som kan leda till döden), den psykiska hälsan och/eller levern. (Se avsnitt 2. ”Läkemedelsmissbruk och beroende”.)

Barn och ungdomar

Hos prepubertala pojkar som använder anabola steroider har följande biverkningar rapporterats:

- påskyndad sexuell utveckling
- förstoring av penis
- återkommande erekton
- långsam tillväxt (längdtillväxten avstannar)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

5. Hur Deca-Durabolin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen (Utg.dat). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är nandrolondekanoat.
- En ml injektionsvätska innehåller 50 mg nandrolondekanoat.
- Övriga innehållsämnen är bensylalkohol (E 1519) och jordnötsolja (raffinerad).
- En ml injektionsvätska innehåller 100 mg bensylalkohol (E 1519).

Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

Deca-Durabolin injektionsvätska, lösning är en klar, gul oljeaktig vätska.

Ampull: En ml injektionsvätska i en 1 mls klar glasampull.

Förpackningen innehåller 1 x 1 ml eller 10 x 1 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland

Tel.: 00358 974790156

Tillverkare

Ever Pharma Jena GmbH,
Otto-Schott-Str. 15,

07745 Jena,
Tyskland

eller

Ever Pharma Jena GmbH,
Bruesselstr. 18,
07747 Jena,
Tyskland

Denna bipacks edel godkändes senast 31.05.2023