

# PAKKAUSSELOSTE

## AMPIKYY 50 mg -tabletti

### Hydrokortisoni

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää AMPIKYY 50 mg -tabletteja huolellisesti saadaksesi niistä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lieivity.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai jos kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

#### **Tässä pakkausselosteessa esitetään:**

1. Mitä AMPIKYY 50 mg -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät AMPIKYY 50 mg -tabletteja
3. Miten AMPIKYY 50 mg -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. AMPIKYY 50 mg -tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

#### **1. MITÄ AMPIKYY 50 mg -TABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN**

AMPIKYY 50 mg –tabletti vaikuttaa tulehdusta välittäviin aineisiin, jonka avulla kipu lievittyy ja kuumotus, punoitus sekä turvotus vähenevät.

AMPIKYY 50 mg -tabletteja käytetään ensiapuna kyykäärmeenpureman sekä ampiaisen- ja mehiläisenpiston aiheuttamiin reaktioihin. Kyykäärmeenpureman saanut potilas kuuluu lääkärin jatkohoitoon.

#### **2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMPIKYY 50 mg –TABLETTEJA**

##### **Älä käytä AMPIKYY 50 mg –tabletteja**

- jos olet allerginen (yliherkkä) hydrokortisonille tai AMPIKYY 50 mg –tabletin jollekin muulle aineelle.

##### **Ole varovainen AMPIKYY 50 mg -tablettien kanssa**

Läkettä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön eikä tavallisten allergiaoireiden hoitoon.

Jos hydrokortisonia annetaan keskoselle, sydämen toiminnan ja rakenteen seuranta voi olla tarpeen.

##### **Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö**

Hydrokortisoni voi aiheuttaa lihasheikkoutta antikoliiniesteraasin kanssa myasthenia gravis-potilailla. Hydrokortisonin kerta-annoksella ei tunneta yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

##### **Raskaus ja imettäminen**

Kerta-annoksesta lääkettä ei ole haittaa sikiölle tai imeväiselle raskauden ja imetyksen aikana. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

## **Ajaminen ja koneiden käyttö**

AMPIKYY 50 mg -tablettien ottaminen ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

### **3. MITEN AMPIKYY 50 mg -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN**

Aikuisille ja yli 15-vuotiaille lapsille: 3 tablettia.

Lapset:

0-5 vuotta: 1 tabletti.

5-15 vuotta 2 tablettia.

Kerta-annos otetaan mahdollisimman pian pureman/piston tapahduttua pienen nestemäärän kera. Ylimääräisen nesteen antamista tulee välttää seuraavan puolen tunnin ajan, koska osa potilaista voi tuntea pahoinvointia ja oksentaa.

Kyykäärmeenpureman saanut potilas kuuluu lääkärin jatkohoitoon. Ota viipymättä yhteys lääkäriin. Ei pitkäaikaiseen käyttöön.

### **Jos käytät enemmän AMPIKYY 50 mg –tabletteja kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä, ota yhteys lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111). Tarvittaessa voi antaa lääkehiiltä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

### **4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET**

Kuten kaikki lääkkeet, AMPIKYY 50 mg –tabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia.

Hydrokortisonin kerta-annos on yleensä haitaton. Joillakin henkilöillä hydrokortisoni voi aiheuttaa yliherkkyysoireita.

Tutkimukset:

Esiintyvyys tuntematon: painon nousu

Muut haittavaikutukset lapsilla

Esiintyvyys tuntematon: Sydänlihaksen paksuuntuminen (hypertrofinen kardiomyopatia) keskosilla.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

### **5. AMPIKYY 50 mg -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ei erityisiä säilytysohjeita. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen ("Käyt. viim."). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

### **6. MUUTA TIETOA**

#### **Mitä AMPIKYY 50 mg –tabletti sisältää**

Vaikuttava aine on hydrokortisoni.

Muut aineet ovat esigelatinoitu maissitärkkelys, glyseroli 85 %, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.

AMPIKYY 50 mg -tabletit ovat laktoosittomia ja makeuttamattomia.

## Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, pyöreä, jakourteellinen tabletti, jonka halkaisija on 11 mm.  
3 tablettia läpipainopakkauksessa.

## Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 1.7.2020

BIPACKSEDEL

## AMPIKYY 50 mg -tablett

Hydrokortison

**Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktigt för dig.**

Detta läkemedel är receptfritt. AMPIKYY 50 mg -tabletter måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

-Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

### **I denna bipacksedel finner du information om:**

1. Vad är AMPIKYY 50 mg -tabletter och vad används de för
2. Innan du använder AMPIKYY 50 mg -tabletter
3. Hur du använder AMPIKYY 50 mg-tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur AMPIKYY 50 mg -tabletter ska förvaras
6. Övriga upplysningar

### **1. VAD ÄR AMPIKYY 50 mg –TABLETTER OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR**

AMPIKYY 50 mg -tabletter verkar på sådana ämnen i kroppen som förmedlar inflammationer.

AMPIKYY 50 mg –tabletter lindrar smärta och känslan av värme samt minskar rodnad och svullnad.

AMPIKYY 50 mg -tabletter används som första hjälp vid reaktioner förorsakad av huggormsbett samt bi- och getingsting. Patient som blivit biten av en huggorm skall fortsatt vårdas av läkare.

### **2. INNAN DU ANVÄNDER AMPIKYY 50 mg –TABLETTER**

#### **Använd inte AMPIKYY 50 mg –tabletter**

- om du är allergisk mot hydrokortison eller mot något av övriga innehållsämnen i AMPIKYY 50 mg –tabletter.

#### **Var försiktig med AMPIKYY 50 mg –tabletter**

Läkemedlet är inte avsett till långvarigt bruk och vården av vanliga allergisymptom.

Om hydrokortison ges till ett spädbarn som är för tidigt fött kan hjärtats funktion och struktur behöva övervakas.

#### **Intag av andra läkemedel**

Samtidigt användning av acetylkolinesterashämmare och hydrokortison kan förorsaka muskelsvaghet för patienter som har myastenia gravis.  
Inga kända risker med andra läkemedel vid användning en engångsdos av hydrokortison.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

### **Graviditet och amning**

En engångsdos av läkemedlet skadar inte fostret eller spädbarn under graviditet och amning.  
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under graviditet eller amning.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Intag av AMPIKYY 50 mg -tabletter påverkar inte körförmåga och förmågan att använda maskiner.

## **3. HUR DU ANVÄNDER AMPIKYY 50 mg -TABLETTER**

För vuxna och barn över 15 år: 3 tabletter.

För barn:

0-5 år: 1 tablett.

5-15 år: 2 tabletter.

En engångsdos tas så snart som möjligt efter blivit biten/stinget med en liten mängd vätska.

Man skall undvika att ge annan vätska under en halv timme, eftersom hos en del av patienter kan förekomma illamående och kräkningar.

Patient som blivit biten av en huggorm skall fortsatt vårdas av läkare. Kontakta omedelbart läkare.  
Inte till långvarigt bruk.

### **Om du har använt för stor mängd av AMPIKYY 50 mg –tabletter**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.: 0800 147 111). Vid behov man kan ge medicinalkol.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan AMPIKYY 50 mg –tabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Gemenligen en engångsdos av hydrokortison är oskadlig. Hydrokortison kan förorsaka allergiska reaktioner hos några personer.

Undersökningar:

Ingen känd frekvens: Viktökning

Övriga biverkningar hos barn

Ingen känd frekvens: Förtjockning av hjärtmuskeln (hypertrofisk kardiomyopati) hos för tidigt födda spädbarn.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **5. HUR AMPIKYY 50 mg -TABLETTER SKA FÖRVARAS**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Används före utgångsdatum som anges på kartongen (Utg. dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

### **Innehållsdeklaration**

Den aktiva substansen är hydrokortison.

Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse, glycerol 85 %, hypromellos, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat och vattenfri kolloidal kiseldioxid .  
AMPIKYY 50 mg -tabletter är laktosfria och osötade.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Vit, rund tablett med brytskåra, diameter är 11 mm.

3 tabletter i blister.

### **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Tavastehus

Denna bipacksedel godkändes senast 1.7.2020