

Pakkauseloste: Tie toa käyttäjälle

Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide

dekspantenoli

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käytämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkauselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkienkilokunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkauseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkauselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Dexpanthenol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dexpanthenol ratiopharmia
3. Miten Dexpanthenol ratiopharmia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dexpanthenol ratiopharmin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Dexpanthenol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Dexpanthenol ratiopharm emulsiovoiteen sisältämä vaikuttava aine dekspantenoli muuttuu ihoa ja limakalvokudoksissa pantoteenihapoksi eli B₅-vitamiiniksi. B₅-vitamiini on ihan ja limakalvojen uudistumiselle välttämätön solun kasvutekijä ja sillä on solujen jakaantumista ja kollageenin kestävyyttä parantava sekä haavojen paranemista nopeuttava vaikutus.

Dexpanthenol ratiopharm emulsiovoide soveltuu erityisesti pienehköjen ihovaurioiden kuten hiertymien, pykimiin, palovammojen, ihoärsytysten, haavaumien, vaippaihottumien ja nenän limakalvojen tulehdusten hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dexpanthenol ratiopharmia

Älä käytä Dexpanthenol ratiopharmia

- jos olet allerginen dekspantenolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos olet allerginen sorbiinihapolle.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Dexpanthenol ratiopharmia.

- ei erityisiä varotoimenpiteitä.

Muut lääkevalmisteet ja Dexpanthenol ratiopharm

Dekspantenolilla ei ole havaittu yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Dexpanthenol ratiopharm emulsiovoidetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Dexpanthenol ratiopharm emulsiovoiteen käyttö ei vaikuta autolla ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita.

Dexpanthenol ratiopharm sisältää kaliumsorbaattia

Valmisteen sisältämä säilytysaine kaliumsorbaatti (E 202) voi aiheuttaa ihottumaa.

3. Miten Dexpanthenol ratiopharmia käytetään

Käytä tätä läkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Emulsiovoidetta levitetään kerran tai useita kertoja päivässä vaurioituneelle alueelle.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allergisia iho-oireita on todettu erittäin harvinaisissa tapauksissa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Dexpanthenol ratiopharmin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä pakaus tiiviisti suljettuna.

Säilytä alle 25°C.

Älä käytä tätä läkettä pakkaussessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Voide säilyy käyttökelpoisena 12 kk avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dexpanthenol ratiopharm sisältää

- Vaikuttava aine on dekspantenoli
- Muut aineet ovat villavahan alkoholivoide (setostearyylialkoholi, villarasva-alkoholeja ja vaseliini), villarasva, valkovaseljini, Miglyol 812 (triglyceridejä), Imwitor 600 (polyglyceryli-3-polyrisinoleaatti), natriumsitraatti, sitruunahappo, kaliumsorbaatti (E 202) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai heikosti kellertävä, homogeninen, levitettävä emulsiovoide, jolla on villarasvalle ominainen haju.

Alumiinituubi, jossa on polypropyleenikorkki. Pakkauskoot 10 g, 15 g, 30 g ja 100 g. Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa

Valmistaja

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

ratiopharm Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh. 020 180 5900

Tämä pakausselostote on tarkistettu viimeksi 19.4.2024.

Bipackse del: Information till användaren

Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g kräm dexpantenol

**Läs noga igenom denna bipackse del innan du börjar använda detta läkemedel. Den
innehåller information som är viktig för dig.**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I den här bipackse delen finns information om följande:

1. Vad Dexpanthenol ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dexpanthenol ratiopharm
3. Hur du använder Dexpanthenol ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dexpanthenol ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dexpanthenol ratiopharm är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet, dexpantenol, i Dexpanthenol ratiopharm -kräm omvandlas till pantotensyra, d.v.s. B₅-vitamin, i hud- och slemhinnevävnaden. B₅-vitamin är en oumbärlig tillväxtfaktor för hudens och slemhinnornas förnyelse, och detta vitamin förbättrar kollagenets elasticitet (hållbarhet), försnabbar celldelningen och får eventuella sår att läka fortare.

Dexpanthenol ratiopharm lämpar sig speciellt för vård av små hudskador, såsom skavsår, skrämor, brännskador, hudirritationer, hudsprickor, blöjeksem, och för vård av inflammationer i näsans slemhinna.

2. Vad du behöver veta innan du använder Dexpanthenol ratiopharm

Använd inte Dexpanthenol ratiopharm

- om du är allergisk mot dexpantenol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du är allergisk för sorbinsyra.

Varngar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dexpanthenol ratiopharm.

- inga särskilda försiktighetsåtgärder.

Andra läkemedel och Dexpanthenol ratiopharm

Inga interaktioner har konstaterats mellan dexpantenol och andra läkemedel.

Graviditet och amning

Dexpanthenol ratiopharm kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Dexpanthenol ratiopharm påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Dexpanthenol ratiopharm innehåller kaliumsorbat

Detta läkemedel innehåller konserveringsmedlet kaliumsorbat (E 202), som kan orsaka hudutslag.

3. Hur du använder Dexpanthenol ratiopharm

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Krämen ska strykas på det skadade hudpartiet en eller flera gånger per dag.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska hudreaktioner har iakttagits i ytterst sällsynta fall.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

5. Hur Dexpanthenol ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Tillslut förpackningen väl.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använts före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Krämen är användbar 12 månader efter öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är dexpantenol.

- Övriga innehållsämnen är salva med vaxalkoholer ur ull (cetostearylalkohol, fettalkoholer ur ull och vitt vaselin), ullfett, vitt vaselin, Miglyol 812 (triglycerider), Imwitor 600 (polyglyceryl-3-polyricinoleat), natriumcitrat, citronsyra, kaliumsorbat (E 202) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit eller svagt gulaktig, homogen, bredbar kräm, med en doft av ullfett.

Aluminiumtub med polypropylenkork. Förpackningsstorlekar 10 g, 15 g, 30 g och 100 g. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH, Ulm, Tyskland

Tillverkare

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

ratiopharm Oy

PB 67

02631 Esbo

Tel: 020 180 5900

Denna bipackse del ändrades senast 19.4.2024.