

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tamsulogen 0,4 mg säädelysti vapauttava kapseli, kova

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kapseli sisältää 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia.

Täydellinen apuaineeluetelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Säädelysti vapauttava kapseli, kova

Oranssi runko-osa/olivinvihreä kansiosa. Kapseli sisältää valkoisia tai luonnonvalkoisia rakteita.

4. KLIININSET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta (BPH) johtuvat alempien virtsateiden oireet (LUTS).

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Yksi kapseli päivässä aamisen tai päivän ensimmäisen aterian jälkeen.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta.

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilaille, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta (ks. myös kohta 4.3 Vasta-aiheet).

Pediatriset potilaat

Tamsulosiinin turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotioiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot on esitetty kohdassa 5.1.

Antotapa

Suun kautta.

Kapseli on nieltävä kokonaisenä eikä sitä saa murskata eikä pureskella, koska tämä vaikuttaa aktiivaineen säädeltyyn vapautumiseen.

4.3 Vasta-aiheet

- Yliverkkyyys vaikuttavalle aineelle, mukaan lukien lääkkeen aiheuttama angioedeema, tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.
- Alkaisemmin havaittu ortostaattinen hypotensio.
- Vaakea maksan vajaatoiminta.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kuten muitakin alfa₁-saapajaa käytettäessä, tamsulosiinhoidon aikana voi esiintyä yksittäistapauksina verenpaineen laskua, mikä voi harvinaisissa tapauksissa johtaa pyörtymiseen. Ortostaattisen hypotension ensioreiden (huimaus, heikotus) ilmaantuessa potilaan on käytävä istumaan tai makuulle ja odottettava, kunnes oireet ovat hävinneet.

Ennen tamsulosiinhoidon aloittamista potilaan on tutkittava, jotta muut eturauhasen hyvänlaatuisen liikkavuuden kaltaisia oireita aiheuttavat tilat voidaan sulkea pois. Ennen hoidon aloittamista ja säännöllisin väläjoin sen jälkeen eturauhanen on tutkittava peräsuolen kautta ja tarvittaessa myös prostataspesifinen antigeeni (PSA) tullee määrittää.

Varovaisuutta on noudatettava, kun hoitetaan potilaata, jolla on vakava munuaisten vajaatoiminta (kreatiinipuhdistuma alle < 10 ml/min), koska valmisteen käytöstä näille potilaille ei ole kokemusta.

Angioedeema on raportoitu harvoin tamsulosin käytön jälkeen. Hoito täytyy lopettaa heti ja potilaasta on seurattava, kunnes turvotus on hävinnyt. Tamsulogen-lääkitystä ei tule aloittaa uudelleen.

Harmaakahti- tai glukoomaleikkauksen yhteydessä on joillaakin potilailla, jotka käyttävät tai ovat aiemmin käyttäneet tamsulosinia, todettu IFIS oireyhtymä (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, pieni pupilli syndrooman variantti). Oireyhtymä saattaa sisältää silmäkomplikaatioita sekä leikkauksen aikana että sen jälkeen.

Tamsulosinin käytön lopettamisesta 1–2 viikkoa ennen harmaakahti- tai glukoomaleikkausta on yksittäistapauksissa todettu olevan hyötyä, mutta hoidon keskeyttämisestä aiheutuvaa hyötyä ei ole vahvistettu. IFIS oireyhtymää on todettu myös niillä potilailla, jotka keskeyttivät tamsulosiinhoidon pidemmäksi aikaa ennen kahia- tai glukoomaleikkausta.

Tamsulosinin aloittamista potilaalla, jolle on suunniteltu kahia- tai glukoomaleikkausta, ei suositella. Harmaakahti- tai glukoomaleikkausta suunniteltaessa leikkavaan lääkärin ja hoitohenkilökunnan on selvitettävä, käyttääkö potilaas parhaillaan tai onko hän aiemmin käyttänyt tamsulosinia, ja huolehdittava asianmukaista toimenpiteistä leikkauksessa ilmenevän IFIS-oireyhtymän varalta.

Tamsulosinia ei pitäisi käyttää yhdessä vahvojen CYP 3A4:n estäjien kanssa potilaalla, jotka ovat fenotyypiltään heikkoja CYP 2D6-metabolioja.

Tamsulosinia tullee käyttää varoen vahvojen ja keskivahvojen CYP 3A4:n estäjien, kuten erytromysiini, kanssa (ks. kohta 4.5).

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Yhteisvaikutuksia ei ole havaittu, kun tamsulosinia on annettu samanaikaisesti joko atenobiliini, enalapriili tai teofylliinin kanssa.

Samanakin siemetidinilääkitys nostaa ja furosemidilääkitys laskee tamsulosinin plasmapitoisuutta, mutta koska tamsulosiinitoisuus pysyy normaalialueella, annostusta ei ole tarpeen muuttaa.

In vitro diatsepaami, propranololi, triklorometatsidi, klorimadinoni, amitriptyliini, diklofenaakki, glübenklamidi, simvastatiini tai varfarini eivät vaikuta tamsulosinin vapaaseen fraktioon ihmisen plasmassa. Tamsulosini ei myöskään vaikuta diatsepaamin, propranololiin, triklorometatsideen tai klorimadinonin vapaaseen fraktioon.

Diklofenaakki ja varfarini voivat nopeuttaa tamsulosiinin eliiminaatiota.

In vitro-tutkimuksissa maksan mikrosomaalifraktioilla (edustavat sytokromi P 450-välinneistä metabolismentsyymsysteemää) tamsulosiinilla ei ole havaittu interaktioita amitriptylinin, salbutamolin, glbenklaamidin eikä finasteridin kanssa.

Tamsulosiinin samanaikainen käyttö vahvojen CYP 3A4:n estäjien kanssa saattaa lisätä alitusta tamsulosiinille. Ketokonatsolin (tunnettu vahva CYP 3A4:n estäjä) samanaikainen käyttö lisää tamsulosiinin AUC-arvoa 2,8-kertaiseksi ja C_{max} -arvoa 2,2-kertaiseksi.

Tamsulosiinia ei pitäisi käyttää yhdessä vahvojen CYP 3A4:n estäjien kanssa potilaalla, jotka fenotyypiltään ovat heikkoja CYP 2D6-metabolioita.

Tamsulosiinia tulee käyttää varoen yhdessä vahvojen ja keskivahvojen CYP 3A4:n estäjien kanssa.

Tamsulosiinin samanaikainen käyttö paroksettiin (vahva CYP 2D6:n estäjä) kanssa nosti tamsulosiinin C_{max} -arvoa 1,3-kertaiseksi ja AUC-arvoa 1,6-kertaiseksi, mutta täällä nousulla ei katsota olevan kliinistä merkitystä.

Samanaikainen toisen α 1-adrenoreseptorisalpaajan anto voi aiheuttaa verenpainetta alentavan vaikutuksen.

4.6 He de lmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus ja imetys

Tamsulosiin-valmiste ei ole tarkoitettu naisille.

Hedelmällisyys

Ejakulaatiohäiriötä on havaittu tamsulosiinilla tehdyissä lyhyt- ja pitkäkestoisissa kliinissä tutkimuksissa. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen on raportoitu ejakulaatiohäiriötä, retrogradista ejakulaatiota ja ejakulaation epäonnistumista.

4.7 Vaikutus ajokyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisten vaikutuksesta autolla ajokykyn tai kykyyn käyttää koneita ei ole tehty. Kuitenkin potilaiden on syytä olla tiedottavia, että huimausta voi esiintyä.

4.8 Haimavaikutukset

	Yleinen ($\geq 1/100$, $< 1/10$)	Melko harvinainen ($\geq 1/1000$, $< 1/100$)	Harvinainen ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$)	Hyvin harvinainen ($< 1/10\ 000$)	Tunteeton (koska saatavissa olevat tie to ei riitä arviointiin)
Hermosto	Huimaus (1,3 %)	Päänsärky	Pyörtyminen		
Silmät					Näön hämärtyminen*, heikentyneet näkökyky
Sydän		Sydämen-tykytys			
Verisuonisto		Ortostaattinen hypotensio			

Hengitys elime t, rintakehä ja välikarsina		Rintti			Nenä-verenvuoto*
Ruoansulatus - elimistö		Ummetus, ripuli, pahoinvointi, oksentelu			Suun kuivuminen*
Iho ja ihonalainen kudos		Ihottuma, kutina, urtikaria	Angioedeema	Stevens–Johnsonin oireyhtymä	Monimuotoren punavihottuma*, kesiväihottuma*
Sukupuolielimet ja rinnat	Ejakulaatio-häiriöt mukaan lukien retrogradinen ejakulaatio ja ejakulaation epäonnistuminen			Priapismi	
Yleisoireet ja antipaikassa toteutuvat haitat		Astenia			

* todettu myyntiluvan myöntämisen jälkeen

Tamsulosiinhoidoon liittyen on kahi- ja glaukoomaleikkauksen aikana raportoitu pieni mustuaisen oireyhtymää (IFIS, Intraoperative Floppy Iris Syndrome) (ks. myös kohta 4.4).

Markkinoille tulon jälkeinen kokemus: Ylämainittujen haittavaikutusten lisäksi etesiärinää, rytmihäiriötä, takykardiaa ja dysneea on havaittu tamsulosiinhoidon aikana. Koska nämä spontaanisti raportoidut haittavaikutukset ovat peräisin maailmanlaajuisesta myyntiluvan myöntämisen jälkeisestä kokemuksesta, haittavaikutusten yleisyttä ja tamsulosiinin roolia niiden ilmenemisessä ei voida luotettavasti määritää.

Epäilyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäilyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kakista epäilyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9 Yliannostus

Oireet

Tamsulosiinin yliannostus saattaa aiheuttaa valkeaa verenpaineen laskua. Siitä on havaittu erilaissa yliannoksilla. Suurin yksittäiselle potilaalle tahattomasti annettu annos on ollut 12 mg. Tämä aiheutti päänsärkyä, mutta ei vaatinut saraalahoitoa.

Hoito

Sydämen ja verenkiertoelimoniston toimintaa pitää tukea, jos ylänostuksen yhteydessä ilmenee akuuttiä verenpaineen laskua. Verenpaine ja sydämen lyöntitheys voidaan palauttaa normaalitasolle asettamalla potilaan makuulle. Mikäli tämä ei auta, huolehditaan rüttävästä nesteytyksestä ja tarvittaessa voidaan käyttää myös vasopressoreita. Munuaisten toimintaa ja muita elintointioita tulee tuolloin tarkkailla. Dialyysi ei todennäköisesti auta, koska tamsulosiini sitoutuu erittäin suurella määrin plasmaan proteiineihin.

Imeytymistä voidaan estää eri toimenpiteillä, kuten oksennuttamalla.

Jos lääkemäärität ovat suuria, voidaan suorittaa mahahuuhde ja antaa aktiivihiltää ja osmoottista läksatiivia, kuten natriumsulfatia.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamika

Farmakoterapeutinen ryhmä: Hyvänlaatuisen eturauhasen liikasvun lääkkeet, adrenergiset alfareseptoreita saapavat lääkeaineet, ATC-koodi G04CA02

Vaikutusmekanismi

Tamsulosiini sitoutuu selektiivisesti ja kompetitiivisesti niihin postsynaptisiin α -adrenoreseptoreihin, etenkin sen alatyyppeihin α_{1A} ja α_{1D} , jotka välittävät sileinä ihmaksen supistumista eturauhasessa ja virtsaputkessa relaksoinnalla sileinä ihmasta.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Tamsulosiini lisää virtsan maksimivirtausnopeutta relaksoinnalla sileinä ihmasta eturauhasessa ja virtsaputkessa ja helpottaa siten obstruktioita.

Lääkevalmiste parantaa myös sellisia ärsytys- ja obstruktiooireita, joissa alempien virtsateiden sileinä ihmaksen supistumisella on tärkeä osuus. Alfasaappaat voivat alentaa verenpainetta alentamalla perifeeristä resistenssiä. Klinisesti merkitsevä verenpaineen alenemista ei havaittu normotensiivisillä potilailla tamsulosiinilla suoritetuissa tutkimuksissa.

Lääkevalmisten vaikutus sekä kerääntymis- että tyhjennysoireisiin pysyy yllä myös pitkäaikaishoidossa, mistä johtuen kirurgisen hoidon tarve merkitsevästi siirtyy.

Pediatriset potilaat

Neuropaattisesta rakosta kärsivillä lapsilla suoritettiin kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumelääkekontrollitu tutkimus, jossa tutkittiin eri annostasoja. Tutkimukseen osallistui 161 lasta (lätlään 2–16-vuotiaille), jotka satunnaistettiin neljään eri ryhmään, jotka saivat joko pienen (0,001–0,002 mg/kg), keskisuuren (0,002 – 0,004 mg/kg) tai suuren annoksen (0,004 – 0,008 mg/kg) tamsulosiinia tai vaihtoehtoisesti lumelääkettä. Ensijaisena päätetapahtumana oli näiden potilaiden lukumäärä, joilla detrusorihaksen sulkupaine (Leak Point Pressure, LPP) kahden samana päivänä suoritetun mittauksen perusteella pieneni arvoon alle 40 cm H₂O. Toissijaiset päätetapahtumat olivat: detrusorihaksen sulkupaineen mitattu ja prosentuaalinen muutos lähtötasosta, hydronefroosi ja hydroureterin paraneminen tai stabiloituminen, sekä katetrisointipäiväkirjojen mukainen muutos katetrisoimalla saadun virtsan määrässä ja kasteluiden lukumäärässä. Ensijaisissa tai toissijaisissa päätetapahtumissa ei havaittu tilastollisesti merkittävä eroa lumelääkkeen tai millään annostasolla toteutetun tamsulosiinilääkityksen välillä. Annosvastetta ei todettu millään annostolasolla.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Tamsulosiini imetyy nopeasti suolistosta ja sen biologinen hyötyosuuus on lähes täydellinen. Ennen lääkkeenottoa nautitu ateria hidastaa imeytymistä. Tasainen imeytyminen voidaan varmistaan ottamalla tamsulosiini aina saman päivittäisen aterian jälkeen.

Tamsulosiinilla on lineaarinen kinetikka.

Tamsulosiinkerta-annos ruokailun jälkeen otettuna saa alkaan tamsulosiinin huippupitoisuuden plasmassa noin 6 tunnin kuluttua ja toistuvassa lääkityksessä steady state -taso saavutetaan viidenteen päivään mennessä, toistuvasti lääkettä otettaessa C_{max} on potilaalla noin 2/3 korkeampi kuin kerta-annoksen jälkeen. Vaikka tämä on todettu vain vanhuksista, sama tulos on odotettavissa myös nuoremmilla potilailla.

Plasman tamsulosiinpitoisuudessa on suuria potilaiden välisiä vaihteluja sekä kerta-annon että toistuvan annon jälkeen.

Jakautuminen

Ihmisessä tamsulosiini sitoutuu plasman proteiineihin yli 99 %:sti ja jakautumisilavuus on pieni ($n. 0,2 \text{ l/kg}$).

Biotransformaatio

Tamsulosiinilla on vähäinen ensikierron metabolismi. Suurin osa tamsulosiinista on plasmassa muutumattomana. Lääkeaine metaboloituu maksassa.

Rotilla tehdyissä tutkimuksissa tamsulosiinin todettiin aheuttavan vain vähän maksan mikrosomaalisten entsyyymiä induktioita.

In vitro -tulokset viittaavat siihen, että CYP 3A4 ja myös CYP 2D6 osallistuvat metabolismaan, ja että muilla CYP-isoentsyyymeillä saattaa olla vähäinen merkitys tamsulosiinhydrokloridimetaboliaan. Lääkkeitä metaboloivien entsyyymiä CYP 3A4 ja CYP 2D6 toiminnan estyminen saattaa lisätä tamsulosiinhydrokloridia liitostusta (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

Metabolitit eivät ole niin tehokkaita tai toksisia kuin aktiivi lääkeaine.

Eliminaatio

Tamsulosiini ja sen metabolitit erittivät pääasiassa virtsaan, noin 9 % annoksesta muutumattomassa muodossa.

Potilaalla tamsulosiinin eliminaation puolittumisaika on noin 10 tuntia (ruuan jälkeen otettuna) kerta-annoksen jälkeen ja vastaavasti 13 tuntia steady state -tasolla.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksisuutta kerta-annoksen ja toistuvan annon jälkeen on tutkittu hirillä, rotilla ja koirilla. Lisäksi on tutkittu lisääntymistoksisuutta rotilla, karsinogeenisyyttä hirillä ja rotilla sekä genotoksisuutta *in vivo* ja *in vitro*.

Suurten tamsulosiinannosten todettu yleinen toksisuusprofiili vastaa alfa-adrenergisten salpaajien tunnettua farmakologista vaikutusta.

Erittäin suuria annoksia annettaessa koirilla todettiin EKG-muutoksia. Tällä ei kuitenkaan oleteta olevan kliinistä merkitystä. Tamsulosiinilla ei todettu olevan merkittävä genotoksista ominaisuutta.

Naarasrotilla ja -hirillä on todettu esintyvän enemmän rintarauhasten proliferatiivisia muutoksia

tanssulosoittimista tuksen yhteydessä. Näitä löydöksiä, jotka todennäköisesti liittyvät epäsuorasti hyperprolaktinemiaan ja esiintyvät vain suurten annosten seurauksena, pidetään klinisesti merkityksellöminä.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Kapselin sisältö

Mikrokiteinen selluloosa

Metakryylhippo-etylakrylaattikopolymeeri (1:1) 30-prosenttinen dispersio

Polymerbaatti 80

Natriumlaurylsulfaatti

Trietyylitraatti

Talkki

Kapselin kuori

Lävite

Indigokarmiini (E 132)

Titaanioksidi (E 171)

Keltainen rautaoksidi (E 172)

Punainen rautaoksidi (E 172)

Musta rautaoksidi (E 172)

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei ole.

6.3 Kestoaika

3 vuotta.

6.4 Säilytys

Läpipaipinopakkaukset: Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Purkit: Pidä muovipurkki tyyvästi suljettuna.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkaukset

Pahvikotelissa olevat läpipaipinopakkaukset (PVC/PE/PVDC/Alumiini), joissa on 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tai 200 säädellysti vapauttavaa kapselia ja kerrannaispakkaukset, joissa on 200 (2 x 100) säädellysti vapauttavaa kapselia.

HDP E-purkit, joissa on PP-turvasuljin: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tai 200 säädellysti vapauttavaa kapselia.

Kaikkia pakkaukokoja ei vältämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Viatris Limited
Damastown Industrial Park

Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Irlanti

8. MYYNTILUVAN NUMERO

20710

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 23.3.2005
Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 23.3.2010

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

20.3.2023

PRODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Tamsulogen 0,4 mg kapsel med modifierad frisättning, hård

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En kapsel innehåller 0,4 mg tamsulosinhydroklorid.

För fullständig förteckning över hjälpmännen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel med modifierad frisättning

Orange stomme/olivgrön hätta. Kapseln innehåller vita till naturvita granulat.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Symtom från nedre urinvägarna (LUTS) i samband med benign prostatahyperplasi (BPH).

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

En kapsel dagligen, tas efter frukost eller dagens första måltid.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs vid nedsatt njurfunktion.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs hos patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion (se även avsnitt 4.3 Kontraindikationer).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för tamsulosin i behandling av barn under 18 år har inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1.

Administreringssätt

Oralt.

Kapseln måste sväljas hel och får inte krossas eller tuggas eftersom detta påverkar den modifierade frisättningen av det aktiva innehållsämnet.

4.3 Kontraindikationer

- Överkänslighet mot den aktiva substansen, inkluderande läkemedelsinducerat angioödem, eller mot något hjälpmäne som anges i avsnitt 6.1.
- Ortostatisk hypotension i anamnesen.
- Svårt nedsatt leverfunktion.

4.4 Varningar och försiktighet

Liksom för andra alfa₁-antagonister kan en blodtryckssänkning ses hos enstaka individer vid behandling med tamsulosin, vilket i sällsynta fall kan resultera i svimning. Vid de första tecknen på ortostatisk hypotension (yrsel, svaghet) ska patienten sätta sig eller lägga sig ned tills symptomet försvunnit.

Innan behandling med tamsulosin påbörjas ska patienten undersökas med syfte att utesluta andra tillstånd som kan orsaka samma symtom som benign prostatahyperplasi. Rektal undersökning av prostata och, om nödvändigt, bestämning av prostataspecifikt antigen (PSA) ska utföras innan behandlingen och därefter med regelbundna mellanrum.

Behandling av patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance < 10 ml/min) ska ske med försiktighet då användning av tamsulosin inte har studerats i denna patientgrupp.

Angioödem har i sällsynta fall rapporterats efter användning av tamsulosin. Behandlingen måste utsättas omgående och patienten övervakas till svullnaden avklingar. Behandling med Tamsulogen ska inte inledas på nytt.

IFIS-syndrom (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, en variant av liten pupill-syndrom) har observerats under katarakt- och glaukomkirurgi hos vissa patienter som behandlas eller tidigare behandlats med tamsulosin. IFIS kan öka risken för ögonkomplikationer under och efter operationen.

Utsättning av tamsulosin 1–2 veckor före katarakt- eller glaukomkirurgi har i enstaka fall angetts vara till hjälp, men nyttan med utsättning har inte fastställts. IFIS-syndrom har även rapporterats hos patienter som avstätt tamsulosin under en längre period före katarakt- eller glaukomkirurgi.

Att påbörja behandling med tamsulosin hos patienter för vilka katarakt- eller glaukomkirurgi är inplanerad rekommenderas därför inte. Vid planering av katarakt- eller glaukomkirurgi ska opererande läkaren och vårdpersonalen undersöka om patienten behandlas eller har behandlats med tamsulosin, för att säkerställa att nödvändiga förutsättningar finns för att hantera IFIS under operationen.

Tamsulosin ska inte ges i kombination med starka CYP3A4-hämmare till patienter som är långsamma metaboliserares av CYP2D6.

Tamsulosin ska användas med försiktighet i kombination med starka eller måttliga CYP3A4-hämmare, såsom erytromycin (se avsnitt 4.5).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

4.5 Interaktioner med andra läke medel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Inga interaktioner har setts när tamsulosin gavs tillsammans med antingen atenolol, enalapril eller teofyllin.

Administrering tillsammans med cimetidin ger ökade plasmanivåer av tamsulosin, medan furosemid ger en sänkning, men eftersom nivåerna av tamsulosin håller sig inom normalvärdena behöver dosen inte justeras.

In vitro påverkades inte den obundna fraktionen av tamsulosin i human plasma av diazepam, propranolol, triklormetiazid, klormadinon, amitriptylin, diklofenak, glibenklamid, simvastatin eller warfarin. Tamsulosin påverkade inte heller den obundna fraktionen av diazepam,

propranolol, triklormetiazid eller klormadinon.

Diklofenak och warfarin kan däremot öka elimineringshastigheten av tamsulosin.

I *in vitro*-undersökningar av tamsulosin har mikrosomala fraktioner i levern (vilka representerar cytrom P450-medierad enzymmetabolism) inte observerats ha några interaktioner med amitriptylin, salbutamol, glibenklamid eller finasterid.

Samtidig administrering av tamsulosin med stora CYP3A4-hämmare kan leda till ökad exponering för tamsulosin. Samtidig administrering med ketokonazol (en känd, stark CYP3A4-hämmare) resulterade i en ökning av AUC och C_{max} för tamsulosin med 2,8 respektive 2,2 gånger.

Tamsulosin bör inte ges i kombination med stora CYP3A4-hämmare till patienter som är långsamma metaboliserares av CYP2D6.

Tamsulosin ska användas med försiktighet i kombination med stora eller måttliga CYP3A4 hämmare.

Administrering av tamsulosin tillsammans med paroxetin, en stark CYP2D6-hämmare, resulterade i en ökning av C_{max} med 1,3 gånger och AUC med 1,6 gånger, men dessa ökningar anses inte vara kliniskt relevanta.

Administrering tillsammans med andra α 1-adrenoreceptorantagonister kan ge upphov till hypotensiva effekter.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet och amning

Tamsulosin är inte avsett för kvinnor.

Fertilitet

Ejakulationsbesvär har observerats vid korta och långa kliniska undersökningar med tamsulosin. Fall av ejakulationsbesvär, retrograd ejakulation och utebliven ejakulation har rapporterats efter godkännande för försäljning.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier avseende effekterna på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har utförts. Patienter ska däremot vara medvetna om att yrsel kan förekomma.

4.8 Biverkningar

	Vanliga ($\geq 1/100$, $< 1/10$)	Mindre vanliga ($\geq 1/1\ 000$, $< 1/100$)	Sällsynta ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$)	Mycket sällsynta ($< 1/10\ 000$)	Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)
Centrala och perifera	Yrsel (1,3 %)	Huvudvärk	Synkope		
Ögon					Dimsyn*, synnedräktning

Hjärtat		Hjärt-klappning			
Blodkärl		Ortostatisk hypotension			
Andningsvägar, bröstkorg och medias tinum		Rinit			Epistaxis*
Magtarmkanalen		Förstoppning, diarré, illamående, kräkningar			Muntorrhett*
Hud och subkutan vävnad		Hudutslag, kåda, urtikaria	Angioödem	Stevens–Johnsons syndrom	Erythema multiforme*, exfoliativ dermatit*
Reproduktionsorgan och bröstkörtel	Ejakulationsbesvär, inklusive retrograd ejakulation och utebliven ejakulation			Priapism	
Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället		Asteni			

* upptäckt efter godkännande för försäljning

Under katarakt- och glaukomkirurgi har liten pupill-syndrom (IFIS, Intraoperative Floppy Iris Syndrome) associerats med tamsulosinbehandling (se också avsnitt 4.4).

Erfarenheter efter marknadsintroduktion: Utöver de biverkningar som listas ovan har förmäksflimmer, arytmier, takykardi och dyspné rapporterats i samband med tamsulosinbehandling. Eftersom dessa spontant rapporterade händelser härrör från den världsomspännande användningen efter godkännandet, kan inte frekvensen för dessa händelser och vilken roll tamsulosin spelat för orsakssambandet fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

4.9 Överdosering

Symptom

Överdosering av tamsulosin kan potentiellt resultera i svår hypotension. Detta har observerats vid olika grader av överdosering. Den största oavsiktliga överdoseringen hos en enskild patient var 12 mg. Detta gav upphov till huvudvärk, men krävde inte sjukhusvård.

Behandling

Vid akut hypotension efter överdosering ska kardiovaskulär support ges. Genom att lägga patienten ned kan blodtrycket återställas och hjärtfrekvensen normaliseras. Om detta inte hjälper kan volymersättningsmedel ges och, om nödvändigt, ett kärlsammardragande läkemedel.

Njurfunktionen och övriga vitala funktioner ska övervakas. Hemodialys är troligtvis inte till hjälp eftersom tamsulosin i mycket hög grad binds till plasmaproteiner.

För att hindra absorption kan åtgärder såsom att framkalla kräkning vidtas.

När stora mängder intagits kan man göra en ventrikelsköljning samt ge aktivt kol och ett osmotiskt laxermedel såsom natriumsulfat.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot godartad prostataförstoring, alfa-adrenoreceptorantagonister, ATC-kod: G04CA02

Verkningsmekanism

Tamsulosin binds selektivt och kompetitivt till de postsynaptiska α -adrenoreceptorer, särskilt subtyperna α_{1A} och α_{1D} , som förmedlar sammandragning av glatt muskulatur i prostata och urinvägar genom att relaxerar den glatta muskulaturen.

Farmakodynamisk effekt

Tamsulosin ökar den maximala urinflödeshastigheten genom relaxering av den glatta muskulaturen i prostata och urinrören, vilket minskar obstruktionen.

Tamsulosin är också effektiv mot symptom på irritation och obstruktion där sammandragning av den glatta muskulaturen i nedre urinvägarna spelar en viktig roll. Alfablockerare kan sänka blodtrycket genom att minska perifer resistens. Ingen klinisk relevant sänkning av blodtrycket sågs hos patienter med normalt blodtryck i kliniska undersökningar med tamsulosin.

Effekterna på lagrings- och tömningssymptom bibehålls även under långtidsbehandling. Behovet av kirurgi och kateterisering kan därmed skjutas upp avsevärt.

Pediatrisk population

En dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad dosomfångsundersökning utfördes på barn med neuropatisk blåsa. I undersökningen deltog 161 barn (i åldrarna 2 till 16 år) randomisades till fyra olika grupper som fick antingen låg (0,001 till 0,002 mg/kg), medium (0,002 till 0,004 mg/kg) eller hög (0,004 till 0,008 mg/kg) dos tamsulosin, eller alternativt placebo. Primärt effektmått var antalet patienter hos vilka kontraktionstrycket i detrusormuskeln (Leak Point Pressure, LPP) minskade till < 40 cm H₂O baserat på två mätningar som gjordes på samma dag. Sekundära effektmått var: uppmätt och procentuell förändring jämfört med baslinjen för LPP, förbättring eller stabilisering av hydronefros och hydrouretär samt ändrade urinvolymer vilka erhållits genom kateterisering samt antalet gånger patienten varit våt vid kateterisering vilket registrerats i kateteriseringsdagböcker. Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde ses mellan placebogruppen och någon av de tre tamsulosindosgrupperna för varje sig det primära eller de sekundära effektmåtten. Ingen

dosrespons observerades vid någon dosnivå.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Tamsulosin absorberas snabbt från tarmen och biotillgängligheten är nästan fullständig. Absorptionen fördröjs om läkemedlet tas efter en måltid. En jämn absorption kan säkerställas genom att patienten alltid tar tamsulosin efter samma dagliga måltid.

Tamsulosin uppvisar linjär kinetik.

Efter en enkeldos tamsulosin intagen efter en måltid uppnås maximal plasmanivå efter ca 6 timmar. Vid upprepad dosering uppnås jämviktskoncentration senast dag 5, och vid upprepad dosering är C_{max} hos patienter omkring 2/3 högre än vad som nås efter en enkeldos. Även om detta sågs hos äldre patienter, förväntas samma resultat hos yngre.

Det finns en betydande variation i plasmakoncentrationer av tamsulosin mellan olika patienter både efter enkeldos och vid upprepad dosering.

Distribution

Över 99 % av tamsulosin är bundet till plasmaproteiner hos mänskliga. Distributionsvolymen för tamsulosin är liten (ca 0,2 l/kg).

Metabolism

Tamsulosin har liten förstapassagemetabolism. Merparten av tamsulosin förekommer i plasma i oförändrad form. Tamsulosin metaboliseras i levern.

I undersökningar på råttor sågs det knappt någon induktion av mikrosomala leverenzymer orsakad av tamsulosin.

In vitro-resultat tyder på att CYP3A4 och även CYP2D6 medverkar i metabolismen, och att andra CYP-isoenzymer kan ha en begränsad roll i metabolismen av tamsulosinhydroklorid. Hämning av de läkemedelsmetaboliseraende enzymerna CYP3A4 och CYP2D6 kan öka exponeringen för tamsulosinhydroklorid (se avsnitten 4.4 och 4.5).

Metaboliterna är inte lika effektiva eller toxiska som det aktiva läkemedlet.

Eliminering

Tamsulosin och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen i urinen där ca 9 % av dosen förekommer i oförändrad form.

Halveringstiden för tamsulosin hos patienter är ca 10 timmar (efter en måltid) vid enkeldosering och 13 timmar vid steady state.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prövningar med enkel- samt upprepad dosering har utförts på möss, råttor och hund. Dessutom har reproduktionstoxikologi hos råttor, karcinogenitet hos möss och råttor och *in vitro* och *in vivo* genotoxicitet undersökts.

Den allmänna toxicitetsprofilen som ses vid höga doser av tamsulosin överensstämmer med de kända farmakologiska effekterna hos alfa-adrenoceptorantagonister.

Vid mycket höga doser förändrades EKG hos hund. Denna respons anses dock inte vara klinisk relevant. Tamsulosin visade inga relevanta genotoxiska egenskaper.

En ökad incidens av proliferativa förändringar i bröstkörteln hos honråttor och honmöss har

rapporterats vid exponering för tamsulosin. Dessa fynd, som förmodligen medierats av hyperprolaktinemi, och har endast setts vid höga doser, anses sakna klinisk relevans.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpmittens

Innehållet i kapseln

Mikrokristallin cellulosa
Metakrylsyra-etylakrylatkopolymer (1:1) 30-procentig dispersion
Polysorbat 80
Natriumlaurilsulfat
Trietylcitrat
Talk

Kapselskal:

Gelatin
Indigokarmen (E132)
Titandioxid (E171)
Gul järnoxid (E172)
Röd järnoxid (E172)
Svart järnoxid (E172)

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Blisterkort: Förvaras i originalförpackning.

Burkar: Tillslut plastburk väl.

6.5 Förpacknings typ och innehåll

Blisterkort (PVC/PE/PVDC/aluminium) i kartong med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 eller 200 kapslar med modifierad frisättning, och engångsförpackningar med 200 (2 x 100) kapslar med modifierad frisättning.

HDPE-burkar med PP-barnskyddande lock: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 eller 200 kapslar med modifierad frisättning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga speciella anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Viatris Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart

Dublin 15
DUBLIN
Irland

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

20710

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 23.3.2005
Datum för den senaste förnyelsen: 23.3.2010

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

20.3.2023