

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml infuusioneste, liuos
Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml infuusioneste, liuos

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml infuusioneste, liuos
1 ml infuusionestettä sisältää 0,08 mg ondansetronia (hydroklorididihydraattina).
Yksi 100 ml:n pullo sisältää 8 mg ondansetronia.

Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml infuusioneste, liuos
1 ml infuusionestettä sisältää 0,16 mg ondansetronia (hydroklorididihydraattina).
Yksi 50 ml:n pullo sisältää 8 mg ondansetronia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan
1 ml infuusionestettä sisältää 3,57 mg natriumia natriumsitraattidihydraattina ja natriumkloridina.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Infuusioneste, liuos

Kirkas, väritön vesiliuos.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Aikuiset

- Solunsalpaajahoidon ja sädehoidon aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun ennaltaehkäisyyn ja hoitoon
- Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Pediatriset potilaat

- Solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon vähintään kuuden kuukauden ikäisille lapsille
- Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn ja hoitoon vähintään yhden kuukauden ikäisille lapsille.

4.2 Annostus ja antotapa

Ondansetronia on saatavana oraalisina, parenteraalisina ja rektaalisina valmisteina, mikä mahdollistaa joustavan antotavan ja annostelun. Tämä valmiste on kuitenkin tarkoitettu annettavaksi vain laskimoon.

Annostus

Solunsalpaajahoidon ja sädehoidon aiheuttama pahoinvoimi ja oksentelu

Syöpähoidoista aiheutuvan emetogeenisen vaiktuksen voimakkuus vaihtelee annoksen ja käytetyn solunsalpaajahoidon ja sädehoidon yhdistelmän mukaan. Annos määritellään solunsalpaajahoidon emetogeenisen vaiktuksen voimakkuuden mukaan.

Aikuiset

Ondansetroni-infusionesteen annos vaihtelee välillä 8–32 mg vuorokaudessa. Annos pitää määritellä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Emetogeeninen solunsalpaaja- ja sädehoito
Suositeltu ondansetroniannos on 8 mg annettuna 15 minuuttia kestävänä infuusiona laskimoon juuri ennen hoitoa.
Ensimmäisten 24 tunnin jälkeen ilmaantuvan viivästyneen tai pitkittyneen oksentelun ennaltaehkäisemiseksi suositellaan oraalista tai rektaalista antoa.
- Voimakkaasti emetogeeninen solunsalpaajahoito
Laskimoon tai lihakseen (tämä lääkevalmiste annetaan vain laskimoon) annetun ondansetronin tehon on osoitettu olevan yhtä hyvä seuraavilla annostusohjelmilla solunsalpaajahoidon ensimmäisten 24 tunnin aikana:
 - Ondansetronia voidaan antaa 8 mg:n kerta-annos infuusiona laskimoon 15 minuutin ajan juuri ennen solunsalpaajahoitoa.
 - Yli 8 mg:n ja enintään 16 mg:n kerta-annos ondansetronia voidaan antaa infuusiona, mutta infuusion keston on oltava vähintään 15 minuuttia. Yli 16 mg:n kerta-annosta ei saa antaa annosriippuvaisen QT-ajan pitenemisen vaaran vuoksi (ks. kohdat 4.4, 4.8 ja 5.1).
Voimakkaasti emetogeenisen solunsalpaajahoidon yhteydessä ondansetronia voidaan antaa 8 mg:n annos lyhyenä, 15 minuuttia kestävänä infuusiona laskimoon juuri ennen solunsalpaajahoitoa, minkä jälkeen annetaan vielä kaksi 8 mg:n annosta laskimoon vähintään 4 tunnin välein.
Ondansetronin tehoa voimakkaasti emetogeeniseen solunsalpaajahoitoon voidaan voimistaa antamalla lisäksi 20 mg:n kerta-annos deksametasoninatriumfosfaattia laskimoon ennen solunsalpaajahoidon antamista.

Ensimmäisen 24 tunnin jälkeen ilmaantuvan viivästyneen tai pitkittyneen oksentelun ennaltaehkäisemiseksi suositellaan oraalista tai rektaalista hoitoa.

Pediatriset potilaat:

Solunsalpaajahoidon aiheuttama pahoinvoiointi ja oksentelu ≥ 6 kuukauden ikäisillä lapsilla ja nuorilla:

Solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahoinvoiinnin ja oksentelun hoitona annettavan annoksen suuruus voidaan laskea kehon pinta-alan (BSA) tai painon perusteella – katso alla oleva taulukko. Pediatrisissa kliinissä tutkimuksissa ondansetronia annettiin infuusiona laskimoon laimennettuna 25–50 ml:aan keittosuolaliusta tai muuhun yhteensopivaan infusionesteeseen ja annettuna vähintään 15 minuuttia kestävänä infuusiona. Koska tämän lääkevalmisteen ondansetroni on jo laimenettussa, käyttövalmiissa muodossa, lisälaimentaminen ei ole tarpeen. Painon mukaan laskettu päiväannos on kehon pinta-alan (BSA) mukaan laskettua suurempi (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).

Infuusiona annettava ondansetroni on annettava laskimoon vähintään 15 minuuttia kestävänä infuusiona.

Ondansetronin käytöstä lasten viivästyneen tai pitkittyneen pahoinvoiinnin ja oksentelun ehkäisyssä ei ole kontrolloituissa kliinissä tutkimuksissa saatua tietoa.

Myös tiedot ondansetronin käytöstä sädehoidon aiheuttaman pahoinvoiinnin ja oksentelun hoidossa lapsilla puuttuvat (ei kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia).

- Kehon pinta-alan (BSA) mukainen annostelu
Ondansetroni annetaan 5 mg/m²:n kerta-annoksesta laskimoon välittömästi ennen solunsalpaajahoidon aloittamista. Laskimoon annettava annos ei saa ylittää 8 mg:aa. Suun kautta annettava lääkehoito voidaan aloittaa 12 tunnin kuluttua ja sitä voidaan jatkaa enintään 5 päivää (ks. taulukko 1).
Kokonaispäivään annos ei saa ylittää aikuiselle annettavaa 32 mg:n annosta.

Taulukko 1: Kehon pinta-alan perustuva annostus (BSA) solunsalpaajahoidon yhteydessä - Lapset (vähintään 6 kuukauden ikäiset) ja nuoret

BSA	Päivä 1 ^(a, b)	Päivät 2-6 ^(b)
< 0,6 m ²	5 mg/m ² i.v. plus 2 mg oraalinestettä 12 tunnin kuluttua	2 mg oraalinestettä 12 tunnin välein
≥ 0,6 m ²	5 mg/m ² i.v. plus 4 mg oraalinestettä tai tabletti 12 tunnin kuluttua	4 mg oraalinestettä tai tabletti 12 tunnin välein
> 1,2 m ²	5 mg/m ² i.v. tai 8 mg i.v. plus 8 mg oraalinestettä tai tabletti 12 tunnin kuluttua	8 mg oraalinestettä tai tabletti 12 tunnin välein

^a Laskimoon annettava annos ei saa ylittää 8 mg:aa.

^b Kokonaispäivään annokset eivät saa ylittää aikuisten 32 mg:n annosta.

- Painon mukainen annostelu
Painon mukaan laskettu päivään annos on kehon pinta-alan (BSA) mukaan laskettua suurempi (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).
Ondansetroni annetaan 0,15 mg/kg:n kerta-annoksesta laskimoon välittömästi ennen solunsalpaajahoidon aloittamista. Laskimoon annettava annos ei saa ylittää 8 mg:aa. Kaksi seuraavaa laskimoon annettavaa annosta voidaan antaa neljän tunnin välein.
Kokonaispäivään annos ei saa ylittää aikuiselle annettavaa 32 mg:n annosta.
Suun kautta annettava lääkehoito voidaan aloittaa 12 tunnin kuluttua ja sitä voidaan jatkaa 5 päivää (ks. taulukko 2).

Taulukko 2: Painoon perustuva annostus solunsalpaajahoidon yhteydessä - Lapset (vähintään 6 kuukauden ikäiset) ja nuoret

Paino	Päivä 1 ^(a, b)	Päivä 2-6 ^(b)
≤ 10 kg	ad 3 x 0,15 mg/kg 4 tunnin välein	2 mg oraalinestettä 12 tunnin välein
> 10 kg	ad 3 x 0,15 mg/kg 4 tunnin välein	4 mg oraalinestettä tai tabletti 12 tunnin välein

^a Laskimoon annettava annos ei saa ylittää 8 mg:aa.

^b Kokonaispäivään annos ei saa ylittää aikuisten 32 mg:n annosta.

Iäkkääät potilaat

Kaikki laskimoon annettavat annokset on annettava vähintään 15 minuuttia kestäväin infuusiona. **65–74-vuotiaille potilaille** voidaan käyttää aikuisten annostusohjelmaa.

Vähintään 75-vuotiaalle potilaille ondansetronin aloitusannos laskimoon annettuna saa olla korkeintaan 8 mg, minkä jälkeen voidaan antaa vielä kaksi 8 mg:n annosta laskimoon vähintään neljän tunnin välein. (Ks. kohta 5.2.)

Katso myös kohta Erityisryhmät.

Leikkauksenjälkeinen pahoinvoointi ja oksentelu

Aikuiset:

- Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ennaltaehkäisy
Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ennaltaehkäisyyyn annettavan ondansetroni-infusioon suositeltu annos on 4 mg:n kerta-annos annettuna lyhytaikaisena infusiona laskimoon anestesiaa aloitettaessa.
- Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun hoito
Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon suositellaan annettavaksi 4 mg kerta-annoksesta lyhytaikaisena infusiona laskimoon.

Pediatriset potilaat:

Vähintään 1 kuukauden ikäiset lapset ja nuoret:

Infusioon annettava ondansetroni on annettava laskimoon vähintään 15 minuuttia kestävästä infusioonasta.

- Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisy
Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyyn lapsipotilaille, joille tehdään kirurginen toimenpide yleisanestesiassa, ondansetronia voidaan antaa kerta-annoksesta lyhytaikaisena infusiona laskimoon joko ennen anestesian induktiota, sen yhteydessä tai sen jälkeen. Annoksen suuruus on 0,1 mg/kg, maksimiannos on 4 mg.
- Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun hoito
Pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon lapsipotilaille, joille tehdään kirurginen toimenpide yleisanestesiassa, ondansetronia voidaan antaa kerta-annoksesta lyhytaikaisena infusiona laskimoon. Annoksen suuruus on 0,1 mg/kg, maksimiannos on 4 mg.

Iäkkääät potilaat

Ondansetronin käytöstä leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ennaltaehkäisyyyn ja hoitoon iäkkäillä on vain vähän kokemusta. Solunsalpaajahoitoa saavat yli 65-vuotiaat potilaat kuitenkin sietävät ondansetronia hyvin.

Katso myös kohta "Erityisryhmät"

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Vuorokausiannosta, antotiheyttä tai antotapaa ei tarvitse muuttaa.

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Keskivaikeaa tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ondansetronin puhdistuma on huomattavasti heikentynyt ja puoliintumisaika seerumissa huomattavasti pidettyyn. Tällaisilla potilailla 8 mg:n kokonaisvuorokausiannosta ei saa ylittää.

Potilaat, joiden sparteiini-/debrisokiinimetabolia on hidat

Ondansetronin eliminaation puoliintumisaika ei muutu potilailla, joiden sparteiini- ja debrisokiinimetabolian on todettu olevan hidat. Näin ollen lääkevalmisteen toistuvasta annosta ei aiheudu näille potilaalle tavallisesta väestöstä poikkeavaa altistusta. Vuorokausiannosta tai antotiheyttä ei tarvitse muuttaa.

Antotapa

Laskimoon

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyys ondansetronille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Samanaikainen käyttö apomorfiinin kanssa (ks. kohta 4.5).

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yleistä

Muille selektiivisille 5-HT₃-reseptorin antagonistille yliherkillä potilailla on ilmoitettu yliherkkyysreaktioita.

Hengitysteihin kohdistuvat haittavaikutukset pitää hoitaa oireenmukaisesti, ja niihin pitää kiinnittää erityistä huomiota yliherkkyysreaktioiden esiasteina.

Ondansetroni pidentää QT-aikaa annosriippuvaisesti (ks. kohta 5). Lisäksi markkinoille tulon jälkeen on raportoitu kääntyvien kärkien kammiotakykardia -tapaauksia ondansetronia käytäneillä potilailla. Ondansetronin käyttöä on välttävä potilaille, joilla on synnynnäinen pitkä QT-oireyhtymä. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa ondansetronia potilaille, joilla on tai joille saattaa kehittyä QTc-ajan pidentyminen. Näitä ovat potilaat, joilla on elektrolyyttihäiriötä, kongesttiivinen sydämen vajaatoiminta tai bradyarytmia tai jotka käyttävät muita QT-aikaa pidentäviä tai elektrolyyttasapainoa muuttavia lääkevalmisteita. Ks. kohta 4.5.

Ondansetronilla hoidetuilla potilailla on ilmoitettu sydänlihasiskemiaa. Joillakin potilailla, erityisesti lääkettä laskimonsisäisesti saaneilla, oireet ilmenivät välittömästi ondansetronin antamisen jälkeen. Potilaita on varoitettava sydänlihasiskemian merkeistä ja oireista.

Hypokalemia ja hypomagnesemia on korjattava ennen ondansetronin antoaa.

Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu serotoninoireyhtymää (mukaan lukien mielentilan muutoksia, autonomisen hermoston epävakautta ja hermo-lihaspoikkeavuuksia), kun ondansetronia on annettu samanaikaisesti serotonergisten lääkevalmisteiden (mukaan lukien selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI) ja seroniiniin ja noradrenaliiniin takaisinoton estäjien (SNRI)) kanssa. Jos samanaikainen hoito ondansetronilla ja muilla serotonergisillä lääkevalmisteilla on kliinisesti perusteltua, potilasta on seurattava asianmukaisesti.

Kita- ja nielurisaleikkauksessa olleille potilaille pahoinvoinnin ja oksentelun ennaltaehkäisyyn annettu ondansetroni voi peittää piilevän verenvuodon. Siksi näiden potilaiden tilaa on seurattava tarkoin ondansetronin annon jälkeen.

Koska ondansetronin tiedetään hidastavan paksusuolen toimintaa, lääkkeen annon jälkeen on seurattava sellaisten potilaiden tilaa, jolla on merkkejä subakuutista suolentukkeumasta.

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml infuusioneste, liuos

Tämä lääkevalmiste sisältää 357 mg natriumia per pullo, joka vastaa 17,9 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml infuusioneste, liuos

Tämä lääkevalmiste sisältää 178,5 mg natriumia per pullo, joka vastaa 8,9 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Pediatriset potilaat:

Jos lapsipotilaat saavat ondansetronia maksatoksisen solunsalpaajahoidon yhteydessä, on maksan toimintaa seurattava tarkkaan.

Solunsalpaajahoidon aiheuttama pahoinvoindi ja oksentelu:

Jos lääkeannos lasketaan mg/kg:na ja lääkettä annetaan kolme annosta neljän tunnin välein, kokonaispäiväännessä on suurempi kuin jos 5 mg/m²:n kerta-annoksen jälkeen annetaan yksi annos suun kautta. Näiden kahden eri annostelutavan tehokkuutta ei ole vertailtu klinisissä tutkimuksissa.

Ristikkäistutkimuksena tehdyssä vertailussa annostelutapojen tehokkuudessa ei ole havaittu eroja (ks. kohta 5.1).

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ei ole näyttöä, että ondansetroni indusoisi tai estäisi sen kanssa tavallisesti samanaikaisesti annettujen lääkevalmisteiden metabolismia.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ondansetronilla ei ole yhteisvaikutuksia seuraavien kanssa:

- alkoholi
- tematsepaami
- furosemidi
- alfentaniili
- tramadol (metabolia)
- morfiini
- lidokaattiini
- propofoli tai
- tiopentaali.

Tramadol

Tramadolin analgeettinen vaikutus välittyy osittain serotonista riippuvalisen mekanismin kautta. Koska ondansetroni on 5HT₃-reseptorin antagonistti, sen arvellaan vaikuttavan analgeettiseen vaikutukseen. Lisäksi suppeista tutkimuksista saadut tiedot viittaavat siihen, että ondansetroni saattaa heikentää tramadolin analgeettista vaikutusta.

Sytokromi P-450:tä estävät lääkeaineet

Ondansetroni metaboloituu useiden maksan sytokromi P-450-entsyyymiä, CYP3A4:n, CYP2D6:n ja CYP1A2:n välityksellä. Koska useat entsyymit kykenevät metaboloimaan ondansetronia, muut entsyymit tavallisesti kompensoivat yhden entsyymin inhibition tai alentuneen toiminnan (esim. CYP2D6-entsyymin geneettinen puutos). Täten yhden entsyymin inhibitiosta tai alentuneesta toiminnasta aiheutuu vain vähäinen tai merkityksetön muutos ondansetronin kokonaispuhdistumaan tai annostarpeeseen.

CYP3A4-entsyymin indusoijat

Voimakkaita CYP3A4-entsyymin indusoijia (esim. fenytoiini, karbamatepiini ja rifampisiini) saavilla potilailla ondansetronin oraalin puhdistuma lisääntyi ja ondansetronin pitoisuus veressä pieneni.

QT-aikaa pidentävät vaikuttavat lääkeaineet (esim. antrasykliinit)

Ondansetronin käyttö QT-aikaa pidentävien vaikuttavien aineiden kanssa saattaa pidentää QT-aikaa entisestään.

Ondansetronin ja kardiotoksisten vaikuttavien lääkeaineiden (esim. antrasykliinit kuten doksorubisiini ja daunorubisiini tai trastutsumabi), antibioottien (kuten erytromysiini tai ketokonatsoli), rytmihäiriölääkkeiden (kuten amiodaroni) ja beetasalpaajien (kuten atenololi tai timololi) samanaikainen käyttö saattaa lisätä rytmihäiriöiden riskiä (ks. kohta 4.4).

Serotonergiset lääkeaineet (SSRI:t ja SNRI:t mukaan lukien)

Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu serotoninoireyhtymää (mukaan lukien mielentilan muutoksia, autonomisen hermoston epävakautta ja hermo-lihaspoikkeavuuksia), kun ondansetronia on

annettu samanaikaisesti serotonergisten vaikuttavien lääkeaineiden (mukaan lukien selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjien (SNRI)) kanssa (ks. kohta 4.4).

Apomorfiini

Annettaessa ondansetronia samanaikaisesti apomorfiinihydrokloridin kanssa on raportoitu vaikeasteista hypotensiota ja tajunnan menetystä. Tämän takia samanaikainen käyttö apomorfiinin kanssa on vasta-aihesta.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetyks

Naiset, jotka voivat saada lapsia

Naisten, jotka voivat saada lapsia, on harkittava ehkäisyä.

Raskaus

Epidemiologisista tutkimuksista saadun kokemuksen perusteella ondansetronin epäillään aiheuttavan orofasiaalisia epämuodostumia, jos sitä annetaan raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Yhdessä kohorttitutkimuksessa, joka kattoi 1,8 miljoonaa raskautta, ondansetronin käytöön raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana liittyi huuli- ja/tai suulakihalkion suurentunut riski (3 ylimääristä tapausta 10 000:ta ondansetronihoitoa saanutta naista kohti; vakioitu suhteellinen riski, 1,24, (95 % CI 1,03–1,48)).

Saatavilla olevat sydämen epämuodostumia koskevat epidemiologiset tutkimukset osoittavat keskenään ristiriitaisia tuloksia.

Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuuria lisääntymistoksisia haittavaikutuksia

Ondansetronia ei saa käyttää raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Imetyks

Tutkimusten perusteella ondansetroni erittyy imettävien eläinten maatoon (ks. kohta 5.3). Siksi suositellaan, että ondansetronia saavat äidit eivät imettäisi.

Hedelmällisyys

Tietoja ei saatavilla.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ondansetron B. Braun -valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Psykomotorisessa testauksessa ondansetroni ei heikennä suoritusta eikä aiheuta sedaatiota. Haitallisia vaikutuksia näihin toimintoihin ei ole ennustettavissa ondansetronin farmakologian perusteella.

4.8 Hattavaikutukset

Useimmin ilmoitetut ondansetronin hattavaikutukset ovat päänsärky, punastumisen/kuumotuksen tunne, (kuumat aallot) sekä ummetus, jotka voivat olla lyhykestoisia. Vakavimmat ondansetronin käytön yhteydessä ilmoitetut hattavaikutukset ovat EKG-muutokset, joihin sisältyy myös QT-ajan pidentyminen (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

Hattavaikutukset on lueteltu esiintymistilayden mukaan seuraavasti:

Hyvin yleiset ($\geq 1/10$);

Yleiset ($\geq 1/100$, $< 1/10$);

Melko harvinaiset ($\geq 1/1\ 000$, $< 1/100$);

Harvinaiset ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$)

Hyvin harvinaiset: (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Hyvin yleisiä, yleisiä ja melko harvinaisia tapahtumia koskevat tiedot on saatu pääasiassa alkuperäisvalmisteella tehdyistä klinisistä tutkimuksista. Esiintymistilheys lumeryhmässä on otettu huomioon. Harvinaiset ja hyvin harvinaiset tapahtumat on yleensä saatu alkuperäisvalmisten markkinoille tulon jälkeisen spontaanin haittavaikutusraportoinnin perusteella.

Seuraavassa esitetty esintymistilheydet on arvioitu käytettäessä ondansetronin suositeltuja annoksia.

Immuuni-järjestelmä

Harvinaiset

Välittömät yliherkkysreaktiot, jotka voivat toisinaan olla vakavia, kuten anafylaksia. Anafylaksia voi johtaa kuolemaan.

Hermosto

Hyvin yleiset

Päänsärky.

Melko harvinaiset

Tahattomia likehäiriöitä kuten ekstrapyramidaalioireita, esim. okulogyyriinen kriisi/dystoniiset reaktiot ja dyskinesia, on havaittu. Ei ole selkeää näyttöä, että näihin olisi liittynyt pitkäkestoisia klinisia jälkiseuraamuksia tai kohtauksia (esim. epileptisiä kouristuksia), eikä ondansetronilla pitäisi olla tämän tyypisiä vaikutuksia sen tunnetun farmakologisen vaikutusmekanismin perusteella. Huimaus nopean laskimoon tapahtuvan annostelun aikana.

Harvinaiset

Psyykkiset häiriöt

Hyvin harvinaiset

Masentuneisuus.

Silmät

Harvinaiset

Tilapäiset näköhäiriöt (esim. näön hämärtyminen) pääasiallisesti nopean laskimoon tapahtuvan annostelun aikana.

Hyvin harvinaiset

Tilapäinen sokeus pääasiallisesti laskimonsisäisen annon aikana. Suurin osa ilmoitetuista näön menetyksistä palautui 20 minuutin kuluessa. Useimmat potilaat olivat saaneet sisplatiinia sisältäviä solunsalpaajia. Jotkut tilapäisistä sokeustapauksista olivat kortikaalisia.

Sydän

Melko harvinaiset

Rintakipu, johon saattaa liittyä ST-tason laskua, rytmihäiriötä ja bradykardiaa. Rytmihäiriöt voivat johtaa yksittäisissä tapauksissa kuolemaan.

Harvinaiset

QTc-ajan pidentyminen (myös Torsade de Pointes)

Tuntematon

Sydänlihasiskemia (ks. kohta 4.4)

Verisuonisto

Yleiset

Punastumisen tai kuumotuksen tunne (kuumat aallot)

Melko harvinaiset

Hypotensiö.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Melko harvinaiset

Hikka.

Ruoansulatuselimistö

Yleiset

Ondansetronin tiedetään pidentävän läpikulkuaikaa paksusuolen läpi ja se saattaa aiheuttaa joillekin potilaille ummetusta.

Maksa ja sappi

Melko harvinaiset

Oireetonta maksan toimintaa kuvaavien arvojen suurenemista on

havaittu. Tällaisia reaktioita havaittiin usein esim. sisplatiinia sisältävää solunsalpaajahoitoa saavilla potilailla.

Iho ja ihonalaisten kudos

Melko harvinainen

Antokohdan alueella saattaa ilmetä yliherkkyyssreaktioita (esim. ihottumaa, nokkosihottumaa, kutinaa).

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleiset

Paikalliset reaktiot antokohdassa.

Pediatriset potilaat

Lapsilla ja nuorilla haittatapahtumaprofiili oli samankaltainen kuin aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkien haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9 Yliannostus

Oireet

Ondansetronin yliannostuksesta on vain vähän kokemusta. Yleisimmin raportoidut oireet olivat samanlaisia kuin ne, joita on raportoitu suositeltuja annoksia saaneilla potilailla (ks. kohta 4.8). Yliannostuksen on ilmoitettu aiheuttaneen muun muassa näköhäiriötä, vaikeaa ummetusta, hypotensiota ja vasovagaalisia tapahtumia, joihin on liittynyt ohimenevä toisen asteen eteiskammiokatkos. Kaikissa tapauksissa oireet paranivat täysin. Ondansetroni pidentää QT-aikaa annosriippuvaisesti. EKG-seurantaa suositellaan yliannostustapauksissa.

Pediatriset potilaat

12 kk:n – 2 vuoden ikäisillä imeväisillä ja lapsilla on raportoitu tahattoman, suun kautta otetun ondansetronin yliannostuksen jälkeen (arvioitu annos yli 4 mg/kg) pediatricsia potilastapauksia, joissa oirekuva vastaa serotoniinoireyhtymää.

Hoito

Ondansetronin yliannostukselle ei ole spesifistä antidoottia. Sen vuoksi kaikissa epäillyissä yliannostapauksissa on annettava asianmukaista oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa hoitoa.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeutinen ryhmä: Pahoinvoittilääkkeet, serotoniini(5-HT₃)antagonistit

ATC-koodi: A04AA01.

Vaikutusmekanismi

Ondansetroni on tehokas, hyvin selektiivinen 5-hydroksitryptamiini HT3 (5-HT₃) -reseptorin antagonistti.

Sen tarkkaa vaikutustapaa pahoinvoinnin ja oksentelun hillitsemisessä ei tunneta. Solunsalpaajat ja sädehoito voivat aiheuttaa 5-HT:n vapautumisen ohutsuolesta ja käynnistää siten oksennusrefleksin aktivoimalla vagaalisia afferenteja hermosyitä 5-HT₃-reseptorien kautta. Ondansetroni estää tämän refleksin käynnistymistä.

Vagaalisten afferentien hermosyiden aktivoituminen voi aiheuttaa 5-HT:n vapautumisen myös area postremassa, joka sijaitsee neljännen aivokammion pohjalla. Tämä voi aiheuttaa oksentelua sentraalisen mekanismin kautta.

Ondansetronin vaikutus solunsalpaaja- ja sädehoidon aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa johtuu siten todennäköisesti sekä perifeeristen että sentraalisten neuronien 5-HT₃-reseptorien antagonismista.

Vaikutustapaa leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa ei tunneta, mutta se saattaa olla osittain vastaava solunsalpaajien aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun kanssa.

Ondansetroni ei muuta prolaktiinin pitoisuutta plasmassa.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Ondansetronin merkitystä opiaattien aiheuttaman oksentelun hoidossa ei ole vielä osoitettu.

Ondansetronin vaikutusta QTc-aikaan arvioitiin kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa lumekontrolloidussa ja positiivisesti (moksifloksasiini) kontrolloidussa vaihtovuoroisessa kokeessa, johon osallistui 58 tervettä aikuista miestä ja naista. 8 mg:n ja 32 mg:n ondansetroniannokset infusoitiin laskimoon 15 minuutin kuluessa. Korkeimmalla testatulla annoksella, 32 mg, suurin keskimääräinen (90 %:n luottamusvälin yläraja) QTcF-ajan ero verrattuna lumelääkkeeseen lähtötasokorjauksen jälkeen oli 19,6 (21,5) ms. Pienemmällä testatulla 8 mg:n annoksella suurin keskimääräinen (90 %:n luottamusvälin yläraja) QTcF-ajan ero verrattuna lumelääkkeeseen lähtötason korjauksen jälkeen oli 5,8 (7,8) ms. Tässä tutkimuksessa ei ilmennyt yli 480 ms:n QTcF-mittaustasia eikä QTcF-aika pidetty yli 60 ms. Merkittäviä muutoksia ei havaittu mitatuissa elektrokardiografian PR- tai QRS-ajoissa.

Kliiniset tutkimukset pediatrisilla potilailla

Solunsalpaajahoidon aiheuttama pahoinvoitti ja oksentelu

Ondansetronin tehokkuutta syöpähoitona käytetyn solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun yhteydessä arvioitiin kaksoissokkoutetussa 415:lle iältään 1–18-vuotiaalle potilaalle tehdynässä satunnaistetussa tutkimuksessa (S3AB3006). Potilaille annettiin solunsalpaajahoidon yhteydessä ondansetronia joko 5 mg/m² laskimoon + 4 mg suun kautta 8–12 tunnin kuluttua tai ondansetronia 0,45 mg/kg laskimoon + lumelääke 8–12 tunnin kuluttua suun kautta.

Solunsalpaajahoidon pahimpana päivänä oksentelia ei esiintynyt lainkaan ensimmäisessä ryhmässä 49 prosentilla (5 mg/m² laskimoon + 4 mg suun kautta) ja toisessa 41 prosentilla (0,45 mg/kg laskimoon + lumelääke suun kautta). Solunsalpaajahoidon jälkeen molemmat ryhmät saivat 4 mg ondansetronia oraalinesteenä kahdesti päivässä kolmen päivän ajan. Hoitoryhmien välillä ei ollut eroa haittataapumien kokonaismäärässä.

438:lle iältään 1–17-vuotiaalle potilaalle tehty lumekontrolloitu kaksoissokkoutettu tutkimus (S3AB4003) osoitti, että pahoinvoittia ei esiintynyt solunsalpaajahoidon pahimpana päivänä:

- 73 prosentilla potilaista, joille annettiin ondansetronia laskimoon 5 mg/m² annoksena sekä 2–4 mg deksametasonia suun kautta
- 71 prosentilla potilaista, joille annettiin ondansetronia oraalinesteenä 8 mg:n annoksena sekä 2–4 mg deksametasonia suun kautta niinä päivinä, joina potilas sai solunsalpaajahoitoa.

Solunsalpaajahoidon jälkeen molemmat ryhmät saivat 4 mg ondansetronia oraalinesteenä kahdesti päivässä kahden päivän ajan. Hoitoryhmien välillä ei ollut eroa haittataapumien kokonaismuodostumisessa eikä luonteessa.

Ondansetronin tehokkuutta tutkittiin 75 lapsella (ikä 6–48 kuukautta) avoimessa, ei-verailevassa yksittäistutkimussa (S3A40320). Kaikki lapset saivat kolme 0,15 mg/kg:n suuruista annosta ondansetronia laskimoon, ensimmäisen 30 minuuttia ennen solunsalpaajahoidon aloittamista ja seuraavat neljän ja kahdeksan tuntia ensimmäisen annoksen jälkeen. Pahoinvainoinnin oireet pysyivät täydellisesti poissa 56 prosentilla potilaista.

Toinen avoin, ei-veraileva yksittäistutkimus (S3A239) tutki ondansetronihoidon tehokkuutta, kun sitä annettiin yksi 0,15 mg/kg:n annos laskimoon ja sen jälkeen kaksi 4 mg:n annosta suun kautta alle 12-vuotiaille lapsille ja kaksi 8 mg:n annosta vähintään 12-vuotiaille lapsille (yhteensä 28 lasta). Pahoinvainoinnin oireet pysyivät täydellisesti poissa 42 prosentilla potilaista.

Leikkauksenjälkeinen pahoinvointi ja oksentelu

Kerta-annoksesta annettavan ondansetronin tehokkuutta leikkauksenjälkeisen pahoinvainoinnin ja oksentelun ehkäisyssä tutkittiin 670:llä 1–24 kuukauden ikäisellä lapsella (ikä tutkimuksen jälkeen ≥ 44 viikkoa, paino ≥ 3 kg) satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkokokeessa.

Tutkimukseen osallistuneille tehtiin elektiivinen leikkaus yleisanestesiassa ja heidän fyysinen kuntonsa oli ASA-luokituksen mukaan $\leq III$. Ondansetroni annettiin 0,1 mg/kg:n kerta-annoksena viiden minuutin kuluessa anestesian induktiosta. 24 tunnin tarkkailujakson aikana oksentelukohtauksen saaneiden potilaiden osuus oli suurempi lumelääkettä saaneiden potilaiden kuin ondansetronia saaneiden potilaiden keskuudessa (28 % vs. 11 %, $p < 0,0001$).

Neljä lumekontrolloitua kaksoissokkouttua tutkimusta on tehty 1469:lle iältään 2–12-vuotiaalle lapsipotilaalle (pojille ja tytöille), joille tehtiin toimenpide yleisanestesiassa. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko yksi annos ondansetronia laskimoon (0,1 mg/kg 40 kg tai vähemmän painaville potilaalle ja 4 mg yli 40 kg painaville potilaille; potilaiden lukumäärä = 735) tai lumelääkettä (potilaiden lukumäärä = 734). Tutkimuslääkettä annettiin vähintään 30 sekunnin ajan välittömästi anestesian induktiota ennen tai sen jälkeen. Ondansetroni ehkäisi pahoinvointia ja oksenteliaa huomattavasti lumelääkettä tehokkaammin. Näiden tutkimusten tulokset esitetään taulukossa 3.

Taulukko 3: Leikkauksenjälkeisen pahoinvainoinnin ja oksentelun ehkäisy ja hoito lapsipotilailla – hoitovaste 24 tunnin aikana

Tutkimus	Päätepiste	Ondansetroni, %	Lumelääke, %	p-arvo
S3A380	CR	68	39	$\leq 0,001$
S3GT09	CR	61	35	$\leq 0,001$
S3A381	CR	53	17	$\leq 0,001$
S3GT11	ei pahoinvointia	64	51	0,004
S3GT11	ei oksentela	60	47	0,004

CR = ei pahoinvointikohtauksia, ei varalääkkeen tarvetta eikä tutkimuksesta vetäytymistä.

5.2 Farmakokinetiikka

Ondansetronin farmakokineettiset ominaisuudet eivät muudu toistuvien annosten aikana. Suoraa

korrelatiota plasmassa olevan pitoisuuden ja antiemeettisen vaikutuksen välillä ei ole varmistettu.

Imeytyminen

Suun kautta annettuna ondansetroni imeytyy passiivisesti ja täydellisesti ruoansulatuskanavasta ja käy läpi ensikierron metabolismin (biologinen hyötyosuuus on noin 60 %). Plasman huippupitoisuus on noin 30 ng/ml ja saavutetaan noin 1,5 tuntia 8 mg:n annoksen antamisen jälkeen. Yli 8 mg:n annoksilla ondansetronin systeeminen altistus suurenee suhteellisesti enemmän kuin annos. Tämä voi viitata ensikierron metabolismin heikkenemiseen suurilla oraalissa annoksilla. Suun kautta annosteltuna biologinen hyötyosuuus on hieman suurentunut ruokailun yhteydessä, mutta antasidien käyttö ei vaikuta siihen. **Laskimoon** yli 5 minuutin kestoisena infuusiona annetun 4 mg:n ondansetroni-annoksen jälkeen plasman huippupitoisuus on noin 65 ng/ml. Kun ondansetronia annetaan **lihakseen**, plasman huippupitoisuus on noin 25 ng/ml ja se saavutetaan 10 minuutin kuluessa injektiosta.

Jakautuminen

Ondansetronin jakautuminen on samankaltainen suun kautta, lihakseen tai laskimoon annetun annoksen jälkeen, jolloin vakaan tilan jakautumistilavuus on noin 140 litraa. Sekä lihakseen että laskimoon annettuna ondansetronin systeeminen altistus on ekvivalentti.

Proteiineihin sitoutuminen on kohtalaista (70–76 %).

Biotransformaatio

Ondansetroni poistuu systeemisestä verenkierrosta pääasiassa metaboloitumalla maksassa useiden entsyyymiä välityksellä. CYP2D6-entsyymin puuttuminen (debrisokiinin polymorfismi) ei vaikuta ondansetronin farmakokinetiikkaan.

Eliminaatio

Alle 5 % imetyneestä annoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan.

Terminaalinen puoliintumisaika on noin 3 tuntia.

Erityisryhmien farmakokinetiikka

Lapset ja nuoret (iältään 1 kuukautta - 17 vuotta)

Lapsipotilailla iältään 1–4 kuukautta (n = 19), joille tehtiin kirurginen toimenpide, puhdistuma suhteutettuna kehon painoon oli noin 30 % hitaampi kuin 5–24 kuukauden ikäisillä lapsilla (n = 22), mutta verrattavissa 3–12-vuotiaisiin potilaisiin. Puoliintumisaika ikäryhmässä 1–4 kk oli keskimäärin 6,7 tuntia verrattuna 2,9 tuntiin ikäryhmissä 5–24 kk ja 3–12 vuotta. Farmakokineettisten parametreiden erot ikäryhmissä 1–4 kk voidaan osittain selittää vastasyntyneiden ja pienkulosten suuremmalla kehon prosentuaalisella vesimäärellä ja ondansetronin tapaisen vesiliukoisena vaikuttavan aineen suuremmalla jakautumistilavudella.

Tutkimuksessa, jossa oli 3–12-vuotiaita yleisanestesiassa leikattuja potilaita, ondansetronin puhdistuman ja jakautumistilavuuden absoluuttiset arvot olivat pienemmät verrattuna aikuisten arvoihin. Molemmat parametrit kasvoivat lineaarisesti painon myötä ja 12 vuoden ikään mennessä lähestyivät nuorten aikuisten arvoja. Kun puhdistuma ja jakautumistilavuus suhteutettiin kehon painoon, näiden parametreiden arvot olivat samanlaiset eri ikäryhmissä. Painon mukainen annostus korvaa iästä johtuvat muutokset ja normalisoii systeemisen altistuksen lapsipotilailla.

Populaatiofarmakokineettinen analyysi tehtiin 428 henkilöllä (pediatrisia syöpäpotilaita, kirurgisia potilaita ja terveitä vapaaehtoisia), jotka olivat iältään 1 kuukaudesta 44 vuoteen ondansetronin laskimonsäisen annon jälkeen. Analyysin perusteella ondansetronin systeeminen altistus (AUC) oraalisen ja laskimonsäisen annon jälkeen lapsilla ja nuorilla oli verrattavissa aikuisten altistukseen,

paitsi 1–4 kuukauden ikäisillä vauvoilla. Jakautumistilavuus oli suhteessa ikään, ja se oli pienempi aikuisilla kuin vauvoilla ja lapsilla. Puhdistuma oli suhteessa painoon, mutta ei ikään, paitsi 1–4 kuukauden ikäisillä vauvoilla. On vaikea tehdä johtopäätöksiä, onko kyseessä puhdistuman lisääneneminen suhteessa ikään 1–4 kuukautisilla vauvoilla vai onko kyseessä ryhmän sisäinen vaihtelu tämän ikäryhmän tutkimushenkilöiden pienestä määristä johtuen. Koska alle 6 kuukauden ikäiset potilaat saavat vain kerta-annoksen leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun estoon, alentuneella puhdistumalla ei todennäköisesti ole kliinistä merkitystä.

Iäkkääät potilaat

Varhaiset vaiheen 1 tutkimukset terveillä iäkkäillä henkilöillä osoittivat, että iän myötä ondansetronin puhdistuma pienenee hieman ja puoliintumisaika pitenee. Vaihtelu tutkimushenkilöiden välillä oli kuitenkin suurta, jolloin nuorten (< 65-vuotiaat) ja iäkkäiden (≥ 65 -vuotiaat) henkilöiden farmakokineettisten parametrien arvot olivat merkittävin osin samaa luokkaa. Klinisissä tutkimuksissa, jotka koskivat solunsalpaajahoidon aiheuttamaa pahoinvointia ja oksentelia, nuorten ja iäkkäiden syöpäpotilaiden hoidon turvallisuudessa tai tehossa ei kokonaisuudessaan todettu sellaisia eroja, joiden perusteella iäkkäille olisi suositeltava erilaista annostusta.

Plasman ondansetronipitoisuuteen ja altistus-vasteeseen perustuvan tuoreen mallinnuksen mukaan vaikutus QTcF-aikaan on ennustettavasti suurempi ≥ 75 -vuotiailla potilailla kuin nuorilla aikuisilla. Yli 65-vuotiaalle ja yli 75-vuotiaalle potilaille on erityiset annostusohjeet (ks. kohta 4.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt (kreatiiniinpuhdistuma 15–60 ml/min), sekä systeemin puhdistuma että jakautumistilavuus pienenevät ondansetronin laskimoon annon jälkeen. Tästä on seurausena vähäinen, mutta klinisesti merkityksetön eliminaation puoliintumisajan pidentyminen (5,4 tuntia). Tutkimus, johon osallistui vakavaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia, säännöllistä hemodialysia vaativia potilaita (tutkittiin dialyysihoitojen välillä), osoitti ondansetronin farmakokinetikan pysyvän olennaisesti muuttumattomana laskimoon annon jälkeen.

Maksan vajaatoiminta

Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille suun kautta, laskimoon tai lihakseen annettuna ondansetronin systeemin puhdistuma heikkeni huomattavasti, mistä seurasi eliminaation puoliintumisajan piteneminen (15–32 tuntia) ja oraalisen hyötyosuuden suureneminen lähes 100 prosenttiin presysteemisen metabolismin heikentymisen vuoksi.

Erot sukupuolten välillä

Ondansetronin farmakokinetikkassa todettiin sukupuoleen liittyviä eroja, mikä ilmeni siten, että naisilla imetyminen oli suun kautta otetun annoksen jälkeen nopeampaa ja tehokkaampaa. Systeemin puhdistuma oli vähäisempää ja jakautumistilavuus (painoon suhteutettu) pienempi.

5.3 Prekliinis et tiedot turvallisudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymistoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisiille.

Ondansetroni ja sen metaboliitit kertyvät rottien maatoon. Maidon ja plasman suhde oli 5,2/1.

Kloonatuilla ihmisen sydämen ionikanavilla tehty tutkimus osoitti, että ondansetroni voi vaikuttaa sydämen repolarisaatioon estämällä HERG-kaliumkanavia. Tämän löydöksen kliinistä merkitystä ei tiedetä varmasti.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Natriumkloridi
Natriumsitraattidihydraatti
Sitraunahappomonohydraatti
Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka on mainittu kohdassa 6.6.

6.3 Kestoaika

Avaamattomat pullot:

24 kuukautta

Ensimmäisen avaamisen jälkeen

Tämä lääkevalmiste on käytettävä heti avaamisen jälkeen.

6.4 Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhaita.

Pidä pakaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

LDPE-pullot

Yksi pullo sisältää:

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml: 100 ml

Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml: 50 ml

Pakkauskoot:

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml: 10 x 100 ml

Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml: 10 x 50 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Vain kertakäyttöön. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Valmiste ja laimennos on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Ainoastaan kirkasta, väritöntä liuosta, jossa ei ole hiukkasia, saa käyttää.

Yhteensopivuus muiden lääkevalmisteiden kanssa: Seuraavia lääkevalmisteita voidaan antaa samanaikaisesti Ondansetron B. Braun -valmisteen kanssa ondansetronin antovälaineiston Y-puolen kautta. Yleisesti ottaen yhteensopivuus on osoitettu enintään 1 tuntiin asti, mutta samanaikaisesti annettavan lääkkeen valmistajan suositukset on otettava huomioon.

Sisplatiini: Enintään 0,48 mg/ml:n pitoisuudet (esim. 240 mg/500 ml).

Karboplatiini: 0,18–9,9 mg/ml:n pitoisuudet (esim. pitoisuudesta 90 mg/500 ml pitoisuuteen 990 mg/100 ml)

Etoposidi: 0,14–0,25 mg/ml:n pitoisuudet (esim. pitoisuudesta 72 mg/500 ml pitoisuuteen 250 mg/1 litra)

Keftatsidiimi: Yhteensopivuus on osoitettu 2000 mg:n annoksella, joka on laimennettu 20 ml:lla 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta, sekä 2000 mg:n annoksella, joka on laimennettu 10 ml:lla injektionesteisiin käytettävää vettä.

Syklofosfamidi: Yhteensopivuus on osoitettu 1000 mg:n annoksella, joka on laimennettu 50 ml:lla 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta.

Doksorubisiini: Enintään 2 mg/ml:n pitoisuudet (esim. 10 mg/5 ml tai 100 mg/200 ml).

Deksametasoni: Yhteensopivuus deksametasoninatriumfosfaatin ja ondansetronin välillä on osoitettu, joten näiden lääkkeiden antaminen on mahdollista saman nesteensiirtolaitteen kautta pitoisuksin, jotka deksametasoninatriumfosfaatin osalta ovat 32 mikrog–2,5 mg/ml ja ondansetronin osalta 8 mikrog–0,75 mg/ml.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Saksa

Postiosoite:
34209 Melsungen
Saksa

8. MYYNTILUVAN NUMERO

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml: 33147
Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml: 33148

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 20.10.2016
Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 17.8.2021

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

4.2.2022

PRODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml infusionsvätska, lösning
Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml infusionsvätska, lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml infusionsvätska, lösning

1 ml infusionsvätska, lösning innehåller 0,08 mg ondansetron (som hydrokloriddihydrat).
1 flaska med 100 ml innehåller 8 mg ondansetron.

Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml infusionsvätska, lösning

1 ml infusionsvätska, lösning, innehåller 0,16 mg ondansetron (som hydrokloriddihydrat)
1 flaska med 50 ml innehåller 8 mg ondansetron.

Hjälpmé med känd effekt

1 ml infusionsvätska, lösning, innehåller 3,57 mg natrium som natriumcitratdihydrat och natriumklorid.

För fullständig förteckning över hjälpménen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Infusionsvätska, lösning

Klar och färglös vattenlösning.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Vuxna

- Prevention och behandling av illamående och kräkningar orsakade av cytotoxisk kemoterapi och strålbehandling (CINV/RINV)
- Prevention och behandling av postoperativt illamående och kräkningar (PONV).

Pediatrisk population

- Behandling av illamående och kräkningar till följd av kemoterapi (CINV) hos barn ≥ 6 månader
- Prevention och behandling av postoperativt illamående och kräkningar (PONV) hos barn ≥ 1 månad.

4.2 Dosering och administreringssätt

Ondansetron finns för oral, parenteral och rektal användning för att möjliggöra flexibilitet avseende administreringsrutt och dosering.

Detta läkemedel är endast avsett för intravenös användning.

Dosering

Illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi eller strålbehandling

Den emetogena potentialen av cancerbehandlingen varierar beroende på dosering och kombinationer av kemoterapeutika och strålbehandling. Valet av dosregim ska bestämmas utifrån hur pass kraftig behandlingens emetogena effekt är.

Vuxna

Dosintervallet för ondansetron infusionsvätska, lösning är 8–32 mg per dag och lämplig dos väljs enligt anvisningarna nedan.

- **Emetogen kemoterapi och strålbehandling**

Den rekommenderade dosen av ondansetron är 8 mg som intravenös infusion under 15 minuter, omedelbart före behandling.

Oral eller rektal behandling rekommenderas för att förebygga fördröjt eller ihållande illamående efter de första 24 timmarna.

- **Högemetogen kemoterapi**

Ondansetron har visat sig vara lika effektivt i alla följande intravenösa eller intramuskulära (detta läkemedel ska dock endast ges intravenöst) doseringsregimer under kemoterapins första 24 timmar:

- Ondansetron kan ges som en engångsdos på 8 mg som intravenös infusion under 15 minuter omedelbart före kemoterapi
- Doser på över 8 mg och upp till högst 16 mg ondansetron kan infunderas men infusionstiden får inte understiga 15 minuter. En singeldos större än 16 mg får inte ges på grund av en dosberoende ökad risk för QT-förlängning (se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.1).

För behandling vid högemetogen kemoterapi kan en dos på 8 mg ondansetron administreras som kortvarig intravenös infusion under 15 minuter omedelbart före kemoterapi, följt av ytterligare två intravenösa doser på 8 mg med minst fyra timmars mellanrum.

Effekten av ondansetron vid högemetogen kemoterapi kan förstärkas genom att också ge en intravenös engångsdos av 20 mg dexametasonnatriumfosfat före kemoterapin.

Oral eller rektal behandling rekommenderas för att förebygga fördröjt eller ihållande illamående efter de första 24 timmarna.

Pediatrisk population

CINV hos barn ≥ 6 månader och ungdomar

Dosen för CINV kan räknas baserat på kroppsytan (BSA) eller vikten – se nedan.

I kliniska studier på barn administrerades ondansetron som intravenös infusion efter spädning i 25–50 ml natriumkloridlösning eller annan kompatibel infusionsvätska och infunderades under minst 15 minuter. Eftersom detta läkemedel redan är en färdigspädd brukslösning av ondansetron, är ingen ytterligare spädning nödvändig.

Viktbaserad dosering resulterar i större totala dygnsdoser jämfört med dosering baserad på kroppsytan (avsnitt 4.4 och 5.1).

Ondansetron infusion ska ges som intravenös infusion där infusionstiden får inte understiga 15 minuter.

Det saknas data från kontrollerade kliniska studier över användningen av ondansetron vid förebyggande av fördröjd eller ihållande CINV hos barn.

Det saknas data från kontrollerade kliniska studier över användningen av ondansetron för illamående

och kräkningar till följd av strålbehandling hos barn.

- Dosering baserad på kroppsyta

Ondansetron bör administreras omedelbart före kemoterapien som en intravenös engångsdos på 5 mg/m^2 . Den intravenösa dosen får inte överstiga 8 mg.

Oral dosering kan inledas 12 timmar senare och kan fortsätta i upp till 5 dagar (tabell 1).

Den totala dygnsdosen får inte överstiga dosen för vuxna på 32 mg.

Tabell 1: Dosering baserad på kroppsyta (BSA) vid kemoterapi - Barn ≥ 6 månader och ungdomar

Kroppsyta	Dag 1 ^(a, b)	Dag 2-6 ^(b)
$< 0,6 \text{ m}^2$	5 mg/ m^2 intravenöst plus 2 mg oral vätska efter 12 timmar	2 mg oral vätska var 12:e timme
$\geq 0,6 \text{ m}^2$	5 mg/ m^2 intravenöst plus 4 mg oral vätska eller tablett efter 12 timmar	4 mg oral vätska eller tablett var 12:e timme
$> 1,2 \text{ m}^2$	5 mg/ m^2 intravenöst eller 8 mg intravenöst plus 8 mg oral vätska eller tablett efter 12 timmar	8 mg oral vätska eller tablett var 12:e timme

^a Den intravenösa dosen får inte överstiga 8 mg.

^b De totala dygnsdoserna får inte överstiga dosen för vuxna på 32 mg

- Dosering baserad på kroppsvikt:

Viktbaserad dosering ger högre totala dygnsdoser jämfört med dosering baserad på kroppssytan (avsnitt 4.4 och 5.1).

Ondansetron ska administreras omedelbart före kemoterapi som en intravenös engångsdos på $0,15 \text{ mg/kg}$. Den intravenösa dosen får inte överstiga 8 mg. Ytterligare två intravenösa doser kan ges med 4 timmars mellanrum. Den totala dygnsdosen får inte överstiga vuxendosen på 32 mg.

Oral dosering kan inledas 12 timmar senare och kan fortsätta i upp till 5 dagar (tabell 2).

Tabell 2: Viktbaserad dosering vid kemoterapi - Barn ≥ 6 månader och ungdomar

Vikt	Dag 1 ^(a, b)	Dag 2-6 ^(b)
$\leq 10 \text{ kg}$	Upp till 3 doser på $0,15 \text{ mg/kg}$ var 4:e timme	2 mg oral vätska var 12:e timme
$> 10 \text{ kg}$	Upp till 3 doser på $0,15 \text{ mg/kg}$ var 4:e timme	4 mg oral vätska eller tablett var 12:e timme

^a Den intravenösa dosen får inte överstiga 8 mg.

^b Den totala dygnsdosen får inte överstiga dosen för vuxna på 32 mg.

Äldre patienter

Infusionstiden får inte vara kortare än 15 minuter. För patienter mellan 65 och 74 års ålder kan doseringsschemat för vuxna följas.

För patienter som är 75 år eller äldre ska den initiala intravenösa dosen ondansetron inte överstiga 8 mg. Den initiala dosen om 8 mg kan följas av två ytterligare intravenösa doser om 8 mg med minst 4 timmars mellanrum. (Se avsnitt 5.2.)

Se också ”Särskilda patientgrupper”.

Postoperativt illamående och kräkningar (PONV)

Vuxna

- Prevention av PONV
För prevention av PONV är den rekommenderade dosen för ondansetron infusion en engångsdos om 4 mg som kortvarig intravenös infusion vid induktion av anestesi.
- Behandling av befintlig PONV
För behandling av befintlig PONV rekommenderas en engångsdos på 4 mg ondansetron som kortvarig intravenös infusion.

Pediatrisk population

Barn ≥ 1 månad och ungdomar

Infusionstiden får inte vara kortare än 15 minuter.

- Prevention av PONV
För prevention av PONV hos barn vid kirurgiskt ingrepp i allmän anestesi kan en engångsdos ondansetron administreras genom kortvarig intravenös infusion med en dos på 0,1 mg/kg upp till maximalt 4 mg antingen före, vid eller efter induktion av anestesi.
- Behandling av PONV efter kirurgiskt ingrepp
För behandling av PONV hos barn med kirurgiska ingrepp i allmän anestesi kan en engångsdos ondansetron administreras genom kortvarig intravenös infusion med en dos på 0,1 mg/kg upp till maximalt 4 mg.

Äldre

Det finns endast begränsad erfarenhet gällande användning av ondansetron för prevention och behandling av PONV hos äldre. Ondansetron tolereras dock väl av patienter över 65 år som får kemoterapi.

Se också ”Särskilda patientgrupper”.

Särskilda patientgrupper

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen justering av daglig dos, dosintervall eller administreringssätt är nödvändig.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Clearance för ondansetron reduceras signifikant och halveringstiden i serum förlängs signifikant hos patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion. Den totala dygnsdosen ska inte överstiga 8 mg hos dessa patienter.

Patienter med nedsatt metabolism av spartein/debrisokin

Eliminationens halveringstid för ondansetron förändras inte hos patienter som klassificeras som långsamma metaboliserares av spartein och debrisokin. Följaktligen kommer upprepad dosering till dessa patienter inte att ge en exponering som skiljer sig från den övriga populationen. Ingen justering av daglig dos eller dosintervall är därför nödvändig.

Administreringssätt

Intravenös användning.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot ondansetron eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig användning med apomorfin (se avsnitt 4.5).

4.4 Varningar och försiktighet

Allmänt

Överkänslighetsreaktioner har rapporterats hos patienter som visat överkänslighet mot andra selektiva 5-HT₃-receptorantagonister.

Respiratoriska händelser ska behandlas symptomatiskt, och läkaren ska vara särskilt uppmärksam på sådana händelser, då de kan förebåda överkänslighetsreaktioner.

Ondansetron orsakar en dosberoende förlängning av QT-intervall (se avsnitt 5). Dessutom har det efter marknadsintroduktion rapporterats om fall av torsades de pointes hos patienter som använt ondansetron. Undvik ondansetron till patienter med medfött långt QT-syndrom. Ondansetron bör ges med försiktighet till patienter som har eller kan utveckla förlängning av QTc, inklusive patienter med elektrolytrubbningsar, kongestiv hjärtsvikt, bradyarytmier eller patienter som tar andra läkemedel som leder till QT-förlängning eller elektrolytrubbningsar. Se avsnitt 4.5.

Fall av myokardischemi har rapporterats hos patienter som behandlats med ondansetron. Hos vissa patienter, särskilt vid intravenös administrering, uppträddes symptom omedelbart efter administrering av ondansetron. Patienterna bör uppmärksamas på tecken och symptom på myokardischemi.

Hypokalemi och hypomagnesemi bör korrigeras innan ondansetron administreras.

Rapporter efter marknadsintroduktion har beskrivit patienter med serotonininsyndrom (rärländ förändrat mentalt tillstånd, autonom instabilitet och neuromuskulära avvikelser) vid samtidig användning av ondansetron och andra serotonerga läkemedel (inklusive selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)). Om samtidig behandling med ondansetron och andra serotonerga läkemedel är kliniskt indicerat rekommenderas lämplig övervakning av patienten.

Hos patienter med adenotonsillär kirurgi kan ondansetron, givet för att förebygga illamående och kräkningar, maskera dold blödning. Därför ska dessa patienter övervakas noga efter administrering av ondansetron.

Det är känt att ondansetron förlänger tiden för tjocktarmspassage. Därför ska patienter med tecken på subakut tarmobstruktion övervakas efter administrering.

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml infusionsvätska, lösning

Detta läkemedel innehåller 357 mg natrium per flaska, motsvarande 17,9 % av WHOs högsta rekommenderat daglig intag (2 gram natrium för vuxna).

Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml infusionsvätska, lösning

Detta läkemedel innehåller 178,5 mg natrium per flaska, motsvarande 8,9 % av WHOs högsta rekommenderat daglig intag (2 gram natrium för vuxna).

Pediatrisk population:

Barn som får ondansetron samtidigt med hepatotoxisk kemoterapi ska övervakas noggrant avseende försämrad leverfunktion.

Illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi:

Om dosen beräknas som mg/kg och ges vid tre tillfällen med 4-timmars mellanrum kommer den totala dygnsdosen bli högre än om en enkeldos på 5 mg/m² ges följt av en peroral dos. Effekten av dessa två doseringsregimer har inte jämförts i kliniska studier. En jämförelse mellan studier tyder på samma effekt av båda doseringsregimerna (se avsnitt 5.1).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det finns inga belägg för att ondansetron varken skulle inducera eller hämma metabolismen av andra läkemedel som ofta administreras samtidigt.

Specifika studier har visat att ondansetron inte interagerar med

- alkohol
- temazepam
- furosemid
- alfentanil
- tramadol (metabolism)
- morfin
- lidokain
- propofol eller
- tiopental.

Tramadol

Tramadol utövar sina analgetiska effekter delvis via en serotoninberoende mekanism. Eftersom ondansetron är en 5-HT₃-receptorantagonist misstänks påverkan på den analgetiska potentialen. Dessutom tyder data från mindre studier på att ondansetron kan minska den analgetiska effekten av tramadol.

Läkemedel som hämmar cytokrom P450

Ondansetron metaboliseras av ett flertal hepatiska cytokrom P450-enzym: CYP3A4, CYP2D6 och CYP1A2. Eftersom så pass många enzym förmår metabolisera ondansetron, kompenseras vanligen enzymhämnning eller minskad aktivitet av ett enzym (t.ex. genetiskt betingad CYP2D6-brist) av andra enzymer. Detta resulterar därför endast i en liten eller obetydlig förändring i clearance för ondansetron eller i dosbehovet.

Inducerare av CYP3A4

Patienter som behandlats med stora inducerare av CYP3A4 (t.ex. fenytoin, karbamazepin och rifampicin) uppvisade ökat oralt clearance av ondansetron med minskade koncentrationer av ondansetron i blodet som följd.

Läkemedel som orsakar förlängt QT-intervall (t.ex. antracykliner):

Användning av ondansetron tillsammans med läkemedel som förlänger QT-intervallen kan orsaka en ytterligare QT-förlängning.

Samtidig användning av ondansetron med kardiotoxiska läkemedel (t.ex. antracykliner såsom doxorubicin och daunorubicin) eller trastuzumab, antibiotika (såsom erytromycin eller ketokonazol), antiarytmika (såsom amiodaron) och betablockerare (såsom atenolol eller timolol) kan öka risken för arytmia (se avsnitt 4.4).

Serotonerga läkemedel (inklusive SSRI och SNRI)

Rapporter efter marknadsintroduktion har beskrivit patienter med serotonininsyndrom (räribland förändrat mentalt tillstånd, autonom instabilitet och neuromuskulära avväikelser) vid samtidig användning av ondansetron och andra serotonerga läkemedel (inklusive SSRI och SNRI) (se avsnitt 4.4).

Apomorfin

Baserat på rapporter om kraftig hypotoni och medvetslöshet då ondansetron gavs med apomorfinhydroklorid, är samtidig användning med apomorfin kontraindicerat.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder bör överväga att använda preventivmedel.

Graviditet

Baserat på data från epidemiologiska studier misstänks ondansetron orsaka läpp- och/eller gomspalt vid administrering under graviditetens första trimester. I en kohortstudie omfattande 1,8 miljoner graviditer förknippades användning av ondansetron under den första trimestern med en ökad risk för mun- och gomspalt (3 ytterligare fall per 10 000 behandlade kvinnor; justerad relativ risk, 1,24, (95 % CI 1,03–1,48)). Tillgängliga epidemiologiska studier visar motstridiga resultat avseende hjärtmissbildningar.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter avseende reproductionotoxicitet.

Ondansetron bör inte användas under graviditetens första trimester.

Amning

Studier har visat att ondansetron passerar över i modersmjölken hos digivande djur (se avsnitt 5.3). Därför rekommenderas att mödrar som behandlas med ondansetron inte ska amma sina barn.

Fertilitet

Inga data finns tillgängliga.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ondansetron B. Braun har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. I psykomotoriska studier påverkar inte ondansetron prestation och har inte heller sederande effekt. Inga negativa effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan förutsättas utifrån de farmakologiska egenskaperna för ondansetron.

4.8 Biverkningar

De vanligaste rapporterade biverkningarna för ondansetron är huvudvärk, blodvallningar, förstopning som kan vara kortvariga. De allvarligaste rapporterade biverkningarna för ondansetron är EKG-förändringar inklusive förlängning av QTc-intervall (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Biverkningar anges efter frekvens enligt följande:

- Mycket vanliga ($\geq 1/10$)
- Vanliga ($\geq 1/100, < 1/10$)
- Mindre vanliga ($\geq 1/1\ 000, < 1/100$)
- Sällsynta ($\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$)
- Mycket sällsynta ($< 1/10\ 000$)
- Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Mycket vanliga, vanliga och mindre vanliga biverkningar härrör huvudsakligen från kliniska prövningar med originalläkemedlet. För dessa har förekomsten med placebo tagits i beaktande. Sällsynta och mycket sällsynta biverkningar härrör huvudsakligen från spontanrapportering efter marknadsintroduktion för originalläkemedlet.

Följande frekvenser är en uppskattning vid användning av rekommenderade standarddosser av ondansetron.

Immunsystemet

Sällsynta: Omedelbara överkänslighetsreaktioner, ibland svåra inklusive anafylaxi. Anafylaxin kan vara dödlig.

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga: Huvudvärk

Mindre vanliga: Störningar med ofrivilliga rörelser såsom extrapyramidal reaktioner, t.ex. okulogyr kris, dystoni och dyskinesi utan definitiva tecken på bestående kliniska följd tillstånd och kramper (t.ex. epileptiska kramper) har observerats. Dock finns ingen känd farmakologisk mekanism hos ondansetron som skulle förklara dessa effekter.

Sällsynta: Yrsel vid snabb intravenös administrering.

Psykiska störningar

Mycket sällsynta: Depression

Ögon

Sällsynta: Övergående synstörningar (t.ex. dimsyn) huvudsakligen vid snabb intravenös administrering.

Mycket sällsynta: Övergående blindhet, huvudsakligen vid intravenös administrering. I de flesta av de rapporterade fallen försvann blindheten inom 20 minuter. De flesta patienterna hade fått kemoterapeutiska medel inklusive cisplatin. Vissa fall av övergående blindhet rapporterades ha kortikalt ursprung.

Hjärtat

Mindre vanliga: Bröstsmärta med eller utan ST-sänkning, hjärtarytmier och bradykardi. Hjärtarytmier kan i enstaka fall vara dödliga.

Sällsynta: Förlängning av QTc-intervall (inklusive torsades de pointes). Ingen känd frekvens Myokardischemi (se avsnitt 4.4)

Blodkärl

Vanliga: Blodvallningar

Mindre vanliga: Hypotension.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga: Hicka.

Magtarmkanalen

Vanliga: Det är känt att ondansetron förlänger tiden för tjocktarmpassage och kan orsaka förstopning hos en del patienter.

Lever och gallvägar

Mindre vanliga: Asymptomatiska, förhöjda leverfunktionsvärden har observerats. Dessa reaktioner observerades ofta hos patienter som fick kemoterapibehandling med t.ex. cisplatin.

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Överkänslighetsreaktioner vid administreringsstället (t.ex. utslag, urtikaria, klåda).

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Lokala reaktioner vid administreringsstället.

Pediatrisk population

Biverkningsprofilen för barn och ungdomar är jämförbar med den hos vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

4.9 Överdosering

Symtom

Det finns endast begränsad erfarenhet av överdosering med ondansetron. I de flesta fall var symtomen liknande de som redan rapporterats hos patienter som fått rekommenderad dos (se avsnitt 4.8).

Symtom som rapporterats är synstörningar, svår förstopning, hypotension och vasovagal episod med övergående AV-block grad II. Symtomen var övergående i alla dessa fall.

Ondansetron förlänger QT-intervalliet på ett dosberoende sätt. EKG-övervakning rekommenderas vid fall av överdosering.

Pediatrisk population

Pediatriska fall som överensstämmer med serotonergt syndrom har rapporterats efter oavsiktlig peroral överdosering av ondansetron (uppskattat intag som överstiger 4 mg/kg) hos spädbarn och barn i åldern 12 månader till 2 år.

Behandling

Det finns ingen specifik antidot vid överdosering av ondansetron. Därför ska adekvat symptomatisk och stödjande behandling ges vid alla fall av misstänkt överdosering.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiemetika, serotonin (5HT₃)-receptorantagonister
ATC-kod: A04AA01

Verkningsmekanism

Ondansetron är en potent och mycket selektiv 5-hydroxitryptamin HT3 (5HT₃)-receptorantagonist.

Den exakta verkningsmekanismen för kontroll av illamående och kräkningar är inte känd.

Kemoterapeutika och strålbehandling kan inducera frisättning av 5HT i tunntarmen och initiera kräkreflex genom aktivering av vagala, afferenta nerver via 5HT₃-receptorerna. Ondansetron blockerar initieringen av denna reflex.

Aktivering av vagala, afferenta nerver kan också orsaka en frisättning av 5HT i area postrema, belägen på bottnen av den fjärde hjärnventrikeln, och detta kan också medverka till att framkalla illamående genom en central mekanism.

Härmed kan effekten av ondansetron vid kontroll av illamående och kräkningar till följd av kemoterapi/strålbehandling sannolikt förklaras av 5HT₃-receptorantagonism i neuroner belägna i såväl det perifera som det centrala nervsystemet.

Verkningsmekanismerna vid behandling av postoperativt illamående och kräkningar är inte kända, men de kan vara desamma som vid cytotoxiskt inducerat illamående och kräkningar.

Ondansetron förändrar inte koncentrationerna av prolaktin i plasma.

Farmakodynamisk effekt

Ondansetronets roll vid behandling av opioidinducerat illamående är ännu inte fastställd.

Effekten av ondansetron på QTc-intervallet utvärderades i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad crossover-studie med aktiv kontroll (moxifloxacin) på 58 friska män och kvinnor. I studien administrerades ondansetron i doser om 8 mg och 32 mg som intravenös infusion under 15 minuter. Vid den högsta testade dosen på 32 mg var den största genomsnittliga (övre gräns på 90 % CI) skillnaden i QTcF jämfört med placebo efter korrigering av baseline 19,6 (21,5) millisekunder. Vid den lägre testade dosen på 8 mg var den största genomsnittliga (övre gräns på 90 % CI) skillnaden i QTcF jämfört med placebo efter korrigering av baseline 5,8 (7,8) millisekunder. I studien registrerades inga QTcF-mätningar större än 480 millisekunder och ingen QTcF-förslängning var större än 60 millisekunder. Inga signifikanta förändringar sågs i uppmätt EKG-PR- eller QRS-intervall.

Kliniska studier på pediatrik population

CINV

Effekten av ondansetron för att kontrollera kräkningar och illamående inducerat av kemoterapi mot cancer utvärderades i en dubbelblind randomiserad studie på 415 patienter i åldern 1–18 år (S3AB3006). Under behandlingsdagarna med kemoterapi fick patienterna antingen ondansetron 5 mg/m² i.v. och ondansetron 4 mg oralt efter 8–12 timmar eller ondansetron 0,45 mg/kg i.v. och placebo oralt efter 8–12 timmar. Fullständig kontroll av kräkningar under den värsta dagen av kemoterapin uppnåddes hos 49 % (med 5 mg/m² i.v. och ondansetron 4 mg oralt) och 41 % (med 0,45 mg/kg i.v. och placebo oralt). Efter avslutad kemoterapi fick båda grupperna 4 mg ondansetron som oral vätska 2 gånger dagligen i 3 dagar. Det var ingen skillnad i den totala incidensen eller hur biverkningarna yttrade sig mellan de två behandlingsgrupperna.

I en dubbelblind randomiserad placebokontrollerad studie (S3AB4003) på 438 patienter i åldern 1–17 år visades fullständig behandlingskontroll över kräkningar under den värsta dagen av kemoterapin hos:

- 73 % av patienterna som fick ondansetron intravenöst med en dos på 5 mg/m² i.v. samtidigt med 2–4 mg dexametason oralt
- 71 % av patienterna som fick ondansetron som oral vätska i en dos på 8 mg samt 2–4 mg dexametason oralt under dagarna med kemoterapi.

Efter kemoterapin fick båda grupperna 4 mg ondansetron som oral vätska 2 gånger dagligen i 2 dagar. Det var ingen skillnad i den totala incidensen eller hur biverkningarna yttrade sig mellan de två behandlingsgrupperna.

Effekten av ondansetron undersöktes hos 75 barn i åldrarna 6 till 48 månader i en öppen, icke-jämförande singelarmstudie (S3A40320). Alla barn fick tre doser ondansetron på 0,15 mg/kg intravenöst som gavs 30 minuter före kemoterapin påbörjades och därefter fyra respektive åtta timmar efter den första dosen. Fullständig kontroll av kräkningar uppnåddes hos 56 % av patienterna.

En annan öppen, icke-jämförande singelarmstudie (S3A239) undersökte effekten av en intravenös dos

ondansetron på 0,15 mg/kg följt av två perorala doser ondansetron på 4 mg hos barn < 12 år och 8 mg hos barn ≥ 12 år (totalt antal barn, n=28). Fullständig kontroll av kräkningar uppnåddes hos 42 % av patienterna.

PONV

Effekten av en engångsdos ondansetron för förebyggande av postoperativt illamående och kräkningar undersöktes i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med 670 barn i åldern 1–24 månader (postkonceptionell ålder ≥ 44 veckor, vikt ≥ 3 kg). Inkluderade patienter var planerade att genomgå elektiv kirurgi i allmän anestesi och hade en ASA-status ≤ III. En engångsdos ondansetron 0,1 mg/kg administrerades inom fem minuter efter induktion av anestesin. Andelen deltagare som upplevde åtminstone en period med kräkningar under den 24 timmar långa utvärderingsperioden (ITT) var större för patienter som fick placebo än för dem som fick ondansetron (28 % vs. 11 %, p < 0,0001).

Fyra dubbelblinda, placebokontrollerade studier har utförts med 1469 manliga och kvinnliga patienter (2–12 års ålder) som genomgick allmän anestesi. Patienterna utvaldes slumpmässigt till antingen intravenösa engångsdoser ondansetron (0,1 mg/kg för barnpatienter med kroppsvekt på 40 kg eller mindre, 4 mg för barnpatienter med kroppsvekt över 40 kg; patientantal = 735) eller placebo (patientantal = 734). Studieläkemedlet administrerades under minst 30 sekunder, omedelbart före eller efter induktion av anestesi. Ondansetron var signifikant effektivare än placebo vid förebyggande av illamående och kräkningar. Resultaten av dessa studier finns sammanfattade i tabell 3.

Tabell 3: Förebyggande och behandling av PONV hos barn – behandlingssvar under en 24-timmarsperiod

Studie	Ändpunkt	Ondansetron %	Placebo %	p-värde
S3A380	CR	68	39	≤ 0,001
S3GT09	CR	61	35	≤ 0,001
S3A381	CR	53	17	≤ 0,001
S3GT11	inget illamående	64	51	0,004
S3GT11	inga kräkningar	60	47	0,004

CR= inga episoder av kräkningar, ingen akut insatt medicinering och försökspersonen lämnade inte studien

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

De farmakokinetiska egenskaperna hos ondansetron förblir oförändrade i samband med upprepad dosering. En direkt korrelation mellan plasmakoncentration och antiemetisk effekt har inte fastställts.

Absorption

Efter peroral administrering absorberas ondansetron passivt och fullständigt från magtarmkanalen och genomgår förstapassagemetabolism (biotillgänglighet ca 60 %). Maximal plasmakoncentration på ca 30 ng/ml uppnås ca 1,5 timmar efter administrering av en dos på 8 mg. Vid doser över 8 mg ökar den systemiska exponeringen mer än proportionellt mot doseen. Detta kan återspeglar en reduktion av förstapassagemetabolism vid högre perorala doser. Biotillgängligheten efter peroral administrering ökar något vid samtidigt intag av föda, men den påverkas inte av antacida.

En intravenös infusion av 4 mg ondansetron given över 5 minuter resulterar i en maximal plasmakoncentration på ca 65 ng/ml. Efter intramuskulär administrering av ondansetron uppnås en maximal plasmakoncentration på ca 25 ng/ml inom 10 minuter efter injektionen.

Distribution

Dispositionen av ondansetronet efter såväl en peroral, intramuskulär som intravenös administrering är likartad, med en distributionsvolym vid steady-state på ca 140 liter. Ekvivalent systemisk exponering uppnås efter intramuskulär och intravenös administrering av ondansetron.

Proteinbindningen är måttlig (70–76 %).

Metabolism

Ondansetron elimineras från den systemiska cirkulationen främst genom hepatsk metabolism via ett flertal enzymssystem. Avsaknad av enzymet CYP2D6 (debrisokin-polymorfism) påverkar inte farmakokinetiken för ondansetron.

Eliminering

Mindre än 5 % av absorberad dos utsöndras i oförändrad form i urinen.

Den terminala halveringstiden är ca 3 timmar.

Farmakokinetik hos speciella patientgrupper

Barn och ungdomar (från 1 månad till 17 år)

Hos barnpatienter i åldern 1–4 månader (n=19) som skulle genomgå kirurgiskt ingrepp var viktnormaliserat clearance ca 30 % längsammare än hos patienter i åldern 5–24 månader (n=22) men jämförbart med patienter i åldern 3–12 år. Halveringstiden hos patienterna i åldersgruppen 1–4 månader var enligt rapporterna i genomsnitt 6,7 timmar jämfört med 2,9 timmar för patienterna i åldersgrupperna 5–24 månader och 3–12 år. Skillnaderna i de farmakokinetiska parametrarna hos åldersgruppen 1–4 månader kan delvis förklaras av den högre procentandelen vatten i kroppen hos nyfödda och spädbarn och en högre distributionsvolym för vattenlösliga läkemedel så som ondansetron.

Hos barn i åldern 3–12 år som genomgick elektiv kirurgi i allmän anestesi minskade de absoluta värdena för både clearance och distributionsvolym för ondansetron i jämförelse med de värden som vuxna patienter uppvisade. Båda parametrarna växte linärt med vikten och vid 12 års ålder närmade sig värdena de värden som unga vuxna uppvisade. När värdena för clearance och distributionsvolym normalisrades med avseende på kroppsvekt, var värdena för dessa parametrar lika mellan de olika åldersgrupperna. Användningen av viktbaserad dosering kompenseras för åldersrelaterade förändringar och är effektivt för att normalisera systemisk exponering hos barn.

Farmakokinetiska populationsanalyser utfördes på 428 personer (pediatriska cancerpatienter, kirurgiska patienter och friska frivilliga) i åldern 1 månad till 44 år efter intravenös administrering av ondansetron. Baserat på denna analys var den systemiska exponeringen (AUC) för ondansetron efter oral eller intravenös dosering på barn och ungdomar jämförbar med vuxnas med undantag av spädbarn i åldern 1–4 månader. Volymen var relaterad till åldern och den var lägre hos vuxna än hos spädbarn och barn. Clearance var relaterad till vikt men inte till ålder med undantag av spädbarn i åldern 1–4 månader. Det är svårt att avgöra om det fanns en ytterligare minskning av clearance relaterad till åldern hos spädbarn 1–4 månader eller endast en naturlig variation till följd av det låga antalet deltagare i denna åldersgrupp. Eftersom patienter under 6 månaders ålder endast får en engångsdos vid PONV är minskat clearance sannolikt inte kliniskt relevant.

Äldre personer

Tidiga fas I-studier på friska, frivilliga äldre visade en smärre åldersrelaterad minskning av clearance och en ökning av halveringstiden för ondansetron. Emellertid resulterade stor interindividuell variabilitet i betydande överlappning i farmakokinetiska parametrar mellan yngre (< 65 år) och äldre

(≥ 65 år) och inga generella skillnader i säkerhet och effekt observerades mellan yngre och äldre cancerpatienter som deltog i kliniska prövningar för CINV som skulle stödja en annan doseringsrekommendation för äldre patienter.

Baserat på nyare data gällande ondansetronkoncentrationer i plasma och exponerings-responsmodellering förväntas en större effekt på QTcF hos patienter ≥ 75 år jämfört med yngre vuxna. Specifik doseringsinformation tillhandahålls för patienter över 65 år och över 75 år (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15–60 ml/min) minskar både systemisk clearance och distributionsvolym efter intravenös administrering av ondansetron, vilket resulterar i en liten men kliniskt insignifikant ökning av eliminationshalveringstiden (5,4 timmar). En studie på patienter med svårt nedsatt njurfunktion vilka behövde regelbunden hemodialys (studerade mellan dialystillfällena) visade att farmakokinetiken av ondansetron i stort sett var oförändrad efter intravenös administrering.

Nedsatt leverfunktion

Peroral, intravenös eller intramuskulär administrering till patienter med gravt nedsatt leverfunktion ger markant reducerad systemisk clearance av ondansetron. Eliminationshalveringstiden förlängs (15–32 h) och den perorala biotillgängligheten närmar sig 100 % p.g.a. nedsatt presystemisk metabolism.

Könsspecifika skillnader

Könsspecifika skillnader i dispositionen av ondansetron har observerats. Kvinnor har en högre absorptionshastighet och -grad efter en peroral dos och reducerat systemiskt clearance och distributionsvolym (viktjusterad).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäントoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionstoxicitet visade inte några särskilda risker för männska.

Ondansetron och dess metaboliter ackumuleras i mjölken hos rätta, med en mjölk/plasmakvot på 5,2/1.

En studie på klonade jonkanaler från humanhjärta visade att ondansetron har förmåga att påverka hjärtats repolarisering genom blockad av HERG-kaliumkanaler. Den kliniska betydelsen av detta fynd är oklar.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpmänne n

Natriumklorid
Natriumcitratdihydrat
Citronsyramonohydrat
Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

6.3 Hållbarhet

Oöppnade flaskor:

24 månader

Efter första öppnandet:

Detta läkemedel ska användas omedelbart efter första öppnandet.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara behållaren i ytterkartongen. Ljuskäntligt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Flaskor av LDPE:

En flaska innehåller:

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml: 100 ml

Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml: 50 ml

Förpackningsstorlekar:

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml: 10 x 100 ml

Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml: 10 x 50 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Lösningen ska inspekteras visuellt före användning (även efter utspädning). Endast klara och färglösa lösningar som är fria från synliga partiklar ska användas.

Kompatibilitet med andra läkemedel

Följande läkemedel kan administreras samtidigt med Ondansetron B. Braun via Y-förgreningen på infusionssetet till ondansetron.

I allmänhet har kompatibiliteten påvisats i upp till 1 timme, men de rekommendationer som anges av tillverkaren för läkemedlet som administreras samtidigt ska beaktas.

Cisplatin: Koncentrationer på upp till 0,48 mg/ml (t.ex. 240 mg i 500 ml).

Karboplatin: Koncentrationer i intervallet 0,18 mg/ml till 9,9 mg/ml (t.ex. 90 mg i 500 ml till 990 mg i 100 ml)

Etoposid: Koncentrationer i intervallet 0,14 mg/ml till 0,25 mg/ml (t.ex. 72 mg i 500 ml till 250 mg i 1 liter)

Ceftazidim: Kompatibilitet har påvisats för 2 000 mg berett med 20 ml NaCl 0,9 % och 2 000 mg berett med 10 ml vatten för injektionsvätskor.

Cyklofosfamid: Kompatibilitet har påvisats för 1 000 mg berett med 50 ml NaCl 0,9 %.

Doxorubicin: Koncentrationer upp till 2 mg/ml (t.ex. 10 mg i 5 ml eller 100 mg i 200 ml).

Dexametason: Kompatibilitet mellan dexametasonnatriumfosfat och ondansetron har påvisats genom samma infusionsset med koncentrationer på 32 mikrogram – 2,5 mg/ml för dexametasonnatriumfosfat och 8 mikrogram – 0,75 mg/ml för ondansetron.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland

Postadress:
34209 Melsungen
Tyskland

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Ondansetron B. Braun 0,08 mg/ml: 33147
Ondansetron B. Braun 0,16 mg/ml: 33148

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 20.10.2016
Datum för den senaste förnyelsen: 17.8.2021

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

4.2.2022