

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Diclofenac ratiopharm 11,6 mg/g geeli

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1 g geeliä sisältää diklofenaakkia 11,6 mg:n diklofenaakkidietyliamiiniin muodossa, mikä vastaa 10 mg diklofenaakkinatriumia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

1 g geeliä sisältää 50 mg propyleeniglykolia (E 1520), ja 1 mg hajustetta sisältää 0,15 mg bentsyylalkoholia, sitraalia, sitronellolia, kumariinia, eugenolia, farnesolia, geraniolia, d-limoneenia ja linalolia.

Täydellinen apuaineluetelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Geeli.

Valkoinen tai lähes valkoinen, homogeeninen geeli.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Aikuiset

Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen hoitoon:

- akuuteissa nyrjähdyksissä, venähdyksissä tai tylpissä ruhjevarmoissa
- polvi- tai sorminivelten nivelrikon yhteydessä niveliä ympäröivien pehmytkudosten kivussa (esim. limapussit, jänteet, jännetupet, nivelsiteet, lihasten kiinnityskohdat ja nivelkapselit)
- tenniskynärpään yhteydessä
- akuuteissa lihaskivuissa esim. selän alueella.

Vähintään 14 vuotta täyttäneet nuoret

Lyhytaikaiseen käyttöön.

Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, venähdyksissä tai tylpissä ruhjevarmoissa.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja vähintään 14 vuotta täyttäneet nuoret:

Hoidettavan alueen koosta riippuen, iholle annostellaan noin kirsikan tai saksanpähkinän kokoinen nokare (vastaan 1–4 g) geeliä (11,6–46,4 mg diklofenaakkidietyliamiinia, vastaten 10–40 mg diklofenaakkinatriumia) 3–4 kertaa päivässä. Edellä mainitut määrät riittävät 400–800 cm² kokoinen alueen hoitoon.

Enimmäismäärä geeliä vuorokaudessa on 16 g, mikä vastaa 185,6 mg diklofenaakin dietyliamiinisuoala (vastaan 160 mg diklofenaakkinatriumia).

Hoidon kesto riippuu oireista ja taustalla olevasta vaivasta. Diclofenac ratiopharm -geeliä ei saa käyttää yli 1 viikon ajan ilman lääkärin ohjeistusta.

Jos oireet pahenevat tai ne eivät lievity 3–5 päivässä, on potilaan otettava yhteys lääkäriin.

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät potilaat:

Annostusta ei tarvitse muuttaa. Haittavaikutusprofiiliin vuoksi iäkkäiden potilaiden tilaa on seurattava huolellisesti.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta:

Annosta ei tarvitse pienentää munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden hoitoa varten.

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta:

Annosta ei tarvitse pienentää maksan vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden hoitoa varten.

Lapset ja nuoret (alle 14-vuotiaat):

Tiedot käytön turvallisuudesta ja tehosta lapsilla ja alle 14-vuotiailla nuorilla ovat puutteelliset (ks. kohta 4.3).

Antotapa

Iholle.

Ohut kerros geeliä annostellaan hoidettavalle alueelle ja hierotaan kevyesti ihoon. Kädet on pestävä levyksen jälkeen, elleivät kädet ole hoidettavaa aluetta.

Jos alue on tarkoitus peittää siteellä/tukisiteellä (ks. kohta 4.4), geelin on annettava kuivua muutaman minuutin ajan ennen siteen asettamista paikoilleen.

4.3 Vasta-aiheet

- Yliherkkyyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.
- Potilaat, joille asetyylisalisyylihappo tai jokin muu tulehduskipulääke on joskus aiheuttanut yliherkkysreaktion, kuten astmaa, bronkospasmeja, urtikariaa, angioedeeman tai akuutin riniittikohtauksen.
- Avohaaavat, tulehtuneet tai infektoituneet ihoalueet sekä ihottumat ja limakalvot.
- Raskauden viimeinen kolmannes (ks. kohta 4.6).
- Alle 14-vuotiaat lapset ja nuoret.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Systeemisten haittavaikutusten mahdollisuutta ei voida sulkea pois, jos iholle annosteltavaa diklofenaakkia käytetään laajoille ihoalueille ja pidemmän aikaa (ks. systeemisesti käytettävien diklofenaakin lääkemuotojen valmisteyteenvedot).

Diclofenac ratiopharm -geeliä saa levittää ainoastaan ehjälle, terveelle ja vahingoittumattomalle iholle. Geelin joutumista silmiin tai suun limakalvoille on vältettävä, eikä sitä saa ottaa suun kautta.

Iholle annosteltavaa diklofenaakkia voi käyttää hengittävien siteiden kanssa, mutta sitä ei saa annostella okkluusiosidosten (hengittämättömät sidokset) alle (ks. kohta 5.2).

Akuuttiloissa, joihin liittyy vaikea-asteista punoitusta, turvotusta tai nivelten kuumotusta; pitkittyneissä nivelpikuissa; sekä vaikeassa, jalkoihin sätilevässä ja/tai neurologisin oirein (esim. puutumiset, pistelyt) ilmenevässä selkäkivussa potilaan on otettava yhteys lääkäriin.

Jos oireet pahenevat tai ne eivät lievity 3–5 päivän kuluessa, potilaan on otettava yhteys lääkäriin.

Potilailla, joilla on astma, heinänuha, turvonneet nenän limakalvot (ns. nenän polyyppeja), krooninen keuhkohtauamatauti tai jokin krooninen hengitystieinfekti (erityisesti heinänuhan kaltaisiin oireisiin yhdistyneinä) sekä potilaat, jotka ovat yliherkkiä mille tahansa kipu- tai reumalääkkeelle, on muita potilaita suurempi riski astmakohtauksille (ns. intoleranssi kipulääkkeille tai kipulääkeastma), paikallisille iho- ja limakalvoturvotuksille (ns. Quincken edeema) tai urtikarille, kun heitä hoidetaan Diclofenac ratiopharm -geelillä.

Näiden potilaiden hoidossa Diclofenac ratiopharm -geeliä saa käyttää vain tietyin varotoimenpitein (varautuminen hätätilanteisiin) ja suorassa lääkärin valvonnassa. Sama koskee potilaita, jotka ovat allergisia myös muille aineille ja esim. saavat niistä ihoreaktioita, kutinaa tai urtikariaa.

Jos ihottumaa ilmenee Diclofenac ratiopharm -hoidon aikana, on hoito keskeytettävä.

Hoidon aikana voi kehittyä valoherkkyyttä, joka ilmenee ihoreaktioina auringonvalolle altistumisen jälkeen.

Lapsia on estettävä koskettamasta geelillä hoidettuja ihoalueita.

Tämä lääkevalmiste sisältää hajustetta, jossa on bentsyylialkoholia (0,15 mg/g), sitraalia, sitronellolia, kumariinia, eugenolia, farnesolia, geraniolia, d-limoneenia ja linalolia, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita. Bentsyylialkoholi voi lisäksi aiheuttaa lievää paikallisärsytystä.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Suositusten mukaisessa käytössä yhteisvaikutukset ovat hyvin epätodennäköisiä, sillä diklofenaakin systeeminen imeytyminen iholle annosteltavista valmisteista on hyvin vähäistä.

4.6 He delmallisyys, raskaus ja imetyys

Diklofenaakin paikallisen annostelun jälkeen saavutetaan pienemmät systeemiset lääkepitoisuudet kuin peroraalisia valmisteita käytettäessä. Systeemisesti imeytyvien tulehduskipulääkkeiden käytöstä saatujen kokemusten perusteella suositellaan seuraavaa:

Raskaus

Prostaglandiinisynteesin esto voi vaikuttaa haitallisesti raskauteen ja alkion/sikiön kehitykseen. Epidemiologista tutkimuksista saadut tiedot viittaavat siihen, että prostaglandiinisynteesin estäjän käyttö alkuraskauden aikana suurentaa keskenmenoriskiä sekä sydämen epämuodostumien ja gastroskiisin riskiä. Sydän- ja verisuoniepämuodostumien absoluuttinen riski suurenne alle 1 prosentista noin 1,5 prosenttiin. Riskin uskotaan suurennevan annoksen ja hoidon keston myötä. Prostaglandiinisynteesin estäjän käytön on osoitettu lisäävän eläinkioiden kuolemia sekä ennen kohdun limakalvoon kiinnitymistä että sen jälkeen sekä lisäävän eläinten alku- ja sikiokuolemia. Lisäksi useiden eri epämuodostumien (myös sydän- ja verisuoniepämuodostumien) ilmaantuvuuden on ilmoittettu suurentuneen eläimillä, jotka saivat prostaglandiinisynteesin estääjää organogeneesin aikana.

Diklofenaakkia ei pidä käyttää ensimmäisen ja toisen raskauskolmanneksen aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä. Jos nainen käyttää diklofenaakkia yrityessään tulla raskaaksi tai ensimmäisen ja toisen raskauskolmanneksen aikana, annoksen tulee olla mahdollisimman pieni ja hoidon keston mahdollisimman lyhyt.

Kolmannen raskauskolmanneksen aikana kaikki prostaglandiinisynteesin estäjät voivat aiheuttaa

- sikiölle
 - kardiopulmonaarista toksisuutta (valtimotiehyen ennenaikaista sulkeutumista ja pulmonaarista hypertensiota)

- munuaistoiminnan häiriötä, jotka voivat edetä munuaisten vajaatoiminnaksi, jonka yhteydessä esiintyy lapsiveden niukkuutta (oligohydramnion).
- äidille ja sikiölle raskauden lopussa
 - mahdollista verenvuotojan pitenemistä (verihautaleiden aggregaation heikentyminen, jota voi esiintyä jo hyvin pieniä annoksia käytettäessä)
 - kohdun supistuksien estymistä, mikä voi viivytä tai pidentää synnytystä.

Näin ollen diklofenaakki on vasta-aiheinen kolmannen raskauskolmanneksen aikana

Imetyks

Diklofenaakki kulkeutuu äidinmaitoon pieninä määrinä. Kun Diclofenac ratiopharm -geeliä käytetään hoitoannoksina, valmiste ei todennäköisesti kuitenkaan vaikuta imetettävään lapseen. Imettävillä naisilla ei ole tehty kontrolloituja tutkimuksia, joen siksi valmistetta saa käyttää imetyksen aikana vain terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistuksen mukaisesti. Tällöin Diclofenac ratiopharm -geeliä ei saa levittää rinnoille eikä muille laajoille ihoalueille, eikä sitä saa käyttää pitkiä aikoja (ks. kohta 4.4).

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Iholle annostellulla diklofenaakilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on lueteltu alla elinjärjestelmittäin ja yleisyysluokittain seuraavia määritelmiä käytäen: *hyvin yleinen* ($\geq 1/10$); *yleinen* ($\geq 1/100, < 1/10$); *melko harvinainen* ($\geq 1/1\,000, < 1/100$); *harvinainen* ($\geq 1/10\,000, < 1/1000$); *hyvin harvinainen* ($< 1/10\,000$); *tuntematon* (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinjärjestelmä	Haittavaikutukset ja niiden yleisyysluokat
Infektiot	<i>Hyvin harvinaiset:</i> Pustuloosi ihottuma
Immuniijärjestelmä	<i>Hyvin harvinaiset:</i> Yliherkkyys (urtikaria mukaan lukien), angioedeema
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina	<i>Hyvin harvinaiset:</i> Astma
Ruoansulatuselimistö	<i>Hyvin harvinaiset:</i> Ruoansulatuskanavaan liittyvät vaivat
Iho ja ihonalaineen kudos	<i>Yleiset:</i> Dermatiitti (kosketusdermatiitti mukaan lukien), ihottuma, eryteema, ekseema, kutina <i>Melko harvinaiset:</i> Ihon hilseily, ihan kuivuminen, edeema <i>Harvinaiset:</i> Rakkulaihottuma <i>Hyvin harvinaiset:</i> Valoherkkyysreaktiot <i>Yleisyys tuntematon:</i> Polttava tunne annostelukohdassa, kuiva iho

Jos geeliä annostellaan laajoille ihoalueille pidemmän aikaa, riskiä systeemisen diklofenaakkiannostelun yhteydessä ilmeneville systeemille haittavaikutuksille (esim. munuaisiin, maksaan tai ruoansulatuselimistöön liittyvät reaktiot, systeemiset yliherkkyysreaktiot) ei voida pois sulkea.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

4.9 Yliannostus

Iholle käytetyn diklofenaakin vähäisestä systeemisestä imeytymisestä johtuen yliannostus on epätodennäköinen.

Jos suositusannosta on huomattavasti ylitetty, tulee geeli poistaa iholta ja alue pestä vedellä.

Kuitenkin, jos iholle annosteltavaksi tarkoitettua diklofenaakkivalmista on vahingossa nielty (100 g:n putki sisältää 1 160 mg diklofenaakkidietyliamiinia, vastaten 1 000 mg diklofenaakkinatriumia), voidaan odottaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin on todettu systeemisen diklofenaakkiyliannostuksen jälkeen.

Jos vahingossa suun kautta otettu geeli aiheuttaa merkittäviä systeemisiä haittavaikutuksia, ne on hoidettava samalla tavalla kuin yleensä tulehduskipulääkkeiden aiheuttamien myrkysten oireita. VatsahuuhTELUA ja lääkehiihen antoja on harkittava etenkin, jos lääkkeen otosta on kulunut vain lyhyt aika.

Spesifistä antidoottia ei ole olemassa.

5. FARMAKOLOGISET OMNAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeutinen ryhmä: Lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitoon tarkoitettut valmisteet; paikallisesti käytettävä tulehduskipulääkkeet

ATC-koodi: M02AA15

Vaikutusmekanismi

Diklofenaakki on tehokas ei-steroidirakenteinen tulehduskipulääke. Sen terapeutinen vaikutus perustuu pääosin syklo-oksigenaasi-2:n (COX-2) välityksellä tapahtuvaan prostaglandiinisynteesin estoon.

Diklofenaakki on osoittanut prostaglandiinisynteesin eston kautta välittyvän tehonsa tavanomaisissa eläinkokeiden tulehdusmalleissa. Ihmisillä diklofenaakki lievittää tulehdustilaan liittyvää kipua, turvotusta ja kuumetta. Lisäksi diklofenaakki aikaansaata palautuvan, ADP:n ja kollageenin aikaansaaman trombosyyttiaggregaation eston.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Ihon kautta elimistöön imeyttyvän diklofenaakin määrä on suhteessa iholosketuksen kestoon ja hoidettavan ihoalueen kokoon, ja se riippuu sekä kokonaisanoksesta että ihan kosteusasteesta. Kun Diclofenac ratiopharm -geeliä levitetään paikallisesti polviin tai käsien niveliin, vaikuttava aine imeytyy vaihtelevassa määrin (diffusioasteesta riippuen) iholta, ja havaittavissa olevat pitoisuudet on todettavissa sekä plasmasta että annostelupaikan alaisesta kudoksesta. Nämä pitoisuudet vaihtelevat diffundoitumisen asteen mukaan.

Noin 6 % 500 cm²:n kokoiselle ihoalueelle annostelusta 2,5 gramman diklofenaakkigeelin sisältämästä diklofenaakista imeytyy. Tämä on määritetty vertaamalla munuaisten kautta erityyneen diklofenaakin ja sen hydroksyloituneiden metaboliittien määräät geelin ja suun kautta tapahtuvan diklofenaakkinatriumin annostelun yhteydessä. Ihossa tapahtuvan akkumuloitumisen (varastoitumisen) vuoksi diklofenaakkia vapautuu pidemmän aikaa iholaisiin kudoksiin ja plasmaan. Okkluusio (10 tuntia) voi kolminkertaistaa diklofenaakin perkutaanisen imeytymisen (pitoisuus seerumissa) aikuisilla.

Jakautuminen

Imetyneestä diklofenaakista 99,7 % sitoutuu plasman proteiineihin, pääasiassa albumiiniin (99,4 %). Diklofenaakkigeelin aikaansaamat pitoisuudet plasmassa eivät ole riittävät selittämään havaitun terapeutisen tehon. Teho sen sijaan todennäköisemmin johtuu merkittävästi suuremmista lääkepitoisuksista annostelualueen alaisissa kudoksissa. Ominaisuuksensa vuoksi (kuten lyhyt puoliintumisaika plasmassa, alhainen pKa-arvo, pieni jakautumistilavuus ja korkea proteiineihin sitoutumisen aste) diklofenaakki hakeutuu tulehtuneeseen kudokseen.

Diklofenaakki jakautuu ja säilyy mieluiten tulehtuneessa kudoksessa, jossa sen pitoisuus voi olla jopa 20 kertaa suurempi kuin plasmassa.

Biotransformaatio

Diklofenaakki muuttuu osittain glukuronisoitumalla suoraan, mutta pääasiassa ensin hydroksyloitumalla joko kerran tai useita kertoja erilaisiksi fenolijohdoksiiksi, joista useimmat edelleen glukuronisoituvat. Fenolijohdoksiista kaksi on biologisesti aktiivisia, kuitenkin paljon vähäisemmässä määrin kuin diklofenaakki.

Eliminaatio

Diklofenaakin kokonaispuhdistuma plasmassa on 263 ± 56 ml/min. Terminaalivila iheen puoliintumisaika plasmassa on 1–2 tuntia. Myös neljän metaboliitin, mukaan lukien kaksi aktiivista metaboliittia, puoliintumisaika on lyhyt (1–3 tuntia). Yhdellä metaboliitilla (3-hydroksi-4-metoksidiklofenaakki) on pitempää puoliintumisaika. Tämä metaboliitti on kuitenkin käytännöllisesti katsoen inaktiivinen. Diklofenaakki ja sen metaboliitit erityyvätkin pääasiassa virtsaan.

Ominaisuudet potilaissa:

Diklofenaakin tai sen metaboliittien kerääntymistä ei ole odotettavissa munuaisten vajaatoimintapotilailla. Potilailla, joilla on krooninen hepatiitti tai kompensoitumaton kirroosi, diklofenaakin kinetiikka ja metabolismi ovat samanlaisia kuin potilailla, joilla ei ole maksasairautta.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisiille lukuun ottamatta niitä riskejä, joita on kuvattu valmisteylehteenvedon muissa osissa. Eläinkokeissa diklofenaakin systeemisen pitkääikäiskäytön toksisuus on pääosin ilmennyt ruoansulatuskanavan vaurioina ja haavaumina. Kaksi vuotta kestääneessä toksisuuskokeessa diklofenaakkihoitoa saaneilla rotilla todettiin annoksesta riippuva sydänveritulppien esiintyvyyden lisääntyminen.

Lisääntymistoksisuutta koskevissa eläinkokeissa systeemisesti annosteltu diklofenaakki aiheutti ovulaation eston kaneilla sekä implantaation häiriötä ja häiriötä varhaisessa alkionkehityksessä rotilla. Diklofenaakki myös pidensi tüneysaikaa ja synnytyksen kestoaa. Diklofenaakin sikiötoksista potentiaalia selvitettiin kolmessa eri eläinlajissa (rotta, hiiri, kani). Sikiökuolema ja sikiöiden kasvun hidastumista ilmeni emolle toksisilla annostasoilla. Saatavalla olevien prekliinisten tietojen perusteella diklofenaakkia ei pidetä teratogeenisena aineena. Annokset, jotka jäivät alle emolle toksisen tason, eivät vaikuttaneet mitenkään jälkeläisten syntymänjälkeiseen kehitykseen.

Diklofenaakki muodostaa ympäristöriskin vesistölle (ks. kohta 6.6).

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Karbomeeri

Kokoyyliprylokapraatti

Makrogolisetostearyylieetteri
Nestemäinen parafüumi
Dietyliamiini
Isopropyylalkoholi
Propyleeniglykoli (E 1520)
Hajuste (sisältää sitronellolia, geraniolia, bentsyylialkoholia, linalolia, limoneenia, sitraalia, farnesolia, kumariinia, eugenolia)
Puhdistettu vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei olellinen.

6.3 Kestoaika

2 vuotta.

6.4 Säilytys

Säilytä alkuperäisputkessa. Herkkä valolle.
Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakauskoko (pakkauskoot)

Geeli toimitetaan laminoidussa alumiiniputkessa, jossa on PE-sinettirengas ja PP:stä valmistettu kierrekorkki. Pakauskoot: 30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 120 g ja 150 g/putki.

Kaikkia pakauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Tämä valmiste muodostaa ympäristöriskin (ks. kohta 5.3).

Käytämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 5
2031 GA Haarlem
Alankomaat

8. MYYNTILUVAN NUMERO

36997

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10.6.2020

PRODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Diclofenac ratiopharm 11,6 mg/g gel

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 g gel innehåller diklofenak i form av 11,6 mg diklofenakdietylamin, vilket motsvarar 10 mg diklofenaknatrium.

Hjälpmitten med känd effekt

1 g gel innehåller 50 mg propylenglykol (E 1520), och 1 mg av preparatets parfym innehåller 0,15 mg bensylalkohol, citral, citronellol, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, d-limonen och linalol.

För fullständig förteckning över hjälpmitten, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Gel.

Vit eller nästan vit, homogen gel.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Vuxna

För lokal, symptomatisk behandling av smärta:

- vid akuta sträckningar, vrickningar och kontusioner orsakade av trubbiga skador
- i mjukvävnaden kring lederna (t.ex. slemsäckar, senor, senskidor, ledband, muskelfästen och ledkapslar) i samband med artros i knän eller fingerleder
- vid epikondylit
- vid akut muskelsmärta exempelvis i ryggen.

Ungdomar som fyllt minst 14 år

För korttidsbehandling.

För lokal, symptomatisk behandling av smärta vid akuta sträckningar, vrickningar eller kontusioner orsakade av trubbiga skador.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna och ungdomar som fyllt minst 14 år:

Beroende på storleken av det område som ska behandlas, appliceras en mängd gel som motsvarar storleken av ett körsbär eller en valnöt, d.v.s. 1–4 g gel (11,6–46,4 mg diklofenakdietylamin, motsvarande 10–40 mg diklofenaknatrium), 3–4 gånger dagligen. Denna mängd räcker till för att behandla ett område på 400–800 cm².

Maximal dygnsdos är 16 g gel, vilket motsvarar 185,6 mg dietylaminsalt av diklofenak (motsvarar 160 mg diklofenaknatrium).

Behandlingens längd beror på symptom och bakomliggande orsak. Diclofenac ratiopharm ska inte användas i mer än 1 vecka i sträck utan instruktioner av läkare.

Om symptomet blir värre, eller om de inte lindras med en behandling på 3–5 dagar, ska patienten kontakta läkare.

Särskilda patientgrupper

Äldre patienter:

Inga särskilda dosjusteringar krävs. På grund av den potentiella biverkningsprofilen ska äldre patienter följas upp noggrant.

Patienter med nedsatt njurfunktion:

Inga dosjusteringar krävs hos patienter vars njurfunktion är nedsatt.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Inga dosjusteringar krävs hos patienter vars leverfunktion är nedsatt.

Barn och ungdomar (under 14 år):

Data gällande säkerhet och effekt hos barn och ungdomar under 14 år är bristfälliga (se avsnitt 4.3).

Administreringssätt

Kutan användning.

Ett tunt lager gel appliceras på det område som ska behandlas och masseras lätt in i huden. Efter appliceringen ska händerna tvättas, om de inte utgör en del av det område som ska behandlas.

Om området ska täckas in med något bandage (se avsnitt 4.4), ska gelen få torka på huden i några minuter innan bandaget läggs på.

4.3 Kontraindikationer

- Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälppämne som anges i avsnitt 6.1.
- Patienter som tidigare upplevt överkänslighetsreaktioner, såsom astma, bronkospasmer, urtikaria, akut rinit eller angioödem, i samband med acetylksalicylsyra eller NSAID-läkemedel.
- Öppna sår, hudinflammationer eller -infektioner, eksem och slemhinnor.
- Sista trimestern av en graviditet (se avsnitt 4.6).
- Barn och ungdomar under 14 år.

4.4 Varningar och försiktighet

En möjlig risk för systemiska biverkningar kan inte uteslutas om lokalt applicerat diklofenak används över stora hudområden och under en längre tid (se produktresuméerna för systemiskt administrerat diklofenak).

Diclofenac ratiopharm gel får endast appliceras på hel, frisk hud fri från skador. Läkemedlet får inte komma i kontakt med ögon eller munslekminnor, och gelen får inte tas via munnen.

Lokalt administrerat diklofenak kan användas i kombination med ett icke-ocklusivt förband, men inte med lufttäta ocklusiva förband (se avsnitt 5.2).

Vid fall av akuta situationer med svår hudrodnad, svullnad eller överhettade leder, vid långvariga ledsmärter eller svåra ryggsmärter som strålar ned mot benen och/eller är förknippade med neurologiska besvär (såsom domningar, stickningar), ska läkare kontaktas.

Om symptomet blir värre eller inte lindras inom 3–5 dagar, ska patienten kontakta läkare.

Patienter med astma, hösnuva, svullna nässlemhinnor (så kallade näspolyper), någon kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller kroniska luftvägsinfektioner (särskilt om dessa är förknippade med symtom som påminner om hösnuva), samt patienter som är överkänsliga för något smärtstillande eller antireumatiskt medel, löper ökad risk för astmaanfall (så kallad analgetikaintolerans/analgetisk astma), lokala hud- eller slemhinnesvullnader (så kallat Quinckes ödem) eller urticaria då de behandlas med Diclofenac ratiopharm.

Hos dessa patienter får Diclofenac ratiopharm endast användas med iakttagande av särskilda försiktighetsåtgärder (med beredskap för nödsituationer) och under direkt övervakning av läkare. Samma gäller för patienter som också är allergiska mot andra ämnen och reagerar på dem med t.ex. hudreaktioner, klåda eller urticaria.

Om hudutslag skulle uppkomma under behandlingen med Diclofenac ratiopharm gel, ska behandlingen avbrytas.

Ljuskänslighet med hudreaktioner efter exponering för solljus kan förekomma i samband med behandlingen.

Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att hindra barn från att vidröra områden som behandlats med gelen.

Detta läkemedel innehåller parfym med bensylalkohol (0,15 mg/g), citral, citronellol, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, d-limonen och linalol, vilka kan orsaka allergiska reaktioner. Bensylalkohol kan dessutom orsaka mild lokal irritation.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom den systemiska absorptionen av diklofenak är mycket liten i samband med lokal applicering på huden, är det mycket osannolikt att interaktioner skulle förekomma vid bruk i enlighet med instruktionerna.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Den systemiska koncentrationen av diklofenak är lägre i samband med lokal applicering på huden än vid peroral administrering. På basen av erfarenhet från behandling med NSAID-läkemedel med systemiskt upptag, är rekommendationerna som följer:

Graviditet

En hämning av prostaglandinsyntesen kan påverka graviditeten och/eller den embryonala/fosterutvecklingen på ett negativt sätt. Data från epidemiologiska studier tyder på en ökad risk för missfall, samt risk för hjärtmissbildningar och gastroschisis efter intag av en prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet. Den absoluta risken för kardiovaskulära missbildningar ökade från mindre än 1 % till cirka 1,5 %. Risken tros öka med högre dos samt med behandlingens längd. Hos djur har tillförsel av prostaglandinsynteshämmare visats leda till en ökad förekomst av pre- och postimplantationsförluster samt embryofetal död. En ökad förekomst av flera missbildningar, inklusive kardiovaskulära, har dessutom rapporterats hos djur som exponerats för en prostaglandinsynteshämmare under den organbildande perioden.

Under den första och andra trimestern av en graviditet ska diklofenak användas endast då det är absolut nödvändigt. Om diklofenak används av en kvinna som försöker bli gravid, eller under den första och andra trimestern av en graviditet bör dosen vara så låg och behandlingstiden så kort som möjligt.

Under den tredje trimestern av en graviditet kan alla prostaglandinsynteshämmare utsätta

- fostret för:
 - kardiopulmonell toxicitet (för tidig slutning av *ductus arteriosus* och pulmonell hypertension)
 - störd njurfunktion, vilket kan leda till njursvikt och därmed minskad mängd fostervatten).
- modern och fostret vid graviditetens slut, för:
 - en möjlig förlängning av blödningstiden, vilket beror på en antiaggregationseffekt som kan förekomma redan vid mycket låga doser.
 - hämning av uteruskontraktionerna, vilket kan leda till försenad/förlängd förlossning.

Ovanstående medför att diklofenak är kontraindicerat under den tredje trimestern av en graviditet.

Amning

Diklofenak utsöndras i bröstmjölk i små mängder. Vid terapeutiska doser av Diclofenac ratiopharm gel förväntas ändå ingen påverkan hos barn som ammas. På grund av brist på kontrollerade studier hos ammande kvinnor ska produkten dock endast användas enligt instruktioner av hälsovårdspersonal i samband med amning, och Diclofenac ratiopharm gelen får inte appliceras på brösten hos ammande kvinnor eller på andra stora hudytor eller under en längre tid (se avsnitt 4.4).

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ett lokalt bruk av diklofenak på huden har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningarna anges nedan grupperade enligt organsystemklass och frekvens. Frekvenserna definieras på följande sätt: *Mycket vanliga* ($\geq 1/10$); *vanliga* ($\geq 1/100, < 1/10$); *mindre vanliga* ($\geq 1/1\ 000, < 1/100$); *sällsynta* ($\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$); *mycket sällsynta* ($< 1/10\ 000$); *ingen känd frekvens* (*kan inte beräknas från tillgängliga data*).

Organsystem	Biverkningar och frekvenser
Infektioner och infestationer	<i>Mycket sällsynta</i> : Pustulösa utslag
Immunsystemet	<i>Mycket sällsynta</i> : Överkänslighet (inklusive urtikaria), angioödem
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum	<i>Mycket sällsynta</i> : Astma
Magtarmkanalen	<i>Mycket sällsynta</i> : Besvär som rör magtarmkanalen
Hud och subkutan vävnad	<i>Vanliga</i> : Dermatit (inklusive kontaktdermatit), hudutslag, erytem, eksem, klåda <i>Mindre vanliga</i> : Flagande hud, uttorkning av huden, ödem <i>Sällsynta</i> : Bullös dermatit <i>Mycket sällsynta</i> : Ljusöverkänslighetsreaktioner <i>Ingen känd frekvens</i> : En brännande känsa vid applikationsstället, torr hud

När gelen appliceras på större hudområden under en längre tid kan en risk för sådana systemiska biverkningar (t.ex. biverkningar som rör njurar, lever eller magtarmkanalen, systemiska överkänslighetsreaktioner) som förekommer vid systemiskt bruk av diklofenak inte uteslutas.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

webbplats: www.fimea.fi.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

4.9 Överdosering

En överdosering anses osannolik, eftersom den systemiska absorptionen i samband med begränsad kutan användning är liten.

Om den rekommenderade dosen överskridits i betydande grad, ska gelen avlägsnas från huden och området tvättas av med vatten.

Samma biverkningar som observerats i samband med överdosering av systemiskt diklofenak kan förekomma om diklofenak för lokalt bruk på huden av misstag intagits via munnen (1 tub på 100 g innehåller 1 160 mg diklofenakdietylamin, vilket motsvarar 1 000 mg diklofenaknatrium).

Om oavsiktlig nedsväljning resulterar i betydande systemiska biverkningar, bör allmänna behandlingsåtgärder som normalt vidtas vid förgiftning med NSAID-läkemedel vidtas. Ventrikelsköljning och administrering av aktivt kol ska övervägas särskilt i fall där endast en kort tid förflutit sedan intaget av läkemedlet.

Det finns ingen specifik antidot.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor; antiinflammatoriska medel, icke-steroider för utvärtes bruk

ATC-kod: M02AA15

Verkningsmekanism

Diklofenak är ett effektivt antiinflammatoriskt medel av icke-steroid natur (NSAID). Dess terapeutiska effekt förmedlas främst via en hämning av prostaglandinsyntesen via cyklooxygenas-2 (COX-2). Diklofenaks effekt via prostaglandinsynteshämnning har visats i konventionella djurförsöksmodeller för inflammation. Hos mänskliga lindrar diklofenak inflammationsrelaterad smärta, svullnad och feber. Dessutom ger diklofenak en reversibel hämning av ADP- och kollageninducerad trombocytaggregation.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Mängden diklofenak som absorberas via huden står i proportion till den tid under vilken läkemedlet är i kontakt med huden samt det behandlade områdets storlek, och beror både på den applicerade totaldosen och hudens fuktighetsgrad. Efter lokal applicering av Diclofenac ratiopharm gel på knän eller handens leder, kommer den aktiva substansen att sugas upp i varierande grad (beroende på diffusionshastigheten) och i detekterbara halter i så väl plasma som vävnader under applikationsstället.

Cirka 6 % av den mängd diklofenak som en dos diklofenakgel på 2,5 gram innehåller och som appliceras över ett hudområde på 500 cm² kommer att sugas upp. Detta har konstaterats genom en jämförelse av mängderna diklofenak och dess hydroxylerade metaboliter som utsöndrats via njurarna efter dosering av diklofenak i form av gel och diklofenaknatrium via munnen. På grund av den ackumulering (upplagring) av diklofenak som sker i huden, kommer diklofenak att frigöras under en längre tid till underhudsvävnaderna och plasma. Ocklusion (10 timmar) kan tredubbla det percutana upptaget av diklofenak (halten i serum) hos vuxna.

Distribution

Diklofenak binds till plasmaproteinerna till 99,7 %, och huvudsakligen till albumin (99,4 %). De plasmanivåer som uppnås efter applicering av diklofenakgel är inte tillräckligt höga för att förklara den terapeutiska effekt som uppnås, utan effekten beror mer sannolikt på de betydligt högre läkemedelskoncentrationer som uppnås i vävnaderna under applikationsstället. Tack vare sina egenskaper

(såsom en kort halveringstid i plasma, lågt pKa-värde, liten distributionsvolym och hög grad av proteinbindning) innehar diklofenak en affinitet till inflammerad vävnad.

Diklofenak distribueras till, och stannar helst kvar i inflammerade vävnader, där halterna konstaterats vara upp till 20 gånger högre än i plasma.

Metabolism

Biotransformationen av diklofenak omfattar delvis glukuronidering av den intakta molekylen, men utgörs huvudsakligen av enkel och multipel hydroxylering. Detta resulterar i flera fenolmetaboliter, av vilka flertalet konverteras till glukuronidkonjugat. Två av dessa fenolmetaboliter är biologiskt aktiva, men i mycket mindre grad än diklofenak.

Eliminering

Total systemisk clearance av diklofenak från plasma är 263 ± 56 ml/min. Den terminala halveringstiden i plasma är 1–2 timmar. Fyra av metaboliterna, inklusive de två aktiva, har också en kort halveringstid i plasma på 1–3 timmar. En av metaboliterna, 3'-hydroxy-4'-metoxy-diklofenak, har längre halveringstid men är praktiskt taget inaktiv. Diklofenak och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen i urinen.

Egenskaper hos patienterna:

Ingår ackumulering av diklofenak eller dess metaboliter är att förvänta hos patienter med nedsatt njurfunktion. Hos patienter med kronisk hepatitis eller okompenserad cirros är kinetiken och metabolismen av diklofenak densamma som hos patienter utan leversjukdom.

5.3 Prekliniska säkerhetssuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för mänskliga utöver den information som finns angiven i övriga delar av denna produktresumé. I djurförstudier har kronisk toxicitet orsakad av systemiskt administrerat diklofenak huvudsakligen tagit sig uttryck som gastrointestinala lesioner och sår. I en toxicitetsstudie på 2 år observerades en dosberoende ökning av förekomsten av hjärttromboser hos råttor som behandlats med diklofenak.

I djurförstudier gällande reproduktionstoxikologiska effekter orsakade systemiskt administrerat diklofenak en inhibering av ovulationen hos kaniner och störningar i implantation samt tidig embryonal utveckling hos råttor. Diklofenak ledde till förlängd dräktighetstid och utdraget förlossningsförlopp. Den embryotoxiska potentialen hos diklofenak undersöktes hos tre djurarter (råtta, mus, kanin). Fosterdöd och fördröjd tillväxt förekom vid maternellt toxiska doser. På basen av prekliniska data anses diklofenak vara icke-teratogen. Doser som låg under den maternellt toxiska nivån hade ingen inverkan på den postnatale utvecklingen hos avkommnan.

Diklofenak utgör en risk för vattenmiljön (se avsnitt 6.6).

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpmänne

Karbomer

Kokoylkaprylokaprat

Makrogolcetostearylter

Flytande paraffin

Dietylamin

Isopropylalkohol

Propylenglykol (E 1520)

Parfym (innehåller citronellol, geraniol, bensylalkohol, linalol, limonen, citral, farnesol, kumarin, eugenol)

Renat vatten

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originaltuben. Ljuskänsligt.
Inga särskilda temperaturanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Gelen levereras i tuber laminerade med aluminium och försedda med försegling av PE och skruvlock av PP.
Förpackningsstorlekar: 30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Detta läkemedel utgör en miljörisk (se avsnitt 5.3).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 5
2031 GA Haarlem
Nederlanderna

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

36997

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

10.6.2020