

## **Pakkauseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Lymecycline Brown & Burk 300 mg kapselit**

lymesykliini (vastaten 300 mg tetrasykliiniemästä)

**Lue tämä pakkauseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkauseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Älä luovuta sitä muille. Se voi vahingoittaa heitä, vaikka heidän sairaudenoireensa olisivat samat kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tämä sisältää kaikki mahdolliset sivuvaikutukset, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Katso kohta 4.

#### **Tässä pakkauselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Lymecycline Brown & Burk on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lymecycline Brown & Burk -valmistetta
3. Miten Lymecycline Brown & Burk -valmistetta otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Lymecycline Brown & Burk -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Lymecycline Brown & Burk on ja mihin sitä käytetään**

- Lymecycline Brown & Burk on antibiootti, joka kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä tetrasykliinit.
- Tätä lääkettä käytetään pääasiassa keskivaikean ja vaikean aknen hoitoon. Akne ilmenee ihossa mustapäinä ja märkärakkuloina, joita nimitetään usein finneiksi tai ”ihomadoiksi”. Lymecycline Brown & Burk -valmisteen vaikutus kohdistuu tiettyyn bakteeriin, joka on yksi aknen tärkeimmistä aiheuttajista. Bakteerin nimi on Propionibacterium acnes.
- Jos et ole varma, miksi lääkäri on määrännyt sinulle tätä lääkettä, keskustele hänen kanssaan.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lymecycline Brown & Burk -valmistetta**

##### **Älä ota Lymecycline Brown & Burk –valmistetta**

- jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai jos imetat.
- jos olet joskus saanut allergisen reaktion lymesykliinille (tämän lääkkeen vaikuttavalle aineelle), jollekin muulle tetrasykliinantibiootille (kuten doksisykliinille) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Allerginen reaktio voi olla esimerkiksi joko ihottuma tai kutina.
- jos sinulla on ollut joskus munuaissairaus.

Tätä lääkettä ei saa antaa alle 8-vuotiaille lapsille.

Tätä lääkettä ei saa ottaa samaan aikaan sellaisten suun kautta otettavien lääkkeiden kanssa, jotka sisältävät retinoideja (tällaisia lääkkeitä ovat tietyt muut aknelääkkeet).

##### **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä,

- jos sinulla on joskus ollut maksa- tai munuaisvaivoja
- jos sinulla on systeeminen lupus erythematosus (allerginen tila, joka aiheuttaa nivelkipua, ihottumia ja kuumetta) tai myasthenia gravis (lihasteikkoutta aiheuttava sairaus)

- jos auringonvalo tai solariumi on aiheuttanut sinulle joskus ihottumaa.

Antibioottien pitkäaikainen käyttö voi johtaa resistenttiin bakteri-infektioon (infektiota aiheuttavat bakteerit eivät reagoi antibioottikuuriin).

Ota lääke riittävän määrän vettä välttääksesi ruokatorvi ärsytystä ja haavaumia.

### **Muut lääkevalmisteet ja Lyme cycline Brown & Burk**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai saatat ottaa muita lääkkeitä

Älä käytä seuraavia lääkkeitä samanaikaisesti Lyme cycline-valmisteen kanssa, koska ne voivat vaikuttaa Lyme cycline-valmisteesi tehoon. Odota vähintään kaksi tai kolme tuntia Lyme cycline-valmisteen ottamisen jälkeen ennen kuin otat tämältyypisiä tuotteita.

- ruoansulatushäiriöiden lääkkeet
- haavaumia parantavat lääkkeet
- kinapriili (korkean verenpaineen hoitoon)
- kalsiumia, alumiinia, magnesiumia, sinkkiä tai rautaa sisältävät lisäravinteet
- aktiivihiihi, vismuttikelaatit ja sukralfaatti
- Didanosiiini HIV-infektioon

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

- veren hyytymistä estäviä lääkkeitä, kuten varfariinia
- nesteenoistolääkkeitä (munuais- tai sydänsairauden tai korkean verenpaineen hoitoon)
- systeemiset retinoidit, mukaan lukien suun kautta otettavat retinoidit (aknen hoitoon, esim. Roaccutane) tai suuria A-vitamiiniannoksia sisältävät lääkkeet (katso "Älä ota Lyme cyclinea" yllä)
- jos käytät litiumhoitoa, tämä lääke voi lisätä veresi litiumpitoisuutta
- jos käytät ehkäisytabletteja, se ei välttämättä toimi kunnolla Lyme cycline-hoidon aikana, varsinkin jos sinulla on jostain syystä sairaus tai ripuli. Ylimääräistä "este" ehkäisymenetelmää (esim. kondomia) tulee käyttää sen varmistamiseksi, ettet tule raskaaksi. Lue "pillerin" mukana toimitettu seloste tai keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos et ole varma, mitä tehdä tai kuinka kauan näitä varotoimia tulee noudattaa.

Kerro lääkärillesi, jos sinulle tehdään toimenpide, joka vaatii anestesiaa, koska Lyme cyclinea ei voida käyttää joidenkin nukutusaineiden, kuten metoksifluraanin, kanssa.

Tetrasykliini voi johtaa väärin positiivisiin virtsatesteihin glukoosin suhteen. Kerro lääkärillesi, jos käytät Lyme cycline-valmistetta ja tarvitset virtsatestin.

### **Lyme cycline Brown & Burk ruuan ja juoman kanssa**

Maidon kohtuikäyttö ei vaikuta tämän lääkkeen imeytymiseen. Ota kapseli aina vesilasillisen kanssa.

### **Raskaus ja imetys**

Älä ota tätä lääkettä, jos olet raskaana tai jos imetät.

Lyme cycline Brown & Burk -valmisteen kaltaisten lääkkeiden käyttö voi haitata sikiön tai imeväisen hampaiden kehitystä ja värjätä hampaat pysyvästi.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Ei tiedetä, vaikuttaako Lyme cycline kyky ajaa autoa tai käyttää koneita.

## **3. Miten Lyme cycline Brown & Burk -valmistetta otetaan**

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Annoksesi on lääkkeen ohjelijussa, joka kiinnitetään lääkepakkaukseen apteekissa. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

### **Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset**

#### ***Keskivaikea ja vaikea akne***

Normaali annos on yksi kapseli kerran vuorokaudessa, mieluiten aamuisin.

Hoidon kesto riippuu siitä, kuinka nopeasti tilasi kohenee. Normaalisti aknen hoito kestää vähintään 8–12 viikkoa. Lääkäri saattaa jatkaa hoitoasi pisimmillään 6 kuukauden ajan.

Ota kapseli aina vesilasillisen kera. Ota kapseli maitotuotteita sisältämättömän kevyen aterian yhteydessä.

#### **Munuaisten vajaatoiminta**

Jos sinulla on munuaissairaus, lääkäri saattaa pienentää annostasi.

**Älä anna Lyme cyclone Brown & Burk -valmistetta alle 8-vuotiaalle lapselle, koska se voi vahingoittaa häntä.**

#### **Jos otat enemmän Lyme cyclone Brown & Burk -valmistetta kuin sinun pitäisi**

Jos sinä otat tai joku muu ottaa liian monta Lyme cyclone Brown & Burk -kapselia, soita lääkärille neuvoja saadaksesi tai mene lähimpään sairaalaan, jotta tieto yliannostuksesta kantautuu hoitohenkilökunnalle.

Muista ottaa lääkepakkaus mukaasi. Pakkauksen sisältämien kapseleiden määrästä voidaan päätellä, kuinka monta kapselia pakkauksesta on otettu.

#### **Jos unohdat ottaa Lyme cyclone Brown & Burk -valmistetta**

Älä huoli, jos unohdat ottaa Lyme cyclone-valmisteen oikeaan aikaan. Ota se kun muistat ja jatka kuten ennenkin, ellei ole seuraavan annoksen aika. Älä tuplaa annosta korvataksesi unohtuneen kapselin. Älä koskaan ota enempää kapseleita kuin lääkärisi suosittelee.

#### **Jos lopetat Lyme cyclone Brown & Burk -valmisteen oton**

Akne reagoi antibioottihoitoon hitaasti. On tärkeää, että otat tätä lääkettä tarkasti lääkärin määräyksen mukaisesti. Jos lopetat Lyme cyclone Brown & Burk -hoidon liian aikaisin, akne tai infektio voi pahentua tai uusiutua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tämä lääke voi aiheuttaa seuraavassa mainittuja haittavaikutuksia.

*Yleiset haittavaikutukset (harvemmallalla kuin 1 potilaalla 10:stä)*

- pahoinvointi
- vatsakipu
- ripuli
- päänsärky.

*Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)*

- allerginen (yliherkkyys-) reaktio, joka aiheuttaa silmien, huulten tai kielen turvotusta\*
- laajojen ihoalueiden rakkulointi tai kesiminen\*
- suun, huulten, sukupuolielinten tai peräaukon alueen haavaumat tai vauriot\*
- näköhäiriöt

- heitehuimaus
- oksentelu (pahoinvointi)
- ruokatorven tulehtuminen tai haavautuminen, mikä aiheuttaa kipua ja nielemisvaikeuksia tai ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus (keltatauti)
- Maksatulehdus (hepatiitti)
- ihon herkistyminen auringonvalolle
- kallonsisäisen paineen kohoaminen
- tiettyjen verisolujen määrän tai tyyppin muutokset
- ylävatsakipu
- joidenkin verikoetulosten muutokset (maksan toimintakokeet)
- kuume
- kutina, ihottuma tai nokkosihottuma
- suolistotulehdus.
- Masennus
- Painajainen

Seuraavat mahdolliset haittavaikutukset liittyvät lääkeaineryhmään (tetrasykliinit), johon Lyme cycline Brown & Burk kuuluu:

- Systeeminen lupus erythematosus (allerginen tila, joka aiheuttaa nivelkipua, ihottumaa tai kuumetta).
- Haimatulehdus (haimatulehdus).
- Muutokset verikokeissa (punasolujen väheneminen, tiettyjen valkosolujen määrän nousu)
- Veren ureapitoisuuden nousu, jota voidaan tehostaa ottamalla diureetteja lymesykliinin kanssa
- ruokatorven tulehtuminen tai haavautuminen, mikä aiheuttaa kipua ja nielemisvaikeuksia tai kivuliasta närästystä
- nielemisvaikeudet
- haimatulehdus
- maksavaurio
- hampaiden värjäytyminen
- kielen, suun, poskien, ikenien tai huulten tulehtuminen tai aristus
- sukupuolielinten aristus tai kutina
- peräaukon alueen tai sukupuolielinten hiivatulehdus
- paksusuolitulehdus
- Tetrasykliinihoidon yhteydessä on raportoitu hyvänlaatuista kallonsisäistä kohonnutta verenpainetta, jonka oireita voivat olla päänsärky, oksentelu, näköhäiriöt (näön hämärtyminen, sokeat kohdat tai kaksoisnäkö) tai pysyvä näönmenetys.

\*Käänny heti lääkärin puoleen, jos sinulla ilmenee sellaisia haittavaikutuksia kuten kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus; hengitysvaikeudet; nokkosihottuma; laajojen ihoalueiden rakkulointi tai kesiminen; suun, huulten, sukupuolielinten tai peräaukon alueen haavautuminen tai vauriot; vaikea tai pitkäkestoinen päänsärky; vaikea pahoinvointi; tai näköhäiriöt.

## **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa sivuvaikutuksista suoraan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA. Verkkosivusto www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

## **5. Lyme cycline Brown & Burk -valmisteen säilyttäminen**

- Pidä tämä lääke poissa lasten ulottuville eikä näkyville.
- Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
- Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

- Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Lymecline Brown & Burk sisältää**

- Vaikuttava aine on lymesykliini. Yksi kapseli sisältää 408 mg lymesykliiniä (vastaten 300 mg:aa tetrasykliiniemästä).
- Muut aineet ovat magnesiumstearaatti; kolloidinen, hydratoitu piidioksidi. Kapselin kuori sisältää liivatetta, titaanidioksidia (E171), erytrosiinia (E127), kinoliinike lta ista (E104) ja indigokarmiinia (E132). Painomuste sisältää kaliumhydroksidia, mustaa rautaoksidia (E172), propyleeniglykolia ja shellakkaa.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

Lymecline Brown & Burk 300 mg kapseli on kova liivatekapseli, jonka runko on keltainen ja kansi punainen. Kapseliin on painettu ”NM”.

Kapselit on pakattu koteloon, jossa on 28 tai 56 kapselia läpipainopakkauksissa. Yksi läpipainoliuska sisältää 7 kapselia, ja yhdessä kotelossa on 4 tai 8 läpipainoliuskaa. Kaikkia pakkauskojoja ei välttämättä ole myynnissä.

### **Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

Brown & Burk IR Limited  
22 Northumberland Road,  
Ballsbridge, Dublin 4,  
Ireland

**Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:**

Belgia:	Lymecline Brown & Burk 408 mg gélules/capsules,hard/hartkapseln
Tanska:	Lymecyclin Brown & Burk
Suomi:	Lymecline Brown & Burk 300 mg kapselit
Irlanti:	Rimicorim 300 mg Capsules
Norja:	Lymecline Brown & Burk 300 mg harde kapsler
Ruotsi:	Lymecyklin Brown & Burk 300 mg kapslar
uk:	Lymecline 408 mg capsules

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.12.2023**

## **Lymecycline Brown & Burk 300 mg kapselit**

lymecyklin (motsvarande 300 mg tetracyklinbas)

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Lymecycline Brown & Burk är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lymecycline Brown & Burk
3. Hur du tar Lymecycline Brown & Burk
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lymecycline Brown & Burk ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar.

### **1. Vad Lymecycline är och vad det används för**

Lymecycline Brown & Burk tillhör läkemedelsgruppen tetracyklinantibiotika.

Lymecycline Brown & Burk används främst för behandling av måttlig till svår akne. Akne yttrar sig som pormaskar och kvisslor som ofta kallas finnar.

Lymecycline Brown & Burk angriper de bakterier som är en av de främsta orsakerna till akne. Dessa bakterier har namnet *propionibacterium acnes*.

Om du är osäker på varför denna medicin har förskrivits åt dig ska du tala med din läkare.

### **2. Vad du behöver veta innan du tar Lymecycline Brown & Burk**

**Ta inte Lymecycline Brown & Burk:**

- om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
- om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot lymecyklin, den aktiva substansen i denna medicin eller mot andra tetracyklinantibiotika så som doxycyklin eller något annat innehållsämne i Lymecycline (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan bestå av antingen utslag eller klåda
- om du tidigare har haft njursjukdom
- Lymecycline får inte ges till barn under 8 år.
- Lymecycline får inte tas samtidigt som mediciner som innehåller orala retinoider (dessa inkluderar vissa andra mediciner som används för att behandla akne).

### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare innan du tar Lymecycline Brown & Burk

- om du tidigare har haft lever- eller njurproblem
- om du har systemisk lupus erythematosus (ett allergiskt tillstånd som ger ledsmärtor, hudutslag eller feber) eller myasthenia gravis (ett tillstånd som försvagar musklerna)
- om du tidigare har fått utslag som reaktion på solljus eller sollampor.

Långvarig användning av antibiotika kan leda till resistenta bakteriella infektioner (Bakterier som orsakar infektion svarar inte på antibiotikakuren)..

Ta läkemedlet med tillräckliga mängder vatten för att undvika irritation och sår i matstrupen

### **Andra läkemedel och Lymecline Brown & Burk**

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel:

Ta inte följande mediciner samtidigt som din Lymecline, eftersom dessa kan påverka hur väl din Lymecline fungerar. Vänta minst två till tre timmar efter att du tagit Lymecline innan du tar dessa typer av produkter.

- rättsmedel för matsmältningsbesvär
- sårläkande läkemedel
- quinapril (mot högt blodtryck)
- kosttillskott som innehåller kalcium, aluminium, magnesium, zink eller järn
- aktivt kol, vismutkelater och sukralfat
- didanosin för HIV-infektion

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

- blodförtunnande läkemedel t.ex., warfarin
- diuretika (används för att behandla njursjukdom, hjärtsjukdom eller högt blodtryck)
  - systemiska retinoider inklusive orala retinoider (för att behandla akne, t.ex. Roaccutan), eller läkemedel som innehåller höga doser av vitamin A (se "Ta inte Lymecline " ovan)
- om du tar någon behandling med litium kan detta läkemedel öka litiumnivåerna i ditt blod
- Om du tar p-piller har de eventuellt inte tillräcklig effekt medan du tar Lymecline Brown & Burk, särskilt om du av någon orsak har kräkningar eller diarré. En extra barriärmetod för graviditetsskydd (t.ex. kondom) bör användas för att säkerställa att du inte blir gravid. Läs bipacksedeln som medföljde dina piller eller tala med läkaren eller apotekspersonalen om du är osäker på hur du ska göra eller hur länge du ska vidta dessa försiktighetsåtgärder

Tala om för din läkare om du ska genomgå ett ingrepp som kräver bedövning eftersom Lymecline inte kan användas tillsammans med vissa anestesimedel t.ex. metoxifluran

Tetracyclin kan leda till ett falskt positivt urintest för glukos. Tala om för din läkare om du tar Lymecline och behöver ta ett urinprov.

### **Lymecline Brown & Burk med mat och dryck**

Upptaget av Lymecline påverkas inte av måttliga mjölmängder. Lymecline Brown & Burk kapslar ska alltid tas med ett glas vatten.

### **Graviditet och amning**

Lymecline Brown & Burk får inte tas om du är gravid eller ammar.

Användning av mediciner som Lymecline Brown & Burk kan påverka tillväxten hos tänder som utvecklas och leda till permanent missfärgning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Lymecline Brown & Burk är inte känt för att påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

## **3. Hur du tar Lymecline Brown & Burk**

Ta alltid Lymecycline enligt läkarens anvisningar. Den korrekta dosen finns på etiketten som apotekspersonalen har försett förpackningen med. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Vuxna och barn över 12 år**

#### **Måttlig till svår akne**

Normal dos är en Lymecycline Brown & Burk kapsel en gång dagligen, helst på morgonen.

Hur länge du ska ta Lymecycline Brown & Burk beror på hur snabbt ditt tillstånd förbättras. För akne är detta normalt minst 8–12 veckor. Läkaren kan besluta att fortsätta med behandling i högst 6 månader.

Lymecycline Brown & Burk kapslar ska alltid tas med ett glas vatten. De bör även tas med en lätt måltid utan mjölkprodukter.

#### **Nedsatt njurfunktion:**

Om du har ett njurproblem kan läkaren besluta att minska din dos.

**Ge inte Lymecycline Brown & Burk till barn under 8 år eftersom det kan skada dem.**

#### **Om du har tagit för stor mängd av Lymecycline Brown & Burk**

Om du eller någon annan tar för många Lymecycline Brown & Burk kapslar ska du ringa till läkaren för råd eller uppsöka närmaste sjukhus så att vårdpersonal uppmärksammas på problemet.

Glöm inte att ta förpackningen med dig. Denna kan visa hur många kapslar som har tagits.

#### **Om du har glömt att ta Lymecycline Brown & Burk**

Om du har glömt att ta en dos ska du helt enkelt ta den när du kommer ihåg det och fortsätta som förr, om det inte snart är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos av kapslar för att kompensera för glömd kapsel. Ta aldrig fler kapslar än vad läkaren rekommenderar.

#### **Om du slutar att ta Lymecycline Brown & Burk**

Akne reagerar långsamt på antibiotika. Det är viktigt att du tar allt Lymecycline som läkaren ordinerat dig. Om du slutar att ta Lymecycline Brown & Burk för fort kan din akne eller infektion bli värre eller komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan Lymecycline Brown & Burk orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Lymecycline kan orsaka följande biverkningar:

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

- illamående(känna sig sjuk)
- buksmärta
- diarré
- huvudvärk.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) som orsakar svullnad av ögon, läppar eller tunga\*
- blåsbildning och avfällning på stora hudområden\*
- sår eller lesioner på munnen, läpparna, områdena för könsorgan eller ändtarmsöppning\*
- synstörningar



- yrsel
- kräkningar (att vara sjuk)
- inflammation eller sårbildning i matstrupen med smärta eller svårighet att svälja eller smärtsam halsbränna
- gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot)
- inflammation i levern (hepatit)
- ökad solkänslighet i huden
- ökat tryck i hjärnan
- förändringar i antalet eller typen av vissa blodceller
- smärta i övre delen av buken
- förändringar i vissa blodtester (leverfunktionstester)
- feber
- klåda, hudutslag eller nässelutslag
- inflammation i mag-tarmkanalen.
- depression
- mardröm

Följande biverkningar kan förekomma vid behandling med den klass av läkemedel som Lymecline Brown & Burk tillhör (tetracyklinerna):

- systemisk lupus erythematosus (ett allergiskt tillstånd som orsakar ledvärk, hudutslag eller feber).
- pankreatit (inflammation i bukspottkörteln).
- förändring av blodprov (minskning av röda blodkroppar, ökning av vissa vita blodkroppar)
- ökning av urea i blodet som kan förstärkas genom att ta diuretika med Lymecline
- inflammation eller sårbildning i matstrupen med smärta eller svårighet att svälja eller smärtsam halsbränna
- svårighet att svälja
- inflammation i bukspottkörteln
- leverskada
- missfärgning av tänderna
- inflammation eller ömhet i tungan, munnen, kinderna, tandköttet eller läpparna
- ömhet eller klåda i området för könsorganen
- jästinfektion runt ändtarmsöppningen eller könsorganen
- tjocktarmsinfektion
- benign intrakraniell hypertoni, vars symtom kan inkludera huvudvärk, kräkningar, synstörningar (suddig syn, blinda fläckar eller dubbelseende) eller permanent synförlust har rapporterats med tetracyklinbehandling.

\*Tala genast om för läkaren om du får svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och halsen, svårighet att andas, nässelutslag, blåsbildning eller avfjällning på stora hudområden, sår eller skador i munnen, på läpparna, i området för könsorganen eller ändtarmsöppningen, svår eller bestående huvudvärk, kraftigt illamående eller eventuella synstörningar.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan även rapportera biverkningar direkt via webbplats: [www.sivusto: www.fimea.fi](http://www.sivusto:www.fimea.fi)  
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret  
PB 55  
00034 FIMEA

### **5. Hur Lymecline Brown & Burk ska förvaras**

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

- Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten på blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.
- Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

- En Lymecline kapsel innehåller 408 mg av den aktiva substansen lymecyklin (motsvarande 300 mg tetracyclinbas).
- Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, kolloidal hydratiserad kiseldioxid. Kapselhöljet innehåller gelatin, titandioxid (E171), erytrosin (E127), kinolingult (E104) och indigokarmin (E132), färgen innehåller kaliumhydroxid, svart järnoxid (E172), propylenglykol och shellack.

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lymecline Brown & Burk 300 mg kapselit är hårda gelatinkapslar med gul kropp och rött lock märkt med NM.

Lymecline Brown & Burk kapslar är förpackade i en kartong som innehåller 28 eller 56 kapslar förpackade i blister. En blisterkarta innehåller 7 kapslar och det finns 4 eller 8 blisterkartor i varje kartong. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Brown & Burk IR Limited  
22 Northumberland Road,  
Ballsbridge, Dublin 4,  
Ireland

### Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgium	Lymecline Brown & Burk 408 mg gélules/capsules,hard/hartkapseln
Sverige	Lymecyclin Brown & Burk
Ruotsi	Lymecline Brown & Burk 300 mg kapselit
Irland	Rimicorim 300 mg Capsules
Norge	Lymecline Brown & Burk300 mg harde kapsler
Sverige	Lymecyklin Brown & Burk 300 mg kapslar
uk:	Lymecline 408 mg capsules

**Denna bipacksedel ändrades senast 25.12.2023**