

Pakkausselostetiedot

Strefen Orange 8,75 mg imeskelytabletit

flurbiprofeeni

Lue tämä pakkausselostetiedot huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tiedot.

Käytät tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselostetiedotessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkien henkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausselostetiedot. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkien henkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselostetiedotessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselostetiedotessa kerrotaan:

1. Mitä Strefen Orange -imeskelytabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Strefen Orange -imeskelytabletteja
3. Miten Strefen Orange -imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Strefen Orange -imeskelytablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Strefen Orange -imeskelytabletit ovat ja mihin niitä käytetään

Strefen Orange -imeskelytabletit sisältävät flurbiprofeenia. Flurbiprofeeni on tulehduskipulääke. Tämän ryhmän lääkkeet lievittävät kipua ja tulehdusta ja alentavat kuumetta. Strefen Orange -imeskelytabletit on tarkoitettu aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille lyhytaikaiseen käyttöön lievittämään kurkkukivun oireita, kuten esim. kurkun arkuutta, kipua ja turvotusta sekä nielemisvaikeuksia.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Strefen Orange -imeskelytabletteja

Älä otta Strefen Orange -imeskelytabletteja

- jos olet allerginen flurbiprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla joskus on esiintynyt astmaa, odottamatonta hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta, nenän vuotamista, kasvojen turvotusta tai kutiavaa ihottumaa (nokkosihottumaa) asetyylialisyylihapon tai jonkin muun tulehduskipulääkkeen käytön yhteydessä
- jos sinulla parhaillaan on tai joskus on ollut haavauma tai verenvuotoa (vähintään kaksi mahahaavatapahtumaa) mahassa tai suolistossa
- jos sinulla on aiemman tulehduskipulääkyksen käytön yhteydessä ilmennyt ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai puhkeama, vaikea paksusuolitulehdus tai jokin verenvuotosairaus
- jos käytät asetyylialisyylihappoa suurina annoksina tai muita tulehduskipulääkeitä (kuten selekoksibia, ibuprofeenia, diklofenaakkinaatriumia jne.).
- raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana.
- jos sinulla on vaikea sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Strefen Orange -imeskelytabletteja

- jos sinulla on ollut astma tai allergioita
- jos sinulla on risatulehdus (nielurisatulehdus) tai epäilet, että sinulla on bakteerin aiheuttama nieluinfektiö (koska saatat tarvita antibioottihoitoa)
- jos sinulla on sydän-, munuais- tai maksasairauksia
- jos sinulla on ollut aivohalvaus
- jos sinulla on suolistosairaus (haavainen paksusuolitulehdus, Crohnin tauti)
- jos sinulla on krooninen autoimmunisairaus, kuten SLE-tauti (systeeminen lupus erythematosus) tai sekamuotoinen sidekudossairaus
- jos olet iäkäs, koska silloin voit saada herkemmin tässä pakkausselosteessa lueteltuja haittavaikutuksia
- jos olet 6 ensimmäisellä raskauskuukaudella raskaana tai imetät.
- jos sinulla on jokin sokeri-intoleranssi-

Strefen Orange -imeskelytablettien käytön aikana

- lopeta imeskelytablettien käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu ihoreaktion oireita (ihottumaa, ihmisen kuoriutumista, rakkuloita) tai muita allergisen reaktion oireita
- ilmoita lääkäriille epätavallisista vatsaoireista (etenkin verenvuodosta)
- jos vointisi ei parane 3 päivää, jos se pahenee tai sinulle ilmaantuu uusia oireita, käännny lääkärin puoleen
- Strefen Orange -imeskelytablettien kaltaisiin lääkkeisiin voi liittyä hieman lisääntynyt sydänkohtauksen (sydäninfarktin) tai aivohalvauksen riski. Riski on suurempi suurilla annoksilla ja pitkääikaisessa käytössä. Älä ylitä suositeltua annosta tai hoidon kestoa (3 päivää).

Lapset

Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tästä lääkettä.

Muut lääkevalmisteet ja Strefen Orange

Kerro apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä. Kerro erityisesti, jos käytät:

- pienä annosta asetyylisalisylylihappoa (aspiriinia) (enintään 75 mg päivässä)
- verenpainelääkeitä tai sydämen vajaatoimintaan käytettäviä lääkeitä (sydänglykosideja)
- nesteenpoistolääkeitä (diureetteja, myös kaliumia säätäviä diureetteja)
- verenohennuslääkeitä (antikoagulantteja, verihiualeiden aggregaation estäjiä)
- kihtilääkeitä (probenesidiä, sulfapyratsonia)
- muita tulehduskipulääkeitä (selektiiviset syklo-oksigenaasi-2:n estäjät mukaan lukien) tai kortikosteroideja (kuten selekoksibia, ibuprofeenia, diklofenaakkinatriumia tai prednisolonia)
- mifepristonia (lääkettä, jota käytetään raskauden keskeyttämiseen)
- kinoloniantibiootteja (kuten siprofloksasiinia)
- siklosporiinia tai takrolimuusia (immuunivastetta lamaavia lääkeitä)
- fenytoiniä (epilepsialääke)
- metotreksaattia (autoimmunisairauksien ja syövän hoidossa käytettävä lääke)
- litiumia tai SSRI-lääkeitä (masennuksen hoitoon)
- suun kautta otettavia diabeteslääkeitä (sokeritauden hoitoon käytettäviä lääkeitä)
- tsidovudiinia (HIV-lääke).

Nämä imeskelytabletit on tarkoitettu vain lyhytaikaisen käyttöön. Älä käytä imeskelytabletteja enempää kuin tarvitset ja käytä niitä mahdollisimman lyhytaikaisesti oireiden lievittämiseksi. Jos sinulle ilmaantuu suun ärsytystä, flurbiprofeenihoito pitää lopettaa.

Älä otta Strefen Orange -imeskelytabletteja 3 vuorokautta kauempaa, ellei lääkäri niin määrää. Jos tilasi ei parane 3 päivässä tai se huononee tai jos saat uusia oireita, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Jos otat ensimmäisen Strefen Orange -imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireita voivat olla pahoinvoindi, oksentelu, mahakipu ja harvemmin ripuli. Korvien soimista (tinnitus), päänsärkyä ja ruoansulatuskanavan verenvuotoa voi myös esiintyä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos unohdat ottaa Strefen Orange -imeskelytabletteja

Jos unohdat ottaa imeskelytabletin, älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

LOPETA tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee:

- allergisen reaktion oireita, kuten astmaa, äkillistä hengityksen vinkumista, hengenahdistusta, kutinaa, nenän vuotamista, ihottumaa jne.
- kasvojen, kielen tai kurkun turpoamista, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia, sydämentykytystä ja verenpaineen laskua, joka johtaa sokkiin (tälläista voi tapahtua lääkkeen ensimmäisen käyttökerranakin yhteydessä)
- vaikea-asteisia iholeaktioita, kuten ihmisen kuoriutumista, rakkuloita tai ihmisen hilseilyä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos huomaat jonkin seuraavista oireista tai sellaisen oireen, jota ei ole tässä lueteltu:

Yleinen (saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä)

- huimaus, päänsärky
- kurkun ärsytys
- suun haavaumat tai kipu suussa
- kurkkukipu
- epämukavat tai poikkeavat tuntemukset suussa (kuten kuumitus, kirvelly, kihelmöinti, pistely jne.)
- pahoinvoindi ja ripuli
- ihmisen pistelyn ja kutinan tunne.

Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta)

- unelaisuus
- rakkulat suussa ja kurkussa, kurkun tunnottomuus
- turvotuksen tunne mahassa, vatsakipu, ilmavaivat, ummetus, ruoansulatusvaivat, oksentelu

- suun kuivuminen
- kirvelyn tunne suussa, makuaistin muutos
- ihottuma, ihan kutina
- kuume, kipu
- unelaisuuden tunne tai nukahtamisvaikudet
- astman pahaneminen, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus
- heikentynyt kurkun tuntoaisti.

Harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 1 000:sta)

- anafylaktinen reaktio.

Esiintyyvys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

- anemia, trombosytopenia (veren pieni verihiuhtalemäärä, mistä voi aiheutua mustelmia ja verenvuotoa)
- turvotus (edeema), korkea verenpaine, sydämen vajaatoiminta tai sydäninfarkti
- vaikeat ihoreaktiot, kuten rakkulaiset reaktiot, mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja Lyellin oireyhtymä sekä toksinen epidermaalinen nekrolyysi
- hepatiitti (maksatulehdus).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Strefen Orange -imeskelytablettien säilyttäminen

- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Älä käytä tätä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärä (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
- Säilytä alkuperäispakkaussessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Strefen Orange -imeskelytabletit sisältävät

Vaikuttava aine on flurbiprofeeni 8,75 mg. Muut aineet ovat makrogoli 300, kaliumhydroksidi (E 525), appelsiiniaromi, levomentoli, asesulfaamikalium (E 950), nestemäinen maltitoli (E 965) ja isomalti (E 953).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoot

Imeskelytabletit ovat pyöreitä ja niihin on merkity logo. Imeskelytablettien väri vaihtelee valkoisesta vaaleankeltaiseen.

Pakkauksessa on 8, 12 tai 16 imeskelytablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

DK-2860 Søborg

Tanska

Puhelin +358 0 290 009200

Valmistaja

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport,

Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Alankomaat

Tämä pakausselostet on tarkistettu viimeksi 25.11.2022

Bipacksedel: Information till användaren

Strefen Orange 8,75 mg sugtablett(er)

flurbiprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Strefen Orange sugtablett(er) är och vad de används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Strefen Orange sugtablett(er)
3. Hur du tar Strefen Orange sugtablett(er)
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Strefen Orange sugtablett(er) ska förvaras
6. Förfäckningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Strefen Orange sugtablett(er) är och vad de används för

Strefen Orange sugtablett(er) innehåller flurbiprofen. Flurbiprofen hör till gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Dessa läkemedel verkar genom att förändra kroppens reaktion på smärta, svullnad och hög temperatur. Strefen Orange sugtablett(er) används som korttidsbehandling för att lindra symptom vid halsont, såsom ömmande, smärtande och svullen hals samt svårigheter att svälja hos vuxna och barn över 12 års ålder.

2. Vad du behöver veta innan du tar Strefen Orange sugtablett(er)

Ta inte dessa sugtablett(er) om du:

- är allergisk mot flurbiprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- någon gång har haft astma, oväntad väsande andning eller andnöd, rinnande näsa, svullnad i ansiktet eller kliande utslag (nässelutslag) i samband med intag av acetylsalicylsyra eller något annat NSAID-preparat.
- har eller någon gång har haft sår eller blödningar (minst två episoder av magsår) i magsäcken eller tarmarna.
- i samband med tidigare användning av NSAID-preparat har haft blödningar eller perforering (uppkomst av hål) i magtarmkanalen, svår tjocktarmsinflammation (kolit) eller blodrubbningar.
- tar acetylsalicylsyra (aspirin) med hög dos eller andra NSAID-preparat (såsom celecoxib, ibuprofen, diklofenaknatrium o.s.v.).
- är gravid i 7:e, 8:e eller 9:e månaden.
- har eller någonsin har haft svår hjärt-, svår njur- eller svår leversvikt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Strefen Orange sugtablett er om du:

- har haft astma eller lider av allergi
- har tonsillit (halsfluss) eller tror att du kan ha en bakterieinfektion i svalget (eftersom du kan behöva antibiotika)
- har hjärt-, njur- eller leverbesvär
- har haft stroke
- har en historia av tarmsjukdom (ulcerös tjocktarmsinflammation, Crohns sjukdom)
- har en kronisk autoimmun sjukdom (inklusive systemisk lupus erythematosus eller blandad bindvävssjukdom MCTD)
- är äldre, eftersom sannolikheten att du utvecklar de biverkningar som förtecknas i denna bipacksedel då ökar
- är gravid i första till sjätte månaden eller ammar.
- inte tål vissa sockerarter

Medan du använder Strefen Orange

- Vid första tecken på hudreaktion (utslag, fjällande hud, blåsor) eller andra tecken på allergisk reaktion ska du sluta ta sugtablettarna och kontakta läkare omedelbart.
- Rapportera eventuella ovanliga symtom (särskilt blödning) till läkare.
- Om du inte blir bättre inom 3 dagar, om du blir sämre eller om nya symtom uppträder ska du kontakta läkare.
- Läkemedel som Strefen Orange kan vara förenade med en liten ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt (myokardinfarkt) eller stroke. Alla risker ökar vid högre doser och långvarig behandling. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid (3 dagar).

Barn

Läkemedlet får inte ges till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Strefen Orange

Tala om för apotekspersonalen om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. I synnerhet ska du tala om för dem om du tar:

- lågdos-ASA, d.v.s. små doser asetylsalicylsyra (aspirin) (upp till 75 mg om dagen)
- läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt (blodtryckssänkande medel, hjärtglykosider)
- vätskedrivande medel (diureтика, inklusive kaliumsparande läkemedel)
- läkemedel som förtunnar blodet (antikoagulantia, trombocytaggregationshämmande medel)
- läkemedel mot gikt (probenecid, sulfipyrazon)
- andra NSAID-preparat (inklusive selektiva cyklooxygenas-2-hämmare) eller steroider (såsom celecoxib, ibuprofen, diklofenaknatrium eller prednisolon)
- mifepriston (ett läkemedel som används för att avbryta en graviditet)
- kinolonantibiotika (såsom ciprofloxacin)
- ciklosporin eller takrolimus (för att hämma immunsystemet).
- fenytoin (för att behandla epilepsi)
- metotrexat (för att behandla autoimmuna sjukdomar och cancer)
- litium eller SSRI-preparat (mot depression)
- orala diabetesläkemedel (för att behandla diabetes)
- zidovudin (för att behandla hiv).

Användning med mat, dryck och alkohol

Alkohol skall undvikas under behandling med Strefen Orange sugtablett er eftersom det ökar risken för blödning i magtarmkanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Ta inte detta läkemedel om du är **gravid i sjunde, åttonde eller nionde månaden**. Om du är gravid i första till sjätte månaden eller ammar ska du prata med läkare innan du tar sugtabletterna.

Flurbiprofen tillhör en grupp läkemedel som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Effekten är reversibel när behandlingen avbryts. Det är osannolikt att Strefen Orange 8,75 mg sugtabletterna, om de används tillfälligt, kommer att påverka dina möjligheter att bli gravid, men om du har svårt att bli gravid ska du tala om det för din läkare innan du tar detta läkemedel.

Körförstående och användning av maskiner

Inga studier av effekten på förmågan att köra bil och använda maskiner har utförts. Yrsel och synrubbningar är emellertid biverkningar som förekommer vid användning av NSAID-läkemedel. Om du upplever dessa symtom ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några av innehållsämnen i Strefen Orange sugtabletter

Strefen Orange 8,75 mg sugtabletter innehåller isomalt (E953) 2 033,29 mg/sugtablett och flytande maltitol (E965) 509,31 mg/sugtablett.

Kan ha en milt laxerande effekt.

Kalorivärde 2,3 kcal/g maltitol eller isomalt

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar dessa sugtabletter.

Läkemedlets aromämnen innehåller ingredienser (citral, citronellol, d-limonen, geraniol och linalol) som kan orsaka allergiska reaktioner.

3. Hur du tar Strefen Orange sugtabletter

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är: Vuxna och barn över 12 års ålder:

- Ta en sugtablett i munnen och sug långsamt på den.
- Flytta hela tiden runt sugtabletten i munnen medan du suger.
- Sugtabletterna bör börja verka inom 30 minuter.
- Ta sedan en sugtablett var 3:e-6:e timme, om det behövs.
- **Ta inte mer än 5 sugtabletter per dygn.**

Produkten får inte användas hos barn under 12 år.

Dessa sugtabletter är endast avsedda för kortvarig användning. Du ska ta så få sugtabletter du behöver under den kortaste tid som krävs för att lindra symtomen. Om du får irritation i munnen ska flurbiprofenbehandlingen avslutas.

Ta inte Strefen Orange sugtabletter i mer än 3 dagar, om inte läkaren har sagt åt dig att göra det. Om du inte blir bättre inom 3 dagar, om du blir sämre, eller om nya symtom uppträder, ska du prata med en läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Strefen Orange sugtabletter

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen vid en överdosering kan vara illamående eller kräkning, magvärk eller mer sällsynt diarré. Ringningar i öronen, huvudvärk och blödningar i mag-tarmkanalen är också möjliga symtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Strefen Orange

Ta inte dubbeldos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA ATT TA det här läkemedlet och kontakta omedelbart läkare om du utvecklar:

- tecken på allergiska reaktioner som astma, oväntad väsande andning eller andnöd, klåda, rinnande näsa, hudutslag o.s.v.
- svullnad i ansikte, tunga eller hals på grund av svårigheter att andas, hjärtklappning och blodtrycksfall som leder till chock (dessa kan inträffa första gången du använder läkemedlet).
- allvarlig hudreaktion som fjällande hud, blåsor eller flagnande hud.

Prata med läkare eller apotekspersonal om du märker någon av följande övriga biverkningar eller någon biverkning som inte har nämnts:

Vanliga (*förekommer hos upp till 1 av 10 användare*):

- huvudvärk, yrsel
- halsirritation
- munsår eller smärta i munnen
- halsont
- obehag eller onormal känsla i munnen (värmekänsla, brännande känsla, stickande känsla o.s.v.)
- illamående, diarré
- stickande och kliande känsla i huden

Mindre vanliga (*förekommer hos upp till 1 av 100 användare*)

- dåsighet
- blåsor i mun eller hals, domningar i halsen
- uppsvälld buk, buksmärta, gaser, förstopning, matsmältningsbesvär, kräkning
- muntorrhet
- brännande känsla i munnen, smakförändringar
- hudutslag, kliande hud
- feber, smärta
- sömnighet eller sömnsvårigheter
- försämrad astma, väsande andning, andnöd
- nedsatt känslighet i halsen

Sällsynta (*förekommer hos upp till 1 av 1000 användare*)

- anafylaktisk reaktion

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- anemi, trombocytopeni (lågt antal blodplättar som kan ge upphov till blåmärken och blödning)
- svullnad (ödem), högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtattack
- allvarliga hudreaktioner, till exempel bullösa reaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom och toxisk epidermal nekrolysis
- hepatit (leverinflammation).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Strefen Orange sugtabletter ska förvaras

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen (som gör läkemedlet verksamt) är flurbiprofen 8,75 mg. Övriga innehållsstänken är: makrogol 300, kaliumhydroxid (E 525), apelsinarom, levomentol, acesulfamkalium (E 950), flytande maltitol (E 965) och isomalt (E 953).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sugtabletterna är runda och präglade med varumärkets logotyp och till färgen vita eller svagt gulskiftande. Förpackningarna innehåller 8, 12 eller 16 sugtabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
DK-2860 Søborg
Danmark
Tel.: +358 0 290 009200

Tillverkare

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,

Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Nederlanderna

Denna bipacksedel ändrades senast den 25.11.2022