

PAKKAUSSELOSTE

NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen

**Tiamiinihydrokloridi
Pyridoksiinihydrokloridi
Syanokobalamiini**

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää NeuroMax forte tabletteja huolellisesti saadaksesi siitä parhaimman hyödyn.

- Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä NeuroMax forte -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät NeuroMax forte -tabletteja
3. Miten NeuroMax forte -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. NeuroMax forte -tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ NEUROMAX FORTE -TABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

NeuroMax forte-tabletteja käytetään B-vitamiinien puutostilojen ehkäisyyn ja hoitoon.

B-vitamiineilla on moninaisia tärkeitä tehtäviä elimistön aineenvaihdunnassa. Ne toimivat koentsyymeinä tai entsyymien aktivaattoreina useissa reaktioissa, osallistuvat hapetus-pelkistysreaktioihin sekä vaikuttavat tumaan ja mitokondrioihin. B-vitamiinit ovat vesiliukoisia yhdisteitä, jotka eivät varastoidu elimistöön. Aikuisilla tiamiinin saantisuositus vuorokaudessa (ns. RDA-arvo) on 1,0-1,5 mg. Pyridoksiinin RDA-arvo on 1,5-2,1 mg ja syanokobalamiinin RDA-arvo on 3-4 mikrog.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT NEUROMAX FORTE -TABLETTEJA

Älä käytä NeuroMax forte tabletteja

- jos olet allerginen (yliherkkä) tiamiinihydrokloridille, pyridoksiinihydrokloridille, syanokobalamiinille tai NeuroMax forte tablettien jollekin muulle aineelle

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Käytettäessä suositeltua annosta NeuroMax forte tabletteja voidaan käyttää muiden lääkkeiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

NeuroMax forte tabletilla ei ole tunnettuja riskejä käytöstä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

NeuroMax forte-tablettien ottaminen ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. MITEN NEUROMAX FORTE -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Aikuisten annos on 1 tabletti päivässä. Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Tabletti otetaan runsaan nestemäärän kanssa. Noudata annostusohjetta. Ei jatkuvaan käyttöön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, NeuroMax forte tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Suurten pyridoksiiniannosten pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa hermostollisia oireita, kuten puutumista, lihasheikkoutta, muistihäiriöitä ja kömpelyyttä. Jopa hermovaurioita on raportoitu. Jos edellä mainittuja oireita esiintyy, tulee NeuroMax forte -tablettien käyttö lopettaa. Muita haittavaikutuksia voivat olla ihottumat.

Suun kautta otettuna syanokobalamiini ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia.

Suurten tiamiiniannosten käytössä on yksittäisissä tapauksissa kuvattu yliherkkyysreaktioita, kuten hikoilua, sydämen tiheälyöntisyyttä sekä ihon kutinaa.

Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutukset ovat harvinaisia. Jos haittavaikutuksia ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. NEUROMAX FORTE -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä NeuroMax forte tabletit sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat tiamiinihydrokloridi 100 mg, pyridoksiinihydrokloridi 200 mg ja syanokobalamiini 0,2 mg yhdessä tabletissa.
- Muut aineet ovat muunnettu ruokatärkkelys, trinitriumsitraatti (E331), sitruunahappo (E330), mikrokiteinen selluloosa, etyyliiselluloosa, steariinihappo, kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.
- Päälysteen aineet ovat hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), polydekstroosi ja makrogoli 4000.

NeuroMax forte tabletit ovat laktoosittomia ja makeuttamattomia.

Lääkevalmisteen kuvaus

Kalvopäälysteinen tabletti.

Valkoinen tai hieman vaaleanpunertava, kupera tabletti, jossa jakouurre ja jonka halkaisija on 11 mm.

Pakkauskoost

30, 50 ja 100 tablettia

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Puh.: (03) 615 600

Fax.: (03) 618 3130

Tämä seloste on tarkistettu 12.6.2014

BIPACKSEDEL

NeuroMax forte filmdragerad tablett

**Tiaminhydroklorid
Pyridoxinhydroklorid
Cyanokobalamin**

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktigt för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. NeuroMax forte tabletter måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad NeuroMax forte tabletter är och vad de används för
2. Innan du använder NeuroMax forte tabletter
3. Hur du använder NeuroMax forte tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur NeuroMax forte tabletter ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD NEUROMAX FORTE TABLETTER ÄR OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR

NeuroMax forte tabletter användas för förebyggande av och brist på B-vitamin.

B-vitaminerna har många viktiga uppgifter i organismens ämnesomsättning. De fungerar som koenzymer eller som enzymaktivatorer i flera reaktioner, de deltar i oxidations och reductions reaktioner, samt verkar på cellkärnan och möjligen mitokondrionerna. B-vitaminerna är vattenlösliga substanser, som inte upplagas i organismen. Tiamin rekommenderas för fullvuxna (s.k. RDA-värde) 1.0-1.5 mg i dygnet, pyridoxinets RDA är 1.5-2.1 mg och cyanokobalaminets RDA 3-4 mikrog.

2. INNAN DU ANVÄNDER NEUROMAX FORTE –TABLETTER

Använd inte NeuroMax forte tabletter

- Om du är allergisk (överkänslig) mot tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin eller något av övriga innehållsämnen i NeuroMax forte tabletter

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vid användning av rekommenderad dosering kan NeuroMax forte tabletter intagas tillsammans med andra läkemedel.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

NeuroMax forte tabletter har inga kända risker vid användning under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Intag av NeuroMax forte tabletter påverkar inte körförmåga och förmågan att använda maskiner.

3. HUR DU ANVÄNDER NEUROMAX FORTE –TABLETTER

För vuxna 1 tablett dagligen. För barn endast enligt läkarens anvisning. Tabletten intages med riklig mängd av vätska. Följ doseringsanvisningen. Inte till fortgående bruk.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan NeuroMax tablett orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Långvarig användning av stora pyridoxindoser kan förorsaka nervsymptom, alltså domning, muskelsvaghet, minnesstörningar och klumpighet. Även nervskador är rapporterat. Om ovannämnda symptom förekommer, bör användning av NeuroMax forte -tablett avslutas. Andra biverkningar kan vara hudutslag.

Vid oral tillförsel av cyanokobalamin har man inte upptäckt att det skulle orsaka biverkningar.

Vid stora doser av tiamin har enstaka överkänslighetsreaktioner beskrivits, så som svettning, takykardi samt klåda.

Vid användning av rekommenderad dos är biverkningar sällsynta. Om biverkningar uppkommer, kontakta din läkare.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

5. HUR NEUROMAX FORTE TABLETTER SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte efter utgångsdatumet angivet på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är tiaminhydroklorid 100 mg, pyridoxinhydroklorid 200 mg och cyanokobalamin 0,2 mg i en tablett
- Övriga innehållsämnen är modifierad matstärkelse, trinitrat (E331), citronsyra (E330), mikrokristallin cellulosa, etylcelluloosa, stearinsyra, koloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.
- Filmdrageringens innehållsämnen är hypromellos, titandioxid (E171), polydekstros och makrogol 4000.

NeuroMax forte tablett är laktosfria och osötade.

Läkemedlets utseende

Filmdragerad tablett.

Vit eller lite ljusröd, konvex tablett med brytskåda. Diameter är 11 mm.

Förpackningsstorlekar

30, 50, 100 tablett

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Tavastehus

Tel.: 03-615 600

Fax.: 03-618 3130

Denna bipacksedel är reviderad senast den 12.6.2014