

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Furesis comp tabletit furosemidi ja triamtereeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Furesis comp on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Furesis comp -tabletteja
3. Miten Furesis comp -tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Furesis comp -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Furesis comp on ja mihin sitä käytetään

Furesis comp -tablettien sisältämät furosemidi ja triamtereeni ovat ns. nesteenpoistolääkkeitä. Ne lisäävät virtsaneritystä, minkä ansiosta elimistön nestemäärä vähenee ja turvotukset poistuvat.

Furesis comp -tabletteja käytetään eri syistä johtuvien turvotusten hoitoon etenkin silloin kun tarvitaan voimakasta tai pitkäkestoista nesteenpoistolääkitystä.

Furosemidia, jota Furesis comp sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Furesis comp -tabletteja

Älä ota Furesis comp -tabletteja

- jos olet allerginen furosemidille, triamtereenille, sulfonamideille (ns. sulfa-antibiootit), sulfonyyliureoille (sokeritaudin hoidossa käytettäviä suun kautta nautittavia lääkkeitä, kuten glibenglamidi, glipitsidi tai glimepiridi) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa, johon liittyy ajoittain maksakooma (maksan toimimattomuuden aiheuttama tajuttomuus)
- jos sinulla on todettu jokin elimistön neste- tai suolatasapainon häiriö, kuten kuivuminen tai natriumin vajoaus tai kaliumin ylimäärä
- jos virtsaaminen estyy tai loppuu tuntemattomasta syystä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Furesis comp -tabletteja

- jos sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa tai sokeritautia, jolloin lääkäri suunnittelee sinulle tarpeelliset verinäytteisiin perustuvat laboratorioseurannat furosemidin turvallisen käytön varmistamiseksi
- jos sairastat tai olet sairastanut kihtiä
- jos sairastat eturauhasen liikakasvua tai kärsit virtsankarkailusta
- jos olet menossa leikkaukseen, joka suoritetaan nukutuksessa (yleisanestesiassa)
- jos korvasi alkavat soida tai kuulosi heikkenee hoidon aikana
- jos olet iäkäs, jos käytät jotakin muuta lääkitystä, joka voi alentaa verenpainetta, tai jos sinulla on jokin muu sairaus tai vaiva, johon liittyy verenpaineen alenemisen riski.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Furesis comp -tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden tai Furesis comp -tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

- kolestipoli ja kolestyramiini (kolesterolilääkkeitä), jotka tulisi ottaa mieluiten yli 4 tuntia myöhemmin kuin Furesis comp -tabletit
- probenesidi (kihtilääke)
- litium, koska veren litiumpitoisuudet voivat kohota yhtäaikaisessa käytössä liian korkeiksi
- tulehduskipulääkkeet
- karbamatsepiini ja fenytoiini (epilepsialääkkeitä)
- antibiootit
- teofylliini (astmalääke)
- muut verenpainelääkkeet
- digitalis ja sotaloli (sydänlääkkeitä)
- kortikosteroidit, lakritsin sisältämä glykyrritsiini, amfoterisiini-B (sienilääke)
- klofibraatti (kolesterolilääke)
- kaliumia sisältävät valmisteet, kuten kaliumsuolat sekä tietyt lääkevalmisteet (esim. amiloridi, spironolaktoni ja ACE:n estäjät)
- varfariini (veren hyytymistä estävä lääke)
- amantadiini (parkinsonismi- ja viruslääke)
- trimetopriimi (mikrobilääke).

Muista mainita Furesis comp -hoidosta seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Mainitse Furesis comp -hoidosta myös mahdollisten virtsanäytteiden yhteydessä, sillä furosemidi voi muuttaa joidenkin testien tuloksia.

Furesis comp -tabletit ruuan ja juoman kanssa

Niele tabletit tyhjään mahaan eli vähintään tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen. Tabletissa on jakourre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisuena. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.

Tupakointi voi heikentää furosemidin tehoa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Furesis comp -tabletit voivat hoitoa aloitettaessa laskea verenpainetta niin, että se aiheuttaa huimausta ja pyörrytystä. Jos sinulla on näitä oireita, älä aja autoa tai käytä koneita. Nämä oireet yleensä häviävät hoidon jatkuessa, jonka jälkeen estettä autolla ajoon tai koneiden käyttämiseen ei ole.

Furesis comp -tabletit sisältävät laktoosia

Furesis comp -tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia 87,3 mg/tabletti. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Furesis comp -tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jos Furesis comp -tablettien vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Niele tabletit tyhjään mahaan eli vähintään tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen. Tabletissa on jakourre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Furesis comp -tablettien annostus on yksilöllinen. Suositeltu annos aikuisille on 1 tabletti 1–2 kertaa päivässä.

Käyttö lapsille

Käyttöä lapsille ei suositella.

Jos otat enemmän Furesis comp -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977), riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohtat ottaa Furesis comp -tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Furesis comp -tablettien oton

Furesis comp -hoitoa ei tule keskeyttää yhtäkkiesti, koska hoidettava sairaus saattaa äkillisesti paheta. Älä muuta annosta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joilla on useita sairauksia.

Lopeta Furesis comp -tablettien käyttö ja ota **välittömästi** yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita:

- voimakas pyörtyys tai pyörtyminen, voimakas huimaus, lihaskrampit tai sydämen rytmihäiriöt tai voimakkaat mahakivut
- vaikeat iho- ja limakalvoreaktiot, kuten purppuranpunaiset iholäiskät, ihon kuoriutuminen ja rakkulointi.

Ota yhteys lääkäriin **niin pian kuin mahdollista**, jos sinulla on seuraavia oireita:

- suun kuivuminen, jatkuva jano, virtsamäärän epänormaali väheneminen, virtsaamisvaikeudet, voimattomuus, näköhäiriöt, tunnottomuus, korvien soiminen, kuulon heikkeneminen, nivelkivut, ihottumat tai taipumus saada mustelmia aiempaa herkemmin.

Muut haittavaikutukset:

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

- elimistön kuivuminen (dehydraatio), suolatasapainon häiriöt (kaliumin, magnesiumin, natriumin tai kalsiumin puute; kaliumin kohonnut pitoisuus), elimistön happoemästatapainon häiriöt (hypokloreeminen metabolinen alkaloosi)
- pahoinvointi, oksentelu, ripuli.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- verensokerisäätelyn heikkeneminen, veren virtsahapon runsaus (hyperurikemia), kihti, veren rasva-arvojen muutokset, verimäärän pieneneminen, matala verenpaine
- levottomuus, huimaus, päänsärky, tunto- ja näköhäiriöt
- kuulon menetys (joskus korjautumaton)
- sydämen rytmihäiriöt
- suun kuivuminen, jatkuva jano, pahoinvointi, suolen toiminnan häiriöt, lihaskrampit
- virtsaamishäiriöt, virtsaumpi
- voimattomuus, väsymys
- ihottumat
- seerumin kreatiinipitoisuuden suureneminen, korjaantuva lievä munuaisten vajaatoiminta.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- luuytimen toiminnan heikkeneminen, valkosolujen kato (leukopenia, agranulosytoosi), verisolujen tuotannon väheneminen (aplastinen anemia), punasolujen ennenaikaisesta hajoamisesta johtuva anemia (hemolyyttinen anemia), verihutaleiden kato
- korvien soiminen (tinnitus), kuulon heikkeneminen
- verisuoni-, munuais- tai haimatulehdus, sapensalpaus
- valoyliherkkyys
- kuume

- virtsakivet.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- huimaus, pyörtyminen ja tajunnan menetys (oireisen hypotension vuoksi)
- allergiset iho- ja limakalvoreaktiot (osa vaikeita)
- akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (lääkkeen aiheuttama äkillinen, kuumeinen ihottuma).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Furesis comp -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Furesis comp sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat furosemiidi, jota on 40 mg ja triamtereeni, jota on 50 mg yhdessä tabletissa.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys, polysorbaatti 80, liivate, natriumtärkkelysglykolaatti ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Keltainen, kupera, jakourteellinen, päällystämätön tabletti, halkaisija 9 mm.

Pakkauskoot: 30, 50 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskojoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Orion Pharma
Joensuunkatu 7
24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.3.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Furesis comp tabletter

furosemid och triamteren

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Furesis comp är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Furesis comp -tabletter
3. Hur du tar Furesis comp -tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Furesis comp -tabletter ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Furesis comp är och vad det används för

Furosemid och triamteren som ingår i Furesis comp -tabletterna är urindrivande läkemedel. De ökar utsöndringen av urin varvid kroppens vätskemängd minskar och svullnaderna försvinner.

Furesis comp -tabletter används för att behandla svullnad till följd av olika orsaker, särskilt när det behövs stark eller långvarig vätskedrivande behandling.

Furosemid, som finns i Furesis comp kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Furesis comp -tabletter

Ta inte Furesis comp -tabletter

- om du är allergisk mot furosemid, triamteren, sulfonamider (s.k. sulfaantibiotika), sulfonylureapreparat (blodsockersänkande läkemedel som tas genom munnen, t.ex. glibenklamid, glipizid eller glimepirid) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du lider av gravt nedsatt leverfunktion med tidvis förekommande leverkoma (medvetslöshet på grund av störd leverfunktion)
- om du har konstaterats ha rubbningar i kroppens vätske- eller saltbalans, såsom uttorkning, brist på natrium eller överskott av kalium
- om urinblåsans tömning blir försvårad eller upphävd av en okänd orsak.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Furesis comp -tabletter

- om du lider av nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller sockersjuka. I dessa fall kontrollerar läkaren behandlingens trygghet med regelbundna blodprov.
- om du har eller har haft gikt

- om du har förstörd prostata eller urininkontinens
- om du ska opereras under narkos (allmän anestesi)
- om det börjar ringa i öronen eller hörseln nedsätter under behandlingen
- om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Andra läkemedel och Furesis comp -tabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner, receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Furesis comp -tabletter kan förändras eller du kan få biverkningar om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

- kolestipol och kolestyramin (kolesterolläkemedel), som inte bör intas innan minst 4 timmar har gått från intagning av Furesis comp -tabletter
- probenecid (medel mot gikt)
- litium, eftersom sambruket kan leda till för höga litiumhalter i blodet
- antiinflammatoriska medel
- karbamazepin och fenytoin (antiepileptika)
- antibiotika
- teofyllin (medel mot astma)
- andra blodtrycksmediciner
- digitalis och sotalol (hjärtmediciner)
- kortikosteroider, glycyrrizin (som finns i lakrits), amfotericin-B (svampmedicin)
- klofibrat (kolesterolläkemedel)
- preparat som innehåller kalium, såsom kaliumsalter och vissa läkemedel (t.ex. amilorid, spironolakton och ACE-hämmaren)
- warfarin (medel som hindrar blodets koagulation)
- risperidon (psykosläkemedel)
- amantadin (medel mot parkinsonism och virussjukdomar)
- trimetoprim (antimikrobikum).

Kom ihåg att tala om att du använder Furesis comp -tabletter i samband med följande läkarbesök.

I samband med eventuella urinprov skall du omnämna att du behandlas med Furesis comp -tabletter, för furosemid kan påverka vissa testresultat.

Furesis comp -tabletter med mat och dryck

Svälj tabletten på tom mage, d.v.s minst en timme före måltid eller 2 timmar efter måltid. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel. Drink ett glas vatten eller annan dryck, när du tar tabletten.

Rökning kan minska effekten av furosemid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Furesis comp -tabletter kan i början av behandlingen sänka blodtrycket och således förorsaka svindel och yrsel. Om detta förekommer skall man varken köra eller använda maskiner. Symtomen avtar vanligen när behandlingen pågår, varefter man kan köra och använda maskiner som vanligt.

Furesis comp innehåller laktos

Furesis comp -tablettorna innehåller laktosmonohydrat 87,3 mg/tablett. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Furesis comp -tabletter

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du finner att effekten av Furesis comp är för stark eller för svag, kontakta läkaren eller apoteket.

Svälj tablett på tom mage, d.v.s minst en timme före måltid eller 2 timmar efter måltid. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tablett om du har svårt att svälja den hel. Drick ett glas vatten eller annan dryck, när du tar tablett.

Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet.

Doseringen av Furesis comp -tabletter är individuell. Recommenderad dos för vuxna är 1 tablett 1-2 gånger dagligen.

Användning för barn

Användning för barn rekommenderas inte.

Om du har tagit för stor mängd av Furesis comp -tabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Furesis comp -tabletter

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta den som bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Kontrollera inför semester eller resa att du har tillräckligt av läkemedlet.

Om du slutar att ta Furesis comp -tabletter

Man ska inte plötsligt avbryta Furesis comp -behandlingen, eftersom den behandlade sjukdomen kan akut bli värre. Ändra inte på doseringen eller avsluta läkemedelsbehandlingen på egen hand.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar oftast förekommer hos patienter med dåligt skick och flera sjukdomar.

Sluta att ta Furesis comp -tabletter och kontakta **omedelbart** läkare eller närmaste jourpoliklinik om du får följande symtom:

- kraftig svindel eller ett svimningsanfall, stark yrsel, muskelkramper eller rytmstörningar i hjärtat eller kraftigt magknip
- svåra hud- och slemhinnereaktioner, såsom purpuröda hudfläckar, flagnande hud och blåsbildning.

Kontakta läkare **så snart som möjligt** om du får följande symtom:

- muntorrhet, kontinuerlig törst, onormal minskning av urinmängden, urineringsbesvär, kraftlöshet, synrubbningar, känslolöshet, öronsusning, nedsatt hörsel, ledvärk, hudutslag eller ökad benägenhet för blånader.

Andra biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- uttorkning (dehydrering), störningar i saltbalansen (brist på kalium, magnesium, natrium eller kalcium; förhöjd kaliumhalt), störningar i kroppens syra-basjämvikten (hypoklorisk metabolisk alkalos)
- illamående, kräkningar, diarré.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- minskad känslighet för blodsocker, ökad mängd urinsyra i blodet (hyperurikemi), gikt, förändringar i blodets fettvärden, nedsatt blodmängd, lågt blodtryck
- nervositet, yrsel, huvudvärk, känsel- och synstörningar
- dövhet (ibland bestående)
- rytmrubbningar
- muntorrhet, kontinuerlig törst, illamående, försämrad tarmpassage, muskelkramper
- urineringsstörningar, urinstopp
- kraftlöshet, trötthet
- utslag
- förhöjd kreatininhalt i serum, lindrig övergående njursvikt.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- försämring av benmärgsfunktion, minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, agranulocytos), minskad bildning av blodceller (aplastisk anemi), anemi som beror på en förtidig upplösning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi), minskat antal blodplättar
- öronsusning (tinnitus), nedsatt hörsel
- kärlinflammation, njurinflammation, bukspottkörtelinflammation, gallstopp
- överkänslighet för ljus
- feber
- urinvägstenar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck)
- allergiska reaktioner på hud och i slemhinnor (en del svåra)
- akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Furesis comp -tabletter ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är furosemid, varav det finns 40 mg och triamteren, varav det finns 50 mg i en tablett.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, polysorbat 80, gelatin, natriumstärkelseglykollat och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul, konvex, odragerad tablett med skåra, diameter 9 mm.

Förpackningsstorlekar: 30, 50 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Orion Pharma
Joensuunkatu 7
24100 Salo

Denna bipacksedel ändrades senast 28.3.2018