

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle
Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tästä lääkettilä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkikenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille, apteekkikenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 14 päivän jälkeen pitkäkestoisena ummetuksen hoidossa - tai 3 päivän jälkeen ulostekovettuman - hoidossa

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Laxido on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Laxidoa
3. Miten Laxidoa otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Laxidon säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Laxido on ja mihin sitä käytetään

Laxido sisältää makrogoli 3350:tä sekä elektrolyttejä natriumkloridi, natriumvetykarbonaatti ja kaliumkloridi.

Makrogoli 3350 on ulostuslääke, jota käytetään ummetuksen hoitoon, varsinkin jos olet kärsinyt ummetuksesta pitkän ajan. Sitä käytetään myös, kun suoleen on kertynyt kovia ulosteita, jotka saattavat johtua pitkääkaisesta ummetuksesta (tunnetaan nimellä ulostekovettuma). Makrogoli 3350 pehmentää ulosten ja helpottaa ulostamista, mikä lievittää ummetusta. Elektrolyytit auttavat pitämään kehon natrium-, kalium- ja nestetasot normaaleina ummetushoidon aikana.

Laxidon sisältämä makrogoli 3350 voi olla hyväksytty myös sellaisten muiden sairauksien hoitoon, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Käännny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 14 päivän jälkeen pitkäkestoisena ummetuksen hoidossa - tai 3 päivän jälkeen ulostekovettuman – hoidossa.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Laxidoa

Älä otta Laxidoa

- jos olet allerginen (ylipherkkä) makrogoli 3350:lle, natriumkloridille, natriumvetykarbonaatille (natriumbikarbonaatille), kaliumkloridille tai asesulfaamikaliumille.
- jos Sinulla on suolenseinämän repeämä.
- jos Sinulla on suolentukkeuma.

- jos Sinulla on suolihalvaus (esim. suolesi toiminta on loppunut suolile ikkauksen tai vakavan tulehdusen takia).
- jos Sinulla on haavainen koliitti, Crohnin tauti tai toksinen jättikoolon.

Jos jokin näistä koskee sinua, kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa.

Varoituukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkienilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Laxidoa ulostekovettuman hoitoon, koska ennen tämän lääkkeen ottamista on vahvistettava, että sinulla on tämä vaiva.

Nauti edelleen runsaasti nesteitä, kun käytät Laxido-valmistetta. Laxido -valmisteen sisältämä neste ei korvaa normaalilla nesteensaantia

Muut lääkevalmisteet ja Laxido

Joidenkin lääkkeiden kuten epilepsialääkkeiden teho saattaa heikentyä, kun niitä otetaan samanaikaisesti Laxido -valmisten kanssa. Kerro lääkärille tai apteekkienilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Sinun ei tulisi ottaa muita lääkkeitä suun kautta yhteen tuntiin ennen Laxidon ottamista eikä yhteen tuntiin sen ottamisen jälkeen.

Jos sinun on sakeutettava nesteitä ennen kuin voit niillä niitä turvallisesti, on huomattava, että Laxido saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.

Laxidon ruuan ja juoman kanssa

Ruoka ja juoma eivät vaikuta Laxidon tehoon.

Raskaus ja imetyks

Laxido -valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Laxidolla ei ole vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Laxido sisältää kaliumia ja natriumia

Laxido sisältää 0,68 mmol (26 mg) kaliumia annospussia kohti. Tämä tulisi ottaa huomioon, jos otat enemmän kuin yhden annospussin päivässä ja Sinulla on heikentynyt munuaistointi tai jos Sinun on kontrolloitava kaliumin saantiasi.

Tämä lääke sisältää 187 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) jokaisessa annospussissa. Tämä vastaa noin 9 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Keskustele lääkärisi tai apteekkienilökunnan kanssa, jos käytät tästä valmistetta kolme annospussia tai enemmän päivässä pitkääkaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavalioita.

3. Miten Laxidoa otetaan

Ota tästä läkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määärannyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma. Laxido tulee ottaa suun kautta.

Laxido on ummetuksen ja ulostekovettuman hoitoon tarkoitettu ulostuslääke (laksatiivi) aikuisille, lapsille (12 vuotta täyttäneille) ja iäkkäille potilaille.

Ummetus

Tavanomainen annos ummetukseen on yksi annospussi 1–3 kertaa vuorokaudessa.

Ulostekovettuma

Tavanomainen annos ulostekovettumaan on kahdeksan annospussia vuorokaudessa. Kaikki kahdeksan annospussia on otettava kuuden tunnin sisällä. Jos Sinulla on sydänsairaus, älä otta yli kahta annospussia (250 ml:ssä vettä) yhden tunnin aikana.

Sekoitusohjeet

Laxido tulee valmistaa liuottamalla yhden annospussin sisältö $\frac{1}{2}$ lasilliseen (125 ml) vettä. Sekoita hyvin kunnes jauhe on liuennut kokonaan. Jos saat hoitoa ulostekovettumaan, voit liuottaa kaikkien kahdeksan annospussin sisällön yhteen astiaan (yhteen litraan vettä).

Hoidon kesto

Ummetus

Ummetuksen hoitoon valmistetta käytetään yleensä enintään 2 viikkoa. Hoito voi kestää yli kaksi viikkoa, jos ummetuksesi on jatkuva tai jos Sinulla on jokin sairaus, joka aiheuttaa ummetusta (kuten Parkinsonin tauti tai multippeliskleroosi) tai jos otat säännöllisesti lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa ummetusta. Tällaisessa tilanteessa lääkärisi voi pienentää annoksesi yhteen annospussiin 1–2 kertaa vuorokaudessa.

Ulostekovettuma

Ulostekovettuman hoitoon valmistetta käytetään yleensä enintään 3 päivää.

Jos otat enemmän Laxidoa kuin Sinun pitäisi

Valmisteen käytön yhteydessä saattaa esiintyä voimakasta vatsakipua, vatsan turvotusta, oksentelua tai ripulia, jotka voivat johtaa elimistön kuivumiseen eli nestehukkaan. Jos näin käy, lopeta Laxidon käyttö ja juo runsaasti nesteitä. Jos olet huolissasi, käännny lääkärin tai apteekin puoleen.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut läkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Laxidoa

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat ja jatka sitten normaalista. Älä otta kaksinkertaista annosta korvatakseesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Laxidon oton

Saadaksesi Laxidosta parhaan mahdollisen hyödyn ota aina lääkärisi tai apteekin suosittelema hoitokuuri loppuun. Nämä varmistat, että ummetus paranee. Muutoin oireesi voivat jatkua.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene 14 päivän jälkeen pitkääikaisessa ummetuksessa tai 3 päivän jälkeen ulostekovettumassa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niiä saa.

Jos saat seuraavia haittavaikutuksia, lopeta heti Laxidon käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriisi:

- merkkejä vakavista allergisista reaktioista kuten hengitysvaikeudet tai kasvojen, huulien, kielen tai kurkun turpoaminen
- allergian oireita kuten ihottuma, ilon punoitus, nokkosihottuma, kutina tai hengenahdistus
- merkkejä kehon elektrolyytti- tai nestetasapainon muutoksista kuten turvotus (erityisesti nilkoissa), uupumuksen tunne, nestevajaus tai lisääntynyt jano, johon liittyy päänsärkyä. Nämä oireet voivat olla merkkejä normaalista alhaisemmista tai korkeammista veren kaliumtasosta.

Seuraavat haittavaikutukset ovat myös mahdollisia:

- vatsakipu
- turvotuksen tunne vatsan alueella
- ilmavaivat
- ruoansulatushäiriöt
- peräaukon arkuus
- lievä ripuli
- pahoinvointi
- oksentelu
- vatsan turpoaminen
- vatsan kurina.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55
00034 FIMEA

5. Laxidon säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä läkettä pakauksessa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärään jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä avaamattomat annospussit alle 25 °C.

Älä käytä tästä läkettä, jos huomaat annospussin vahingoittuneen.

Käyttövalmis Laxido-liuos voidaan peittää ja säilyttää jääräapissa (2°C-8°C), ja se tulee käyttää kuuden tunnin kuluessa. Käyttämätön liuos on hävitettyvä kuuden tunnin jälkeen.

Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Laxido sisältää

Vaikuttavat aineet ovat makrogoli 3350 (13,125 g), natriumkloridi (350,7 mg), natriumvetykarbonaatti (178,5 mg) ja kaliumkloridi (46,6 mg). Laxido sisältää myös asesulfaamikaliumia (E950).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakauskoot

Laxido on annospusseihin pakattua valkoista jauhetta.

Kukin annospussi sisältää 13,7 g jauhetta. Annospussit on pakattu 2, 8, 10, 20, 30, 50 ja 100 annospussin pahvipakkauksiin. Kaikkia pakauskokoja ei ole saatavana.

Myyntiluvan haltija

InterGal Pharma Ireland Limited
Finnabair Industrial Estate
Dundalk
Co Louth
A91 P9KD
Irlanti

Valmistaja

Almac Pharma Services Limited
Almac House
20 Seagoe Industrial Estate
Craigavon
BT63 5QD
Iso-Britannia

Almac Pharma Services (Ireland) Limited
Finnabair Industrial Estate
Dundalk
Co Louth
A91 P9KD

Irlanti

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluviin jäsenvaltioihin ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

Belgia – Laxido Natuur/Nature

Saksa – Laxido Natural

Luxemburg – Laxido Nature

Suomi, Irlanti, Ruotsi – Laxido

Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) – Compound Macrogol Oral Powder
Sugar Free

Tämä pakkausloste on tarkistettu viimeksi 13.01.2022.

Bipacksedel: Information till användaren

Laxido pulver till oral lösning, dospåse 13,7 g

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar om du har kronisk förstopning, eller efter 3 dagar om du har fekal impaktion.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Laxido är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Laxido
3. Hur du tar Laxido
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Laxido ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Laxido är och vad det används för

Laxido innehåller macrogol 3350 och elektrolyterna natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid.

Makrogol 3350 är ett avföringsmedel som används för att behandla förstopning, särskilt om du haft förstopning länge. Det används också för att behandla en ansamling av hård avföring i tarmen vilket kan vara ett resultat av långvarig förstopning (detta kallas fekal impaktion). Makrogol 3350 gör att avföringen blir mjukare och lättare att få ut, vilket lindrar förstopning. Elektrolyterna hjälper till att upprätthålla kroppens normala nivåer av natrium, kalium och vatten medan du behandlas för förstopning.

Makrogol 3350 som finns i Laxido kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar om du har kronisk förstopning, eller efter 3 dagar om du har fekal impaktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Laxido

Ta inte Laxido:

- om du är allergisk (överkänslig) mot makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kaliumklorid eller acesulfamkalium
- om du har en perforation i tarmväggen
- om du har en blockering i tarmen
- om du har en tarmförlamning (dina tarmar kan t.ex. sluta fungera på grund av tarmoperation eller svår infektion)

- om du har ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller toxisk megakolon

Om något av detta stämmer in på dig, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska för att få ytterligare råd.

Varningar och försiktighet

Tala med en läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Laxido för behandling av fekal impaktion, eftersom tillståndet måste bekräftas innan du tar läkemedlet.

När du tar Laxido bör du fortsätta att dricka mycket vätska. Vätskeinnehållet i Laxido ska inte ersätta ditt vanliga vätskeintag.

Andra läkemedel och Laxido

Vissa läkemedel, t.ex. antiepileptika, verkar eventuellt inte lika effektivt om de tas samtidigt med Laxido. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du bör inte ta några andra läkemedel via munnen under en timme före och en timme efter det att du tagit Laxido.

Om du behöver förtjocka vätskor för att kunna svälja dem säkert kan Laxido motverka effekten av förtjockningsmedlet.

Laxido med mat och dryck

Mat och dryck påverkar inte effekten av Laxido.

Graviditet och amning

Laxido kan tas under graviditet och under amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Laxido har ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Laxido innehåller kalium och natrium

Laxido innehåller 0,68 mmol (26 mg) kalium per dospåse. Du bör vara medveten om detta om du tar mer än en dospåse dagligen och har reducerad njurfunktion, eller om du står på en diet med begränsat kaliumintag.

Detta läkemedel innehåller 187 mg natrium (huvudkomponent i koksalt/bordssalt) i varje dospåse. Detta motsvarar ungefär 9 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för en vuxna.

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av tre eller fler dospåsar dagligen under en längre period, särskilt om du har ordineratssaltfattig (natriumfattig) kost.

3. Hur du tar Laxido

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Laxido ska tas oralt.

Laxido är ett laxermedel för behandling av förstopning och fekal impaktion hos vuxna, barn (12 år och äldre) och äldre.

Förstopning

Vanlig dos för förstopning är en dospåse en till tre gånger dagligen.

Fekal impaktion

Vanlig dos för fekal impaktion är åtta dospåsar dagligen. Alla åtta dospåsarna måste tas inom sex timmar. Om du har en hjärtsjukdom ska du inte ta mer än två dospåsar (i 250 ml vatten) under en timme.

Bruksanvisning

Du bereder Laxido genom att lösa upp innehållet i en dospåse i $\frac{1}{2}$ glas vatten (125 ml). Rör om väl tills allt pulver är upplöst. Om du behandles för fekal impaktion kan du lösa upp innehållet i alla åtta dospåsarna samtidigt i en stor behållare (i en liter vatten).

Behandlingens varaktighet

Förstopning

Behandlingen för förstopning pågår vanligtvis inte längre än två veckor. Din behandling kan pågå längre än två veckor om du har ständig förstopning, eller en sjukdom som orsakar förstopning (såsom Parkinsons sjukdom eller multipel skleros), eller om du regelbundet tar andra läkemedel som kan orsaka förstopning. I dessa fall kan läkaren minska din dos till en dospåse en eller två gånger dagligen.

Fekal impaktion

Behandlingen för fekal impaktion pågår vanligtvis inte längre än tre dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Laxido

Du kan uppleva svåra smärtor och svullnad i buken eller kräkningar eller diarré, vilket kan leda till dehydrering. Om detta inträffar ska du sluta ta Laxido och dricka rikligt med vätska. Kontakta din läkare eller apotekare om du är orolig.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Laxido

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan som förut. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Laxido

För att få största möjliga nytta av Laxido bör du alltid slutföra behandlingskuren som rekommenderats av läkare eller apotekspersonal. Då kan du vara säker på att din förstopning gått över, i annat fall kan symtomen du lider av fortsätta.

Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 14 dagar om du har kronisk förstopning, eller efter 3 dagar om du har fekal impaktion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande biverkningar, sluta att ta Laxido och kontakta läkare omedelbart:

- tecken på en allvarlig allergisk reaktion, t.ex. andningssvårigheter, eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg
- tecken på allergi, t.ex. utslag, hudrodnad, nässelutslag, klåda eller andnöd
- tecken på en förändring i kroppens vätske- eller elektrolytnivåer, t.ex. svullnad (huvudsakligen i vristerna), trötthetskänsla, uttorkning eller ökad törst med huvudvärk. Dessa symtom kan tyda på att kaliumnivåerna i blodet är högre eller lägre än normalt.

Du kan även få följande biverkningar:

- buksmärta
- känner dig uppsvälld
- lider av gaser
- matsmältningsbesvär
- ömhet i anus (ändtarmen)
- lindrig diarré
- illamående
- kräkning
- svullen buk
- magkurr

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Laxido ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara oöppnade dospåsar vid högst 25°C.

Använd inte detta läkemedel om du märker att någon av dospåsarna är skadad.

Färdigberedd Laxido-lösning kan täckas över och förvaras i kyl (2°C-8°C), och bör användas inom sex timmar. Efter sex timmar ska oanvänt lösning kastas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är makrogol 3350 (13,125 g), natriumklorid (350,7 mg), natriumvätekarbonat (178,5 mg) och kaliumklorid (46,6 mg). Laxido innehåller även acesulfamkalium (E950).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Laxido är ett vitt pulver som är förpackat i dospåsar.

Varje dospåse innehåller 13,7 g pulver och är förpackat i kartonger innehållande 2, 8, 10, 20, 30, 50 och 100 dospåsar. Alla dessa förpackningsstorlekar marknadsförs inte.

Innehavare av godkännande för försäljning

InterGal Pharma Ireland Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co Louth

A91 P9KD

Irland

Tillverkare

Almac Pharma Services Limited

Almac House

20 Seagoe Industrial Estate

Craigavon

BT63 5QD

Storbritannien

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co Louth

A91 P9KD

Irland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:

Belgien – Laxido Natuur/Nature

Tyskland – Laxido Natural

Luxemburg – Laxido Nature

Finland, Irland och Sverige – Laxido

Förenade kungariket (Nordirland) – Compound Macrogol Oral Powder Sugar Free

Denna bipacksedel ändrades senast 13.01.2022.