

PAKKAUSSELOSTE

Panadol Comp poretabletti parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Panadol Compia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievitä kolmen päivän kuluessa.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Panadol Comp on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Panadol Compia
3. Miten Panadol Compia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Panadol Compin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ PANADOL COMP ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Panadol Comp on särky- ja kuumelääke. Sen sisältämä parasetamoli lievittää kipua ja alentaa kuumetta. Lisäksi se sisältää kofeiinia, joka tehostaa parasetamolien vaikutusta ja piristää.

Panadol Comp poretabletteja käytetään aikuisten ja yli 12-vuotiaiden lasten tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hermo- ja lihassärky, päänsärky, vilustuminen, influenssa, hammassärky sekä kuukautiskivut.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PANADOL COMPIA

Älä käytä Panadol Compia

- jos olet allerginen (yliherkkä) parasetamolille, kofeiinille tai Panadol Compin jollekin muulle aineelle.
- jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus tai alkoholiongelma, älä käytä Panadol Comp valmisteita ilman lääkärin ohjeita.

Ole erityisen varovainen Panadol Compin suhteen

- Panadol Comp poretabletit on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, ota yhteys lääkäriin.
- Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.
- Jos noudatat niukasti natriumia sisältävää ruokavaliota (esim. verenpainetauti sairastavat henkilöt), on hyvä muistaa, että yksi Panadol Comp poretabletti sisältää 427 mg natriumia.
- Vältä liiallista kofeiinia sisältävien juomien kuten kahvin, teen ja energiajuomien nauttimista käyttäessäsi Panadol Compia, sillä valmiste sisältää kofeiinia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, mikäli samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä. Jos muita, lääkärin määräämiä lääkkeitä kuten metoklopramidia, kolestyramiinia, siprofloksasiinia, fluvoksamiinia, fenyylipropanoliamiinia tai probenesidiä sisältäviä valmisteita, verenohennuslääkkeitä tai epilepsialääkkeitä käytetään samanaikaisesti, neuvottele Panadol Comp -lääkityksestä ensin lääkärin kanssa.

Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Panadol Comp poretabletteja ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Panadol Comp poretabletit eivät vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Panadol Compin sisältämistä aineista

Panadol Comp poretabletti sisältää sorbitolia (E420). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän valmisteen ottamista.

Panadol Comp tabletit sisältävät kofeiinia, joten jos otat tabletin juuri ennen nukkumaanmenoa, se saattaa aiheuttaa unettomuutta herkille henkilöille. Kofeiini myös piristää.

3. MITEN PANADOL COMPIA KÄYTETÄÄN

Käytä Panadol Compia juuri sen verran kuin annostusohjeessa kerrotaan.

Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille on 1-2 poretablettia korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Lapsille yli 12-vuotiaille ½- 1 poretablettia korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Poretabletteja ei pidä ottaa useammin kuin neljän tunnin välein.

Alle 12-vuotiaille lapsille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Poretabletti liuotetaan huolellisesti noin 1 dl:aan nestettä, niin että se on kokonaan liuennut. Liuos on kirkas, maku neutraali.

Älä ylitä suositeltua annostusta.

Jos otat enemmän Panadol Compia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut tai jos lapsi on vahingossa ottanut Panadol Comp-valmistetta enemmän kuin pitäisi, ota heti yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (p. 09-471 977).

Jos unohdat ottaa Panadol Compia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Panadol Compkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Parasetamolivalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Hyvin harvinaisia (alle 1 potilaalla kymmenestä tuhannesta) haittavaikutuksia ovat voimakkaat yliherkkyysoireet parasetamolille (ihottuma tai ihon kutina, joskus hengitysvaikeuksia tai huulten, kielen, kurkun tai kasvojen turvotus), veren solujen väheneminen ja maksan toimintahäiriö. Keuhkoputkien supistumista saattaa esiintyä sellaisilla henkilöillä, jotka aikaisemmin ovat olleet yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille.

Runsas alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan.

Panadol Comp sisältää kofeiinia, joka saattaa aiheuttaa satunnaisesti hermostuneisuutta ja huimausta herkille henkilöille.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. PANADOL COMPIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (+ 15 - +25 °C).

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä valmistetta, jos repäisykupin pakkauksen folio on rikki valmistetta ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Panadol Comp sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg.
- Muut aineet ovat natriumvetykarbonaatti, sorbitoli, sakkariinatriumi, natriumlauryylisulfaatti, vedetön sitruunahappo, vedetön natriumkarbonaatti, povidoni ja dimetikoni.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Panadol Comp poretabletti on valkoinen, pyöreä tabletti, jossa on jakouurre.

12 ja 30 tabletin repäisykupin pakkaus pahvikotelossa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Tanska

Valmistaja

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd, Dungarvan, Irlanti

tai

Famar, Attiki, Kreikka

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare

PL 24

02231 Espoo

Puh: + 358 (0)10 30 30 30

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Panadol Comp brustablett

paracetamol 500 mg och koffein 65 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Panadol Comp måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom tre dagar.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Panadol Comp är och vad det används för
2. Innan du använder Panadol Comp
3. Hur du använder Panadol Comp
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Panadol Comp ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD PANADOL COMP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Panadol Comp är ett läkemedel mot feber och värk. Det innehåller paracetamol, som har en smärtstillande och febernedsättande effekt. Dessutom innehåller det koffein, som förstärker paracetamolets effekt och verkar uppiggande.

Panadol Comp brustabletter används för vuxna och barn över 12 år som febernedsättande och smärtstillande medel vid tillfällig feber och värk. Dessa tillstånd kan utgöras av bl.a. nerv- och muskelsmärta, huvudvärk, förkylning, influensa, tandvärk och menstruationssmärta. Enligt läkares föreskrift kan preparatet användas även för behandling av andra smärttillstånd.

2. INNAN DU ANVÄNDER PANADOL COMP

Använd inte Panadol Comp

- om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol, koffein eller mot något av övriga innehållsämnen i Panadol Comp.
- om du har en lever- eller njursjukdom eller alkoholproblem ska du inte använda Panadol Comp preparat utan läkares föreskrift.

Var särskilt försiktig med Panadol Comp

- Panadol Comp brustabletter är avsedda för tillfälligt bruk. Om symtomen fortsätter länge eller ofta återkommer bör läkare kontaktas.
- Inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination.
- Personer som ordinerats en kost med låg natriumhalt (t.ex. vid högt blodtryck) ska tänka på att en brustablett innehåller 427 mg natrium.
- Undvik att inta drycker som innehåller stora mängder koffein, t.ex. kaffe, te och energidrycker, då du behandlas med Panadol Comp eftersom preparatet innehåller koffein.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Läkemedlets effekt kan förändras vid samtidig användning av andra läkemedel. Rådgör med behandlande läkare om samtidig medicinering med Panadol Comp och andra av läkare förskrivna preparat innehållande bl.a. metoklopramid, kolestyramin, siprofloaxin, fluvoxamin, fenypropolanolamin eller probenecid, ävensom antikoagulantia och antiepileptika. Andra paracetamol innehållande läkemedel får inte användas samtidigt.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Panadol Comp brustabletter ska inte användas vid graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panadol Comp brustabletter påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Panadol Comp

Panadol Comp brustablett innehåller sorbitol (E420). Om din läkare berättat för dig att du har någon form av socker-intolerans ska du diskutera med din läkare innan du intar detta läkemedel.

3. HUR DU ANVÄNDER PANADOL COMP

Använd alltid Panadol Comp enligt anvisningar i förpackningen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos till vuxna ges 1-2 brustabletter högst 3 gånger dagligen.

Till barn över 12 år ges ½-1 brustablett högst 3 gånger dagligen.

Ta inte en brustablett oftare än med 4 timmars mellanrum.

Till barn under 12 år och för kontinuerlig användning endast enligt läkares föreskrift.

Brustabletten löses omsorgsfullt i ca 1 dl vätska tills den är helt upplöst. Lösningen är klar och har neutral smak.

Rekommenderade doser får inte överskridas.

Om du har tagit för stor mängd av Panadol Comp

Om du eller ditt barn av misstag har tagit Panadol Comp mer än enligt föreskrift, ska du genast kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 09-471 977).

Om du har glömt att ta Panadol Comp

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Panadol Comp orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Paracetamolpreparat tolereras i allmänhet väl.

Mycket sällsynta (färre än 1 av 10000 användare) biverkningar är kraftiga reaktioner på grund av överkänslighet för paracetamol (eksem, kliande hud, ibland svullnad i läpparna, tungan, halsen eller på ansiktet), minskande antal blodkroppar eller nedsatt leverfunktion. Sammandragning av luftrören kan uppträda hos personer med känslighet för acetylsalicylsyra och andra antiinflammatoriska värkmedicin.

I anslutning till omfattande alkoholkonsumtion kan paracetamolpreparat ha skadlig effekt på levern.

Panadol Comp innehåller koffein som sporadiskt kan förorsaka nervositet och svindel.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR PANADOL COMP SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (+15 - +25 °C).

Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte preparatet om folieförpackningen är trasig vid inköpstillfället.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är 500 mg paracetamol och 65 mg koffein.
- Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, sorbitol, sackarinnatrium, natriumlaurylsulfat, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumkarbonat, povidon och dimetikon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Panadol Comp brustablett är vit, rund tablett med delskåra.

Det finns 12 och 30 tabletter i stripsförpackningen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Danmark

Tillverkare

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd, Dungarvan, Irland

eller

Famar, Attiki, Grekland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare

PB 24

02231 Esbo

Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Denna bipacksedel godkändes senast 16.3.2011