

PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

Dexketoprofen Krka 50 mg/2 ml injektio-/infusioneste, liuos deksketoprofeeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin, apteekkienkilokunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilokunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Dexketoprofen Krka on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dexketoprofen Krka -valmistetta
3. Miten Dexketoprofen Krka –valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dexketoprofen Krka -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Dexketoprofen Krka on ja mihin sitä käytetään

Dexketoprofen Krka on kipua lievittävä lääke, joka kuuluu tulehduskipulääkkeiden (NSAID) ryhmään. Sitä käytetään akuutin keskivaikean tai vaikean kivun hoidossa, jos tablettein ottaminen ei ole mahdollista, kuten leikkauksen jälkeinen kipu, munuaiskivikipukohtaukset ja alaselän kipu.

Deksketoprofeenia, jota Dexketoprofen Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilokunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dexketoprofen Krka -valmistetta

Älä käytä Dexketoprofen Krka -valmistetta

- jos olet allerginen deksketoprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6);
- jos olet allerginen asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille (NSAID);
- jos sinulla on astma tai sinulla on ollut muiden tulehduskipulääkkeiden tai asetyylisalisyyliapon käytön yhteydessä astmakohtauksia, äkillistä allergista nuhaa (lyhytaikainen nenän limakalvon tulehdus), nenäpolyyppuja (allergiasta johtuvia nenän limakalvon polyypeja), nokkosrokkoja, angioedeemaa (turvotusta kasvoissa, silmissä, huulissa tai kielessä tai hengitysvaikeuksia) tai hengityksen vinkumista;
- jos sinulla on aiemmin ollut valoallergiaa tai valotoksisia reaktioita (auringonvalolle altistunut iho tulee punaiseksi ja/tai siihen tulee rakkuloita) käyttäessäsi ketoprofeenia (tulehduskipulääke) tai fibraatteja (veren rasvojen vähentämiseen käytettyjä lääkeaineita);
- jos sinulla on maha- tai pohjukaissuojaava tai ruuansulatuskanavan verenvuotoja tai jos sinulla on aiemmin ollut ruuansulatuskanavan verenvuotoja, haavaumia tai puhkeamia;
- jos sinulla on kroonisia ruoansulatusvaivoja (esim. ruoansulatushäiriö, näristys)
- jos sinulla on tai on ollut ruoansulatuskanavan verenvuotoja tai puhkeamia, jotka johtuivat tulehduskipulääkkeen (NSAID) käytöstä

- jos sinulla on krooninen suolistotulehdus (Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus);
- jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta, keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta tai vakavia maksaongelmia;
- jos sinulla on verenvuotohäiriöitä tai veren hyytymishäiriöitä;
- jos elimistösi on vaikeasti kuivunut (olet menettänyt paljon nestettä) oksentelun, ripulin tai riittämättömän nesteen saannin vuoksi
- jos olet raskaana viimeisellä kolmanneksella tai jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Dexketoprofen Krka – valmistetta, jos:

- sinulla on ollut krooninen suolistotulehdus (haavainen paksusuolitulehdus, Crohnin tauti)
- sinulla on tai on ollut muita maha- tai suolistovaivoja
- käytät muita mahahaavan tai -verenvuodon vaaraa lisääviä lääkkeitä, esim. suun kautta otettavat steroidit, tiettyjä masennuslääkkeet (SSRI-lääkkeet eli selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät), veren hyytymistä estäävät lääkkeet, kuten asetyylisalisyylihappo tai antikoagulantit, kuten varfariini. Jos käytät jotakin näistä lääkkeistä, kysy neuvoa lääkäriltä ennen kuin käytät Dexketoprofen Krka -valmistetta. Hän voi määrättää sinulle lääkyksen suojaamaan mahalaukkua (esim. misoprostoli tai jokin mahahapon tuotantoa estäävä lääke).
- sinulla on sydänvaivoja, sinulla on ollut aivohalvaus tai kuulut näiden riskiryhmään (esim. sinulla on korkea verenpaine, diabetes tai korkea kolesteroli tai tupakoit), keskustele Dexketoprofen Krka -valmisteen käytöstä lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa. Dexketoprofen Krka, kuten muutkin tulehduskipulääkkeet, voi jonkin verran lisätä sydäninfarktin tai aivohalvauksen vaaraa. Vaara kasvaa suuria annoksia käytettäessä ja pitkäkestoisessa hoidossa. Älä ylitä suositeltua annostusta ja hoidon kestoa.
- olet iäkäs: haittavaikutusten todennäköisyys kasvaa (ks. kohta 4). Ota heti yhteys lääkäriin, jos saat jonkin kohdassa 4 mainituista haittavaikutuksista.
- olet allerginen tai sinulla on ollut allergisia ongelmia
- sinulla on munuais-, maksa- tai sydänsairaus (verenpainetauti ja/tai sydämen vajaatoiminta), kärsit nesteen kertymisestä elimistöösi tai jos sinulla on ollut jokin näistä
- käytät nesteenpoistolääkkeitä tai jos kärsit elimistön kuivumisesta ja sinulla on pienentynyt verivolyymi suuren nestehukan seurauksena (esim. tiheä virtsaaminen, voimakas ripuli tai oksentelu)
- olet hedelmällisyshäiriöistä kärsivä nainen (Dexketoprofen Krka voi heikentää hedelmällisyyttä. Älä käytä Dexketoprofen Krka -valmistetta, jos yrität tulla raskaaksi tai jos käyt hedelmällisyystutkimuksissa.)
- olet raskauden alku- tai keskivaiheessa
- sinulla on häiriötä veremuodostuksessa tai verisolujen muodostuksessa
- sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE) tai sekamuotoinen sidekudostauti (immuunijärjestelmän sairauksia, jotka vaikuttavat sidekudokseen)
- sinulla on infektio – katso tarkempia tietoja jäljempänä kohdasta ”Infektiot”
- sinulla on astma, johon liittyy kroonista nuhaa, nenän sivuonteloiden tulehdusta tai nenän polypoosia. Tällöin sinulla on suurempi riski saada allerginen reaktio asetyylisalisyylihapolle tai tulehduskipulääkkeille kuin muulla väestöllä. Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa astmakohtauksen tai keuhkoputkien äkillisen supistumisen erityisesti niille potilaille, jotka ovat allergisia asetyylisalisyylihapolle tai tulehduskipulääkkeille.

Infektiot

Dexketoprofen Krka voi peittää infektion merkkejä, joita ovat muun muassa kuume ja kipu. Siksi on mahdollista, että Dexketoprofen Krka voi viivästyttää infektion asianmukaisen hoidon aloittamista, jolloin komplikaatioiden riski kasvaa. Näin on havaittu tapahtuvan bakteerien aiheuttaman keuhkokuumeen ja vesirokkoon liittyvien bakteeriperäisten ihoinfektioiden yhteydessä. Jos käytät tästä lääkettä silloin, kun sinulla on infektio, ja jos infektion oireet jatkuvat tai pahenevat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Tämän lääkkeen käyttöä on suositeltavaa välittää vesirokon aikana.

Lapset ja nuoret

Dexketoprofen Krka -valmisteen käyttöä lapsilla ja nuorilla ei ole tutkittu. Tämän vuoksi turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu ja valmistetta ei saa käyttää lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmis-teet ja Dexketoprofen Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määränyt. Joitakin lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ja joidenkin lääkkeiden annostusta voidaan joutua muuttamaan yhteiskäytössä. Kerro aina lääkärille, hammaslääkärille ja apteekkihenkilökunnalle, jos käytät tai sinulle määräätään Dexketoprofen Krka -valmisteen lisäksi jotakin muuta lääkettä:

Seuraavia ei suositella yhdessä Dexketoprofen Krka -valmisteen kanssa:

- asetyylisalisylylappo (aspiriini), kortikosteroidit tai muut tulehduskipulääkkeet
- varfariini, hepariini tai muut veren hyytymistä ehkäisevät lääkkeet
- litium, jota käytetään tietynläisten mielialavaihteluiden hoidossa
- metotreksaatti (syöpälääke tai immuunisalpaaja), jota käytetään suurina annoksina 15 mg/viikko
- hydantoiinit ja fenytoiini, joita käytetään epilepsian hoidossa
- sulfametoksatsoli, jota käytetään bakteeri-infektioiden hoidossa.

Näiden lääkkeiden yhteiskäytössä Dexketoprofen Krka -valmisteen kanssa tulee noudattaa varovaisuutta:

- ACE:n estääjät, nesteenpoistolääkkeet ja angiotensiini II -reseptorin salpajat, joita käytetään korkean verenpaineen ja sydänsairauksien hoidossa
- pentosifylliini/okspentifylliini, jota käytetään kroonisten laskimoperäisten säärihaavojen hoidossa
- tsidovudiini, jota käytetään virusinfektioiden hoidossa
- aminoglykosidiantibiootit, joita käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon
- sulfonyliureat (esim. klooripropamidi ja glibenklamidi), joita käytetään diabeteksen hoidossa.
- metotreksaatti, jota käytetään pieninä annoksina, alle 15 mg/viikko.

Näiden lääkkeiden yhdistämistä Dexketoprofen Krka -valmisteen kanssa tulee tarkkaan harkita:

- kinoloniantibiootit (esim. siproflokasiini, levoflokasiini), joita käytetään bakteeri-infektioiden hoidossa
- siklosporiini tai takrolimuusi, joita käytetään immuunijärjestelmän häiriöiden hoidossa ja elintensiirroissa
- streptokinaasi ja muut trombolyttiset tai fibrinolyttiset aineet eli verisuonitukosten liuottamisessa käytettävä lääkkeet
- probenesidi, jota käytetään kihdin hoidossa
- digoksiini, jota käytetään kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa
- mifepristoni, jolla saadaan aikaan raskaudenkeskeytys
- masennuslääkkeet, jotka kuuluvat selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin (SSRI-lääkkeet)
- trombosyyttiaggregaation estääjät, jotka vähentävät verihiualeiden paakkumisista ja ehkäisevät verihyytymien muodostumista
- beetasalpaajat, joita käytetään korkean verenpaineen ja sydänsairauksien hoitoon
- tenofoviiri, deferasiroksi, pemetreksedi.

Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma, voitko käyttää jotakin lääkettä Dexketoprofen Krka -valmisteen kanssa.

Raskaus, imetyks ja he de lmällisyys

Älä käytä Dexketoprofen Krka -valmistetta viimeisen raskauskolmanneksen ja imetyksen aikana. Kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä, koska Dexketoprofen Krka ei silloin ehkä sovi sinulle.

Dexketoprofen Krka -valmisten käyttöä on vältettävä naisilla, jotka suunnittelevat lapsen hankkimista tai jotka ovat raskaana. Se voi aiheuttaa munuais- ja sydänongelmia syntymättömälle lapselleesi. Se voi vaikuttaa sinun ja vauvasi verenvuotataipumukseen ja aiheuttaa sen, että synnytys viivästyy tai pitkittyy. Raskauden aikana (minkä tahansa raskausvaiheen aikana) valmistetta voidaan käyttää vain lääkärin valvonnassa. Jos Dexketoprofen Krka -valmistetta käytetään usean päivän ajan 20. raskausviikosta alkaen, se voi aiheuttaa syntymättömälle lapselleesi munuaisongelmia, joka voi johtaa vauvaa ympäröivän lapsiveden vähäiseen määrään (oligohydramnion) tai vauvan sydämen verisuonon (ductus arteriosus) kaventumiseen. Jos tarvitset hoitoa muutamaa päivää pidempään, lääkäri voi suositella lisäseurantaa. Dexketoprofen Krka -valmisten käyttöä ei suositella, kun yritetään tulla raskaaksi tai lapsettomuustutkimusten aikana.

Valmisten mahdollisista vaikutuksista naisen hedelmällisyteen katso myös kohta 2."Varoitukset ja varotoimet".

Ajamineen ja koneiden käyttö

Dexketoprofen Krka voi jonkin verran heikentää ajokykyäsi ja kykyäsi käyttää koneita, koska se voi aiheuttaa huimausta ja väsymystä. Jos huomaat näitä haittavaikutuksia, odota oireiden häviämistä ennen kuin ajat tai käytät koneita. Kysy lisätietoja lääkäriltä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastuksesesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Dexketoprofen Krka sisältää etanolia ja natriumia

Yksi Dexketoprofen Krka -ampulli sisältää 11,8 tilavuusprosenttia etanolia (alkoholia), eli enimmillään 200 mg per annos, mikä vastaa 5 ml:aa olutta tai 2,08 ml:aa viiniä per annos. Haitallinen alkoholismissa.

Ottavaa huomioon raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, lapsilla ja suuren riskin ryhmissä, kuten potilailla, joilla on maksasairaus tai epilepsia.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

3. Miten Dexketoprofen Krka -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määritellyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Oireiden lievittämiseen on käytettävä pienintä tehokasta annosta lyhyimmän mahdollisen ajan. Jos sinulla on infektio, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos oireet (kuten kuume ja kipu) jatkuvat tai pahenevat (ks. kohta 2).

Lääkäri määrittelee sinulle sopivan annoksen oireiden, niiden vakavuuden ja keston mukaan.

Suositeltu annos on tavallisesti 1 Dexketoprofen Krka -ampulli (50 mg) 8–12 tunnin välein.

Tarvittaessa uusi injektiliike voidaan antaa jo 6 tunnin kuluttua. Kokonaisannos vuorokaudessa on 150 mg Dexketoprofen Krka –valmistetta (3 ampullia), mitä ei saa missään tapauksessa ylittää.

Injektiohoitoa käytetään vain akuutin kipujakson aikana (eli korkeintaan 2 päivää). Vaihda suun kautta otettavaan kipulääkitykseen heti, kun mahdollista.

Iäkkäille munuaisten vajaatoimintapotilaille tai munuais- ja maksavaivoista kärsiville potilaille kokonaisannos vuorokaudessa ei saa ylittää 50 mg Dexketoprofen Krka –valmistetta (1 ampulli).

Käyttöohjeet:

Dexketoprofen Krka voidaan antaa injektiona joko lihakseen tai laskimoon (tekniset ohjeet suonensisäistä injektiota varten annetaan hoitoalan ammattilaisia varten olevassa osassa tämän pakkausselosten lopussa).

Kun Dexketoprofen Krka -valmistetta annetaan lihakseen, liuosruiske on annettava hitaan injektiona syvälle lihakseen heti, kun se on vedetty väriillisestä ampullista injektoruiskuun. Valmistetta voi käyttää ainoastaan, jos liuos on kirkasta ja väritöntä.

Käyttö lapsille ja nuorille

Tätä lääkettä ei saa käyttää lapsille ja nuorille (alle 18-vuotialle).

Jos saat enemmän Dexketoprofen Krka -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Dexketoprofen Krka -annoksen

Koska tämä lääke annetaan sinulle tarkan seurannan alla, on hyvin epätodennäköistä, että unohdat ottaa annoksen. Jos epäilet unohtaneesi hoitoannoksen, kerro heti lääkärille tai hoitajalle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset on kuvattu alla todennäköisen ilmaantuvuuden mukaan.

Yleiset haittavaikutukset: enintään 1 käyttäjällä 10:stä

Pahoinvointi ja/tai oksentelu, kipu injektiokohdassa, injektiokohdan reaktiot, esim. tulehdusreaktio, mustelmat tai verenvuoto.

Melko harvinaiset haittavaikutukset: enintään 1 käyttäjällä 100:sta

Verioksensus, matala verenpaine, kuume, sumea näkö, huimaus, uneliaisuus, unihäiriöt, päänsärky, anemia, mahakivot, ummetus, ruoansulatushäiriöt, ripuli, suun kuivuminen, punitus, ihottuma, kutina, lisääntynyt hikoilu, väsymys, kipu, viluisuus.

Harvinaiset haittavaikutukset: enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta

Mahahaava, mahahaavan vuoto tai puhkeama, korkea verenpaine, pyörtyily, hidastunut hengitystihneys, pinnallinen laskimotulehdus verisuonitukoksen seurauksena (pinnallinen tromboflebiitti), sydämen rytmihäiriöt (lisäyönnit), nopea sydämen syke, käsi ja jalkojen turvotus (perifeerinen edeema), kurkunpään turvotus, tuntoharhat, kuumeinen olo ja vilunväristykset, korvien soiminen (tinnitus), kutiava ihottuma, keltatauti, akne, selkäkipu, munuaiskipu, lisääntynyt virtsaamistarve, kuukautishäiriöt, eturauhasvaivat, lihasjäykkyys, nivelen jäykkyys, lihaskrampit, poikkeavat maksavarot (verikokeissa), verensokerin nousu (hyperglykemia), verensokerin lasku (hypoglykemia), veren liallinen triglyceridipitoisuus (hypertriglyceridemia), ketoniaineiden esiintyminen virtsassa (ketonuria), valkuaisvirtsaisuus (proteinuria), maksasoluvaario (hepatiitti), akuutti munuaisten vajaatoiminta.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset: enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta

Anafylaktinen reaktio (yliherkkyysreaktio, joka voi johtaa tajunnan menetykseen), ihan, suun, silmien ja sukupuolielinten alueen haavautuminen (Stevens–Johnsonin ja Lyellin oireyhtymä), kasvojen, kielen ja nielun turvotus (angioedeema), hengitysvaikeudet hengitysteiden lihasten supistelusta johtuen (bronkospasmi), hengenahdistus, haimatulehdus, ihoreaktiot ja ihan herkistyminen

auringonvalolle, munuaisvaurio, veren valkosolujen vähenneminen (neutropenia), verihiuataleniukkuus (trombosytopenia).

Kerro välittömästi lääkärille, jos saat hoidon alussa maha- tai suolistovaivoja (esim. mahakipu, närästys tai verenvuotoja) tai jos sinulla on aikaisemmin esiintynyt näitä haittavaikutuksia pitkääikaisen tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä. Tämä koskee erityisesti iäkkääitä ihmisiä.

Lopeta Dexketoprofen Krka -valmisteen käyttö heti, jos saat ihottumaa tai mitä tahansa limakalvovaurioita (esim. suun sisäpinnalla) tai allergisia oireita.

Tulehduskipulääkkeillä (NSAID) tapahtuvan hoidon aikana on raportoitu nesteen kertymistä ja turvotuksia (erityisesti nilkoissa ja jaloissa), kohonnutta verenpainetta ja sydämen vajaatoiminta. Kuten muutkin tulehduskipulääkkeet, Dexketoprofen Krka voi hieman lisätä sydäninfarktin tai aivohalvauksen riskiä.

Jos potilaalla on systeeminen lupus erythematosus (SLE) tai sekamuotoinen sidekudostauti (immuunijärjestelmän häiriötä, jotka vaikuttavat sidekudokseen), tulehduskipulääkkeet voivat harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa kuumetta, päänsärkyä ja niskan jäykyyttä.

Yleisimmin havaitut haittavaikutukset kohdistuvat ruoansulatuskanavaan. Maha- tai pohjukaissuolen haavaumia, puhkeamisia tai ruoansulatuskanavan verenvuotoja, joskus kuolemaan johtavia, saattaa esiintyä erityisesti iäkkäillä henkilöillä.

Pahoinvointia, oksentelua, ripulia, ilmavaivoja, ummetusta, ylävatsavaivoja, vatsakipua, mustia verulosteita, verioksentelua, haavaista suutulehdusta, paksusuolentulehduksen ja Crohnin taudin pahenemista on raportoitu valmisten antamisen jälkeen. Mahalaukun seinämän tulehdusta (gasteritti) on havaittu harvemmin.

Kuten muillakin tulehduskipulääkkeillä, hematologisia reaktioita (purppuraa, aplastista ja hemolyyttistä anemiaa, sekä harvemmin agranulosytoosia ja medullaarista hypoplasiaa) saattaa esiintyä.

Kerro välittömästi lääkärille, jos saat infektio-oireita tai ne pahenevat Dexketoprofen Krka -hoidon aikana.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkien henkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Dexketoprofen Krka -valmisten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Kohdan 6.6 mukaisesti laimennetun liuoksen, jos sitä säilytetään suojattuna päivänvalolta, on todettu olevan kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiili 24 tuntia 25 °C:n lämpötilassa.

Älä käytä tästä lääkettä, jos huomaat, että liuos ei ole kirkasta ja väritöntä, vaan siinä on näkyviä muutoksia (esim. hiukkasia). Dexketoprofen Krka -injektio-/infuus ioneste, liuos on tarkoitettu ainoastaan kerta-antoon ja se on käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen. Käyttämätön liuos on hävitettyvä (ks. alla hävittäminen).

Lääkkeitä ei pidä heittää viemärin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa

Mitä Dexketoprofen Krka sisältää

- Vaikuttava aine on deksketoprofeeni. Yksi 2 ml ampulli injektio-/infuusioneste, liuosta sisältää 50 mg deksketoprofeenia (deksketoprofeenitrometamolina).
- Muut aineet (apuaineet) ovat natriumkloridi, etanol (96 %), natriumhydroksidi (pH:n säättämiseen) ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Ks. kohta 2 ”Dexketoprofen Krka sisältää etanolia ja natriumia”.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauuskoko (-koot)

Dexketoprofen Krka injektio-/infuus ioneste, liuos on kirkas ja väritön liuos, käytännössä partikkelivapaa (pH: 7.0-8.0, osmolaliteetti: 270-328 mosmol/l).

Dexketoprofen Krka 2 ml ampulli injektio-/infuus ioneste, liuos on saatavilla 1, 5, ja 10 ampullin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauuskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tämä pakkauksen seloste on tarkistettu viimeksi 22.9.2022

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaistille:

Dexketoprofen Krka 50 mg/2 ml injektio-/infuus ioneste, liuos deksketoprofeeni

Injektio laskimoon:

Laskimoinfuusio: Yhden ampullin sisältö (2 ml) Dexketoprofen Krka -valmistetta laimennetaan 30–100 ml:lla fysiologista keittosuolaliuosta, 5 % glukoosiliuosta tai Ringerin laktaattiliuosta. Valmistettu liuos annetaan hitaan 10–30 minuutin laskimoinfuusiona. Liuos on suojattava päivänvalolta.

Laskimoon annettava bolus: yhden Dexketoprofen Krka -ampullin sisältö (2 ml) annetaan tarvittaessa hitaan, vähintään 15 sekuntia kestävänä boluksena laskimoon.

Dexketoprofen Krka -valmistetta ei saa antaa intratekaalisesti tai epiduraalisesti, koska se sisältää etanolia.

Valmisteen käsitteleyohjeet:

Kun Dexketoprofen Krka -valmistetta annetaan boluksena laskimoon, liuosruiske on annettava heti, kun se on vedetty värimisestä ampullista injektoriiskuun.

Laskimoinfousiona annettava liuos on laimennettava aseptisesti ja suojattava päivänvalolta.

Käytä vain, jos liuos on kirkasta ja väritöntä.

Yhteensopimattomuus:

Dexketoprofen Krka voidaan **sekoittaa pieleen määrään** (esim. injektoruiskussa) hepariini-, lidokaiini-, morfiini- tai teofylliini-injektionestettä.

Ohjeiden mukaan laimennettu liuos on kirkasta ja väritöntä. **Sataan (100) ml:aan** fysiologista keittosuolaliuosta tai glukoosiliuosta laimennettu Dexketoprofen Krka on osoittautunut yhteensovivaksi seuraavien lääkeaineiden kanssa: dopamiini, hepariini, hydroksitsiini, lidokaiini, morfiini, petidiini ja teofylliini.

Vaikuttavan aineen ei ole osoitettu absorboituvan, kun Dexketoprofen Krka -valmistetta on säilytetty muovipusseissa tai annosteluvälineissä, jotka on valmistettu etyylivinyyliasetaatista (EVA), selluloosapropionaatista (CP), pientiheyspolyeteenistä (LDPE) tai polyvinylkloridista (PVC).

Bipacksedel: Information till användaren

Dexketoprofen Krka 50 mg/2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning dexketoprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackselet finns information om följande:

1. Vad Dexketoprofen Krka är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dexketoprofen Krka
3. Hur du använder Dexketoprofen Krka
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dexketoprofen Krka ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dexketoprofen Krka är och vad det används för

Dexketoprofen Krka är ett smärtstillande medel och tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Det används för behandling av akut, medelsvår till svår smärta när det inte är lämpligt att ta tablett(er) såsom vid smärta efter operation, njurkolik (svår njursmärta) och smärta i länd- och/eller korsryggen.

Dexketoprofen som finns i Dexketoprofen Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Dexketoprofen Krka

Använd inte Dexketoprofen Krka om du:

- är allergisk mot dexketoprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6);
- är allergisk mot acetylsalicylsyra eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel;
- har astma eller har fått astmaanfall, akut allergisk rinit (kortvarig inflammation i slemhinnan i näsan), näspolyper (polyper i näsans slemhinnan p.g.a. allergi), urtikaria (hudutslag), angioödem (svullnad i ansikte, ögon, läppar eller tunga eller andningssvårigheter) eller pipande ljud i bröstet efter att ha tagit acetylsalicylsyra eller andra inflammationsdämpande läkemedel;
- har tidigare drabbats av fotoallergiska eller fototoxiska reaktioner (en speciell form av hudrodnad och/eller blåsbildning på huden vid exponering för solljus) i samband med intag av ketoprofen (en icke-steroid antiinflammatorisk medicin) eller fibrater (läkemedel som används för att sänka fettnivåerna i blodet);
- har sår i mage eller tolvflingertarm eller blödningar från mag-tarmkanalen eller om du tidigare haft blödning, sår eller brustet sår i mag-tarmkanalen;
- har kroniska matsmältningsproblem (t.ex. dålig matsmältningsproblem, halsbränna);
- har eller har haft blödningar från matsmältningskanalen eller brustet sår på grund av tidigare användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID);
- har kronisk inflammatörisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit);
- har allvarlig hjärtsvikt, måttligt till svårt nedsatt njurfunktion eller allvarliga leverproblem;
- har blödningsstörningar eller om blodet har svårt att levra sig;

- är allvarligt uttorkad (har förlorat stora mängder kroppsvätska) på grund av kräkningar diarré eller otillräckligt intag av vätska;
- är i de sista tre månaderna av en graviditet eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dexketoprofen Krka om du:

- har haft en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom)
- har eller har haft andra mag- eller tarmproblem
- använder andra läkemedel som ökar risken för magsår eller blödning, t.ex. perorala steroider, vissa antidepressiva medel (av typen SSRI d.v.s. selektiva serotoninåterupptagshämmare), medel som hämmar blodets förmåga att levra sig såsom acetylsalicylsyra eller antikoagulantia såsom warfarin. I sådana fall ska du rådfråga läkare innan du använder Dexketoprofen Krka. Han/hon kan vilja att du tar ytterligare ett läkemedel för att skydda din mage (t.ex. misoprostol eller läkemedel som hämmar produktionen av magsyra)
- har hjärtproblem, har haft stroke eller tror att det finns en risk för sådana händelser (t.ex. om du har högt blodtryck, diabetes eller höga kolesterolvärden eller röker) bör du diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal. Läkemedel som Dexketoprofen Krka kan sättas i samband med en liten ökad risk för hjärtattack ("hjärtinfarkt") eller stroke. Risken är mera sannolik vid höga doser och långvarig behandling. Överskrid inte rekommenderad dos och behandlingstid.
- är äldre: sannolikheten för biverkningar är större (se avsnitt 4). Du bör omedelbart rådfråga läkare om några av dessa biverkningar förekommer.
- är allergisk eller har haft allergiska problem
- lider av njur-, lever- eller hjärtsjukdom (hypertoni och/eller hjärtsvikt) och samlar på dig vätska eller om du tidigare har haft några av dessa besvär
- använder urindrivande läkemedel eller lider av uttorkning och har en minskad blodvolym på grund av en stor vätskeförlust (t.ex. tät urineringar, kraftig diarré eller kräkning)
- är en kvinna med fertilitetsstörningar (Dexketoprofen Krka kan nedsätta fertiliteten. Du bör därför inte använda Dexketoprofen Krka om du försöker att bli gravid eller om du genomgår utredning för infertilitet.)
- är i första eller andra trimestern av graviditeten (de första 6 månaderna)
- har störningar i blodbildning och bildning av blodceller
- om du har systemisk lupus erythematosus eller blandad bindvävssjukdom (sjukdomar i immunsystemet som påverkar bindväven)
- har en infektion – se rubriken "Infektioner" nedan
- har astma med kronisk snuva, kronisk bihåleinflammation och/eller näspolyper, eftersom du har en högre risk för allergi mot acetylsalicylsyra och/eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel än resten av befolkningen. Administration av detta läkemedel kan orsaka astmaattacker eller sammandragning av musklerna i luftvägarna, särskilt hos patienter som är allergiska mot acetylsalicylsyra eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Infektioner

Dexketoprofen Krka kan dölja tecken på infektioner såsom feber och smärta. Därför kan Dexketoprofen Krka göra att lämplig behandling av infektionen födröjs och att risken för komplikationer därmed ökar. Detta har iakttagits vid lunginflammation orsakad av bakterier och vid bakteriella hudinfektioner i samband med vattkoppor. Om du tar detta läkemedel medan du har en infektion och symtomen på infektionen kvarstår eller förvärras, ska du kontakta läkare omedelbart. Vid vattkoppor bör detta läkemedel inte användas.

Barn och ungdomar

Användning av Dexketoprofen Krka hos barn och ungdomar har inte studerats. Säkerhet och effekt av produkten har således inte fastställts och därför ska den inte användas hos barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Dexketoprofen Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. En del läkemedel ska inte användas samtidigt, medan andra kan kräva ändrad dos när de tas tillsammans. Tala alltid om för din läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du använder eller får något av följande läkemedel förutom Dexketoprofen Krka:

Kombinationer som inte rekommenderas:

- acetylsalicylsyra (aspirin), kortikosteroider eller andra antiinflammatoriska läkemedel
- warfarin, heparin eller andra läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig
- lithium som används vid behandling av vissa humörvängningar
- metotrexat (läkemedel mot cancer eller immunsuppressor) som används i höga doser på 15 mg/vecka
- hydantoiner och fenytoin som används vid epilepsi
- sulfametoxazol som används vid bakteriella infektioner.

Kombinationer som kräver försiktighet:

- ACE-hämmare, urindrivande läkemedel och angiotensin II-antagonister som används vid för högt blodtryck och vid hjärtsjukdom
- pentoxyfillin/oxpentifyllin som används vid behandling av kroniska venösa bensår
- zidovudin som används vid behandling av virusinfektioner
- aminoglykosidantibiotika, som används vid behandling av bakterieinfektioner
- sulfonylurea (t.ex. klorpropamid och glibenklamid) som används vid diabetes.
- metotrexat, som används i låga doser på mindre än 15 mg/vecka.

Kombinationer som noga bör övervägas:

- kinolonantibiotika (t.ex. ciprofloxacin, levofloxacin) som används vid bakteriella infektioner
- ciklosporin eller takrolimus som används vid behandling av störningar i immunsystemet och vid organtransplantation
- streptokinas och andra trombolytiska eller fibrinolytiska läkemedel d.v.s. läkemedel som används för att lösa upp blodproppar
- probenecid som används vid gjikt
- digoxin som används vid behandling av kronisk hjärtsvikt
- mifepriston som är ett abortframkallande läkemedel
- antidepressiva läkemedel ur gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
- trombocytaggregationshämmare som minskar hopklumpningen av blodplättarna och förhindrar bildning av blodpropp
- beta-blockerare, som används vid högt blodtryck och hjärtproblem
- tenofovir, deferasirox, pemtrexed.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker när du använder andra läkemedel samtidigt med Dexketoprofen Krka.

Graviditet, amning och fertilitet

Använd inte Dexketoprofen Krka under tredje trimestern av graviditeten och då du ammar.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel, då Dexketoprofen Krka kanske inte är lämpligt för dig. Användning av Dexketoprofen Krka bör undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Det kan orsaka njur- och hjärtproblem hos ditt ofödda barn. Det kan påverka din och barnets benägenhet att blöda och göra att förlossningen sker senare eller tar längre tid än förväntat. Behandling under vilken som helst del av graviditeten ska endast ske enligt anvisningar från läkare. Från och med 20:e graviditetsveckan kan Dexketoprofen Krka orsaka njurproblem hos ditt ofödda

barn om du tar det under längre tid än några dagar, vilket kan leda till låga nivåer fostervatten (oligohydramnios) eller förträngning av ett blodkärl i barnets hjärta (ductus arteriosus). Om du behöver längre behandling än några dagar kan din läkare rekommendera ytterligare övervakning. Användningen av Dexketoprofen Krka rekommenderas inte då du försöker bli gravid eller under utredning av infertilitet.

Om eventuella effekter på fertilitet hos kvinnor, se avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet”.

Körförmåga och användning av maskiner

Dexketoprofen Krka kan i viss mån påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner på grund av att biverkningar såsom yrsel eller trötthet kan förekomma. Om du noterar sådana effekter ska du vänta med att framföra fordon eller hantera maskiner tills symtomen är borta. Rådfråga läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dexketoprofen Krka innehåller etanol och natrium

Varje ampull Dexketoprofen Krka innehåller 200 mg etanol motsvarande 5 ml öl eller 2,08 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksamas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Dexketoprofen Krka

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den längsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Kontakta läkare omedelbart om du har en infektion och symtomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt 2).

Läkaren kommer informera dig om den nödvändiga dosen beroende på symtomens typ, allvarlighetsgrad och längd. Rekommenderad dos är vanligen 1 ampull (50 mg) Dexketoprofen Krka var 8–12:e timme. Vid behov kan injektionen upprepas efter 6 timmar. Den totala dygnsdosen på 150 mg Dexketoprofen Krka (3 ampuller) får inte överskridas i något fall.

Injektionsbehandlingen ska endast användas under den akuta perioden (d.v.s. inte längre än 2 dagar). Byt till smärtlindring som tas via munnen när så är möjligt.

Till äldre patienter med nedsatt njurfunktion eller till patienter med njur- eller leverproblem får total dygnsdos på 50 mg Dexketoprofen Krka (1 ampull) inte överskridas.

Instruktioner för användning:

Dexketoprofen Krka kan ges antingen som injektion i en muskel eller i ett blodkärl (tekniska detaljer för intravenös injektion beskrivs i avsnittet avsett för hälso- och sjukvårdspersonal i slutet av denna bipacksedel).

Vid injektion i en muskel ska lösningen injiceras direkt efter att den dragits upp ur den färgade ampullen långsamt djupt i muskeln. Endast en lösning som är klar och färglös får användas.

Användning för barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas hos barn och ungdomar (under 18 år).

Om du har använt för stor mängd av Dexketoprofen Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta alltid bipacksedeln eller förpackningen med dig till sjukhuset.

Om du har glömt att ta Dexketoprofen Krka

Eftersom du kommer att få detta läkemedel under noggrann övervakning är det mycket osannolikt att du kommer att missa en dos. Om du tror att du har missat en dos av behandlingen, kontakta omedelbart en läkare eller sjuksköterska.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella biverkningar finns uppräknade nedan enligt frekvens.

Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

Illamående och/eller kräkningar, smärta på injektionsstället, reaktion på injektionsstället t.ex. inflammation, blåmärke eller blödningar.

Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

Blodkräkning, lågt blodtryck, feber, dimsyn, yrsel, sömnighet, sömnstörningar, huvudvärk, anemi, buksmärkor, förstopning, matsmältningsproblem, diarré, muntorrhet, rodnad, hudutslag, klåda, ökad svettning, trötthet, smärta, frusenhet.

Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

Magsår, blödande magsår eller perforerat magsår, högt blodtryck, svimning, sänkt andningsfrekvens, ytlig veninflammation på grund av blodpropp (superficiell tromboflebit), rytmrubbningsar i hjärtat (extrasystole), snabba hjärtslag, svullna armar och ben (perifert ödem), laryngealt ödem, onormala känselförnimmelser, febrig känsla och rysningar, öronsusningar (tinnitus), kliande utslag, guldot, akne, ryggsmärta, njursmärta, frekvent urinering, menstruationsrubbningar, prostataproblem, muskelstelhet, stelhet i ledar, muskelkramper, onormala levervärdens (blodtest), ökade blodsockernivåer (hyperglykemi), minskade blodsockernivåer (hypoglykemi), höga halter av triglyceridfetter i blodet (hypertriglyceridemi), ketonkroppar i urinen (ketonuri), protein i urinen (proteinuri), levercellskada (hepatit), akut njursvikt.

Mycket sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

Anafylaktisk reaktion (överkänslighetsreaktion som också kan leda till kollaps), sårbildning på hud, mun, ögon och genitala områden (Stevens–Johnsons och Lyells syndrom), svullnad av ansikte, tunga och svalg (angioödem), andningssvårigheter på grund av sammandragningar i musklerna i luftvägarna (bronkospasm), andnöd, inflammation i bukspottkörteln, hudreaktioner och överkänslighet mot solljus, njurskada, minskat antal vita blodkroppar (neutropeni), minskat antal blodplättar (trombocytopeni).

Tala omedelbart om för läkare om du får mag- eller tarmsvär i början av behandlingen (t.ex. magsmärta, halsbränna eller blödningar) om du tidigare har haft sådana biverkningar på grund av långvarig användning av antiinflammatoriska läkemedel, speciellt om du är äldre.

Du ska avbryta behandlingen med Dexketoprofen Krka så snart du märker uppkomst av hudutslag eller någon form av skada på slemhinnorna (t.ex. ytan runt insidan av munnen) eller tecken på allergi.

Under behandlingen med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel har vätskeansamling och svullnad (särskild i anklor och ben), ökat blodtryck och hjärtsvikt rapporterats.

Läkemedel som Dexketoprofen Krka kan sättas i samband med en något ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Hos patienter med systemisk lupus erythematosus eller blanda bindvävssjukdom (störningar i immunsystemet som påverkar bindväv) kan icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel i sällsynta fall orsaka feber, huvudvärk och nackstelhet.

De vanligaste rapporterade biverkningarna är av gastrointestinal karaktär. Peptiskt sår, perforation eller gastrointestinal blödning, som kan vara fatala, särskilt hos äldre patienter, kan förekomma.

Illamående, kräkningar, diarré, gasbesvär, förstopning, dyspepsi, magsmärta, melena, hematemes, ulcerös stomatit, förvärrad kolit och Crohns sjukdom har rapporterats efter administrering. Mer sällan har inflammation i magslemhinnan (gastrit) observerats.

Såsom vid användning av andra NSAID kan hematologiska biverkningar (purpura, aplastisk och hemolytisk anemi och sällan agranulocytos och medullär hypoplasia) förekomma.

Tala omedelbart om för läkare om tecken på infektion förekommer eller blir värre under behandlingen med Dexketoprofen Krka.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Dexketoprofen Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Efter spädning enligt anvisningarna i avsnitt 6.6, förutsatt att den spädda lösningen är tillräckligt skyddad mot dagsljus, har kemisk och fysisk stabilitet under användning demonstrerats i 24 timmar vid 25°C.

Använd inte detta läkemedel om du noterar att lösningen inte är klar och färglös utan visar tecken på försämring (t.ex. partiklar). Dexketoprofen Krka injektions-/infusionsvätska, lösning är endast avsedd för engångsbruk och ska användas omedelbart efter öppnandet. Oanvänt lösning ska kasseras (se kassering nedan).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är dexketoprofen. 1 ampull med 2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning, innehåller 50 mg dexketoprofen (som dexketoprofentrometamol).
- Övriga innehållsämnen är natriumklorid, etanol (96 %), natriumhydroxid (för reglering av pH) och vatten för injektionsvätskor. Se avsnitt 2 ”Dexketoprofen Krka innehåller etanol och natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dexketoprofen Krka injektions-/infusionsvätska, lösning (injektion/infusion) är en klar, färglös lösning praktiskt taget fri från partiklar (pH: 7,0-8,0, osmolalitet: 270-328 mosmol/l).

Dexketoprofen Krka finns tillgänglig i kartonger med 1, 5 eller 10 ampuller med 2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast 22.9.2022

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dexketoprofen Krka 50 mg/2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

dexketoprofen

Intravenös användning:

Intravenös infusion: Innehållet i en ampull (2 ml) Dexketoprofen Krka ska spädas med 30 till 100 ml fysiologisk koksaltlösning, 5 % glukos eller Ringerlaktat-lösning. Den utspädda lösningen ska ges långsamt under 10–30 min som intravenös infusion. Lösningen ska alltid skyddas mot dagsljus.

Intravenös bolusdos: vid behov kan innehållet i en ampull (2 ml) Dexketoprofen Krka ges som en långsam intravenös bolusdos, under minst 15 sekunder.

Intratekal eller epidural administration av Dexketoprofen Krka är kontraindicerad p.g.a. dess etanolinnehåll.

Anvisningar för hantering av produkten:

När Dexketoprofen Krka administreras som intravenös bolusdos, ska lösningen injiceras direkt efter aspiration ur den färgade ampullen.

Inför intravenös infusion ska lösningen spädas aseptiskt och skyddas mot dagsljus. Endast klar och färglös lösning ska användas.

Kompatibilitet:

Dexketoprofen Krka har visat sig vara kompatibel vid blandning **i små volymer** (t ex i en spruta) med injektionsvätskor innehållande heparin, lidokain, morfin och teofyllin.

Utpädd enligt anvisning är lösningen klar och färglös. Dexketoprofen Krka utspädd **i 100 ml** koksalt- eller glukoslösning har visat sig vara kompatibel med följande läkemedel: dopamin, heparin, hydroxizin, lidokain, morfin, petidin och teofyllin. Ingen absorption av det aktiva innehållsämnet har setts när spädda lösningar av Dexketoprofen Krka injektionsvätska förvarats i påsar av plast eller doseringshjälpmaterial tillverkade av etylvinylacetat (EVA), cellulosapropionat (CP), lågdensitetspolyeten (LDPE) och polyvinylchlorid (PVC).