

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pyrvin 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

pyrviiniembonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännä lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Pyrvin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pyrviiniä
3. Miten Pyrvin-tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Pyrvin-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Pyrvin on ja mihin sitä käytetään

Pyrvin on kihomato lääke, joka tehoaa kihomatoihin jo kerta-annoksena. Hoidon uusiminen kahden viikon kuluttua hävittää ensimmäisen annoksen jälkeen munista kuoriutuneet madot. Muihin loismatoihin kuin kihomatoihin Pyrvin-tablettien vaikutus on heikko.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pyrvin-tabletteja

Älä ota Pyrvin-tabletteja

- jos olet allerginen pyrviiniembonaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää huolehtia hyvin käsien ja kynnenalustojen puhtaudesta ja muutoinkin hygieniasta.

Muut lääkevalmisteet ja Pyrvin

Pyrvin-tableteilla ei tunneta yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Pyrviini on todennäköisesti vaaratonta sikiölle ja imeväiselle. Pyrvin-tablettien käyttöä on kuitenkin varmuuden vuoksi suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pyrvin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3. Miten Pyrvin-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pyrvin-tabletit otetaan kerta-annoksena. Lääke annostellaan painon mukaan, 1 tabletti 10–15 kg kohti (ks. taulukko alla). Pyrvinin tehon ei ole todettu lisääntyvän 6 tablettia ylittävillä annoksilla.

Kaikki perheenjäsenet on syytä hoitaa samanaikaisesti. Hoito uusitaan kahden viikon kuluttua.

Paino	Kerta-annos
n. 10–15 kg	1 tabletti
n. 15–30 kg	2 tablettia
n. 30–45 kg	3 tablettia
n. 45–60 kg	4 tablettia
n. 60–70 kg	5 tablettia
Yli 70 kg	6 tablettia

Tabletit suositellaan nieltäväksi kokonaisuena riittävän nestemäärän (esim. lasillinen vettä) kanssa. Tablettien pilkkomista ei suositella, koska tabletit voivat pilkkottaessa värjätä esim. vaatteita. Pilkkominen on kuitenkin mahdollista, jos lääkkeen annostelu (esimerkiksi pienille lapsille) niin vaatii.

Jos otat enemmän Pyrvin-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Pyrvin-tablettien yliannostus aiheuttaa yleensä pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Ensiavuksi voi antaa lääkelihtä. Vaikeassa yliannostustapauksessa ota yhteys lääkäriin tai terveystieteiden keskukseen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pyrvin aiheuttaa harvoin haittavaikutuksia. Pahoinvointia, oksentelua tai suoliston kouristelua voi ilmetä. Yliherkkyys Pyrvin-tableteille on hyvin harvinaista.

Pyrvin värjää ulosteet punaisiksi. Vaatteista väri yleensä lähtee tavallisilla pesuaineilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Pyrvin-tablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Pidä tölkki ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pyrvin sisältää

- Vaikuttava aine on pyrviiniembonaatti, jota on 100 mg yhdessä tabletissa.
- Muut apuaineet ovat maissitärkkelys, liivate, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, hypromelloosi ja makrogoli 300.

Lääkevalmisteen kuvaus

Punainen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija noin 9 mm.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku
tai
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

13.12.2016

Bipacksedel: Information till användaren

Pyrvin 100 mg filmdragerade tabletter

pyrvinembonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande :

1. Vad Pyrvin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Pyrvin
3. Hur du tar Pyrvin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pyrvin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pyrvin är och vad det används för

Pyrvin är ett läkemedel mot springmask. Pyrvin är effektivt mot springmask redan som engångsdos. Då behandlingen upprepas efter två veckor förintas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Pyrvins effekt mot andra parasitmaskar än springmask är svag.

2. Vad du behöver veta innan du tar Pyrvin

Ta inte Pyrvin

- om du är allergisk mot pyrvinembonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.1).

Varningar och försiktighet

För att behandlingen skall lyckas är det viktigt att händerna hålls rena, också under naglarna, och att även i övrigt omsorgsfullt sköta hygien.

Andra läkemedel och Pyrvin

Man känner inte till att Pyrvin skulle ha några samverkningar med andra läkemedel.

Graviditet och amning

Pyrvin är sannolikt inte skadligt för fostret eller dibarnet. Det rekommenderas i alla fall, att användning av Pyrvin-tabletter ska för säkerhets skull undvikas under graviditeten.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pyrvin påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

3. Hur du tar Pyrvin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pyrvin-tabletterna tas som en engångsdos. Antalet beror på kroppsvikten, en tablett per 10–15 kg kroppsvikt (se tabellen nedan). Det har inte visats att effekten av Pyrvin skulle vara bättre vid en dos som överskrider 6 tabletter.

Det är skäl att behandla alla familjemedlemmar samtidigt. Behandlingen upprepas efter två veckor.

Vikt	Engångsdos
ca 10–15 kg	1 tablett
ca 15–30 kg	2 tabletter
ca 30–45 kg	3 tabletter
ca 45–60 kg	4 tabletter
ca 60–70 kg	5 tabletter
Över 70 kg	6 tabletter

Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Det rekommenderas att tabletterna inte delas, eftersom de då kan färga t.ex. kläderna. Det är dock möjligt att dela tablettens dosering (t.ex. för små barn) så kräver.

Om du har tagit för stor mängd av Pyrvin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdoserings av Pyrvin förorsakar i allmänhet illamående, kräkningar eller diarré. Som första hjälp kan medicinskt kol ges. Vid allvarliga fall av överdosering bör läkare eller hälsostation kontaktas.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Pyrvin förorsakar sällan biverkningar. Illamående, kräkningar eller kramper i tarmen kan förekomma. Allergi mot Pyrvin är mycket sällsynt.

Pyrvin färgar avföringen röd. Från kläderna lossnar färgen i allmänhet med vanligt tvättmedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

5. Hur Pyrvin ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C. Förvara burken i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är pyrvinembonat, varav det finns 100 mg i en tablett.
- Övriga hjälpämnen är majsstärkelse, gelatin, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos och makrogol 300.

Läkemedlets utseende

Röd, rund, konvex, filmdragerad tablett, diameter cirka 9 mm.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation
Orionvägen 1
02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma
Tengströmsgatan 8
20360 Åbo
eller
Orion Pharma
Orionvägen 1
02200 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast

13.12.2016