

## **Pakkausselostetexti: Tietoa käyttäjälle**

### **Vistaprep jauhe oraaliliuosta varten**

makrogoli 3350, natriumkloridi, natriumvetykarbonaatti ja kaliumkloridi

**Lue tämä pakkausselostetexti huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Ota tästä lääketä juuri siten kuin tässä pakkausselostetessä kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkienkilökunta on neuvonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselostetessä. Ks. kohta 4.

#### **Tässä pakkausselostetessa kerrotaan:**

1. Mitä Vistaprep on ja miihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Vistaprep-valmistetta
3. Miten Vistaprep-valmistetta otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Vistaprep-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Vistaprep on ja miihin sitä käytetään**

Vistaprep on valkoinen jauhe oraaliliuosta varten. Valmisteella on laksatiivinen vaikutus.

Vistaprep on tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille suolen tyhjennykseen ennen paksusuolen tähystystä (kolonoskopiaa).

Makrogoli 3350:tä, natriumkloridia, natriumvetykarbonaattia ja kaliumkloridia, joita Vistaprep sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselostetessä mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Vistaprep-valmisteita**

##### **Älä otta Vistaprep-valmisteita**

- jos olet allerginen makrogoli 3350:lle, natriumkloridille, natriumvetykarbonaatille, kaliumkloridille, sakkarüini:natriumille, appelsiiniaromille, sitruuna-limettiaromille, kolloidiselle vedettömälle piidioksidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on tai epäillään olevan suolitukos tai jos sinulla on ruoansulatuskanavan kurouma tai puhkeama tai ruoansulatuskanavan puhkeaman vaara
- jos sinulla on mahan tyhjenemisen häiriö tai vaikea paksusuolentulehdus ja sen yhteydessä esiintyvä paksusuolen laajentuma (toksinen megakoolon)
- jos sinulla on heikentynyt nielemis- ja yökkäämisrefleksi tai yleinen heikkous.

Vistaprep-valmisteita ei pidä antaa tajuttomille potilaille eikä potilaille, joiden tajunnantaso on alentunut tai potilaille, joilla on taipumusta vetää (aspiroida) nesteitä väärään kurkkuun.

## **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin kanssa

- jos olet iäkäs
- jos sinulla on refluksisairaus (närästys, ruokatorven refluksitulehdus)
- jos sinulla on rytmihäiriö (sinus-eteiskatkos tai sairas sinus -oireyhtymä)
- jos sydämesi pumppauskyky on heikentynyt (tila, josta käytetään nimitystä sydämen vajaatoiminta) ja jos sinulla on oireita kevyen tai kohtalaisten rasituksen aikana tai levossa
- jos munuaistesi tai maksasi toiminta on heikentynyt (munuaisten tai maksan vajaatoiminta)
- jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai maksasairaus
- jos elimistösi on vaikeasti kuivunut
- jos sinulla on vaikea paksusuolitulehdus, umpipussitulehdus tai krooninen tulehduksellinen suolistosairaus.

Näissä tapauksissa Vistaprep-valmistetta saa käyttää vain lääkärin valvonnassa, ja elektrolyyti- ja nestetasapainoa on seurattava.

Jos sinulle ilmaantuu äkillistä vatsakipua tai verenvuotoa peräsuolesta, kun olet ottanut Vistaprep-valmistetta suolen tyhjentämistä varten, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hakeudu välittömästi hoitoon.

Jos sinulle kehittyy haittavaikutuksia, kuten turvotusta, hengenahdistusta, väsymyksen tunnetta, elimistön kuivumistila (oireita ovat lisääntyvä jano, suun kuivuminen ja heikitus) tai sydänvaivoja, lopeta Vistaprep-valmisteen käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin.

## **Lapset**

Vistaprep-valmistetta ei pidä käyttää lapsille, koska käytöstä lasten hoidossa ei ole riittävästi tietoa.

## **Muut lääkevalmisteet ja Vistaprep**

Kerro lääkärille tai apteekkienkilokunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Jos otat muita lääkkeitä juuri ennen Vistaprep-valmistetta, samaan aikaan sen kanssa tai enintään 1 tunti sen jälkeen, ne voivat huuhtoutua pois suolistosta tai niiden vaikutus voi heikentyä. Jos muiden lääkkeiden otto on kuitenkin välttämätöntä, kysy lääkäriltä neuvoa hoitovaihtoehtoista. Tämä koskee myös ehkäisytabletteja.

Makrogoli 3350 saattaa vaikuttaa suistonesteistä tehtävien tutkimusten tuloksiin.

## **Vistaprep ruuan ja juoman kanssa**

Älä syö kiinteää ruokaa 2–3 tuntiin ennen Vistaprep-valmisteen ottamista äläkä sen jälkeen ennen kuin tutkimus on ohi.

Jos käytät nesteisiin sakeuttamisaineita, jotta voit niellä nesteen turvallisesti, Vistaprep-valmiste voi kumota niiden sakeuttavan vaikutuksen.

## **Raskaus, imetyks ja hedelmällisyys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kokemusta valmisten käytöstä raskauden aikana ei ole.

Jos olet raskaana, lääkäri arvioi huolellisesti valmisten hyödyt ja riskit ennen kuin käytät Vistaprep-valmistetta.

Vistaprep-valmistetta voi tarvittaessa ottaa imetyksen aikana.

## Ajamineen ja koneiden käyttö

Eriyisiä varotoimia ei tarvita.

### Vistaprep sisältää natriumia ja kaliumia

Tämä lääke sisältää kaliumia 20 mmol ja natriumia 260 mmol per 4 litraa Vistaprep-liuosta. Potilaiden, joilla on ruokavalion kalium- tai natriumrajoitus tai heikentynyt munaistoiminta, tulee ottaa tämä huomioon.

## 3. Miten Vistaprep-valmiste tetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

### Annostus aikuisille (yli 18-vuotiaille)

Suolen tyhjentämiseksi nautittava annos on 3 litraa tai enintään 4 litraa Vistaprep-liuosta. Yksi annospussi vastaa 1 litraa liuosta.

Juo 200–300 ml liuosta kerrallaan 10 minuutin välein, kunnes peräsuoesta poistuu vain kirkasta nestettä tai olet juonut liuosta enintään 4 litraa.

Juo liuos noin 4 tunnin aikana, yleensä tutkimuspäivänä. Voit juoda koko määrän edellisenä iltana tai osan liuksesta edellisenä iltana ja loput tutkimuspäivän aamuna. Sovi asiasta lääkärin kanssa.

### Käytön kesto

Vistaprep on tarkoitettu kertakäyttöön ennen sovittua suolistotutkimusta.

### Liuoksen valmistaminen

Valmista väritön ja hieman samea liuos juuri ennen käyttöä. Yhden annospussin sisältö liuotetaan yhteen litraan haaleaa vettä. Valmista 3–4 litraa liuosta tällä tavoin. Yksi Vistaprep-annospussi vastaa 1 litraa liuosta, joten 3–4 litran valmistamiseksi tarvitset 3–4 annospussia. Voit jäähyttää käyttövalmiin liuoksen jääläpissä, sillä liuos maistuu paremmalta kylmänä.

Vistaprep-oraaliliuokseen ei saa lisätä mitään muita liuoksia tai lisääineita (etenkään sokeria tai aromiaineita), jotka eivät ole yhteensopivia Vistaprep-oraaliliuoksen kanssa, koska tämä voi muuttaa veren elektrolyyttikoostumusta. Suolistossa voi myös syntyä räjähtäviä kaasuseoksia, kun suiston bakteerit hajottavat liuosta.

Jos Vistaprep-valmisteen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille.

### Jos otat enemmän Vistaprep-valmiste tta kuin sinun pitäisi

Vistaprep-valmiste on tarkoitettu aikaansaamaan ripulin tai vetisen uloseen. Kuitenkin jos olet ottanut liian paljon Vistaprep-valmistetta, se voi aiheuttaa vaikeita ripulioireita. Juo tällöin paljon nestettä ja kysy aina lääkäriltä neuvoa.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

### Jos unohdat ottaa Vistaprep-valmiste tta

Jos otat Vistaprep-liuosta selvästi suositeltua annosta vähemmän, saattaa olla, että suolistosi ei tyhjene kokonaan eikä tutkimusta siten voida tehdä suunnitellusti. Noudata sen vuoksi tarkasti lääkäriltä saamiasi annostusohjeita tai tämän pakkausselosten ohjeita.

## **Jos lopetat Vistaprep-valmisteen oton**

Jos lopetat Vistaprep-valmisten käytön liian aikaisin, suolistosi ei välttämättä tyhjene kokonaan eikä toimenpidettä siten voida tehdä suunnitellusti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

### **Merkittävät haittavaikutukset tai oireet, joita pitää tarkkailla, sekä miten haittavaikutusten ilmetessä pitää toimia:**

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita, mutta vaikeat allergiset reaktiot ovat hyvin harvinaisia. Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta Vistaprep-liuoksen juominen ja kerro oireista lääkärille mahdollisimman pian:

- allerginen ihottuma
- verenkiertohäiriö
- hengenahdistus
- hikoilu ja pahoinvointi.

### **Myös seuraavia haittavaikutuksia on havaittu:**

#### **Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)**

- pahoinvointi, täytyeden tunne ja ilmavaivat

#### **Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)**

- oksentelu, vatsakrampit ja peräaukon ärsytys

Nämä haittavaikutukset johtuvat lähinnä suurehkojen nestemäärien nopeasta juomisesta. Jos sinulla on ruoansulatuskanavaan kohdistuvia oireita, juo Vistaprep-valmistetta jonkin aikaa hitaammin tai pidä taukoaa, kunnes oireet häviävät.

#### **Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)**

- yleinen huonovointisuus ja unettomuus

#### **Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 00:sta)**

- epäsäännöllinen tai nopea sydämensyke (sydämen rytmihäiriöt, theälyöntisyys) ja nesteiden kertyminen keuhkoihin (keuhkopöhö)
- hermosto-oireet, jotka voivat vaihdella lievästä ajan ja paikan tajun heikkenemisestä yleistyneisiin kouristuskohtauihin (syynä on veren elektrolyyttitasapainon häiriö)
- nokkosihottuma, eritevuoto nenästä, nenän vuotaminen (nuha) tai äkillinen ihotulehdus, jotka ovat todennäköisesti allergisia, sekä anafylaktinen sokki

#### **Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)**

- muutos elimistön neste- tai elektrolyyttitasapainossa (kalsiumin, kaliumin ja natriumin vähyyks).

#### **Huomaa:**

Joissakin tapauksissa makrogolia sisältävien liosten nauttimisten jälkeen on ilmennyt oksentelua, jota on seurannut ruokatorven repeämästä aiheutuva verenvuoto (Mallory–Weissin oireyhtymä).

#### **Haittavaikutusta ilmoittamineen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
00034 FIMEA

## 5. Vistaprep-valmisten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä annospussissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärään Käyt. viim. jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

### Säilytysolosuhteet

Jauhe: ei erityisiä säilytysolosuhteita.

Käyttökuntaan saatettu liuos: säilytä alle 25 °C enintään 3 tuntia tai jäääkaapissa (2 °C–8 °C) enintään 48 tuntia.

Hävitä käyttämätön liuos 48 tunnin kuluessa.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### Mitä Vistaprep sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat (annospussia kohden):

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| makrogoli 3350         | 105,000 g |
| natriumkloridi         | 2,800 g   |
| natriumvetykarbonaatti | 1,430 g   |
| kaliumkloridi          | 0,370 g   |

1000 ml liuosta, jonka valmistamiseen on käytetty yksi annospussi valmistetta, sisältää elektrolyttejä seuraavasti:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| natrium         | 65 mmol/l |
| kloridi         | 53 mmol/l |
| vetykarbonaatti | 17 mmol/l |
| kalium          | 5 mmol/l  |

- Muut aineet ovat:  
sakkariininatrium, vedetön kolloidinen piidioksiidi, appelsiiniaromi (appelsiiniaromi sisältää aromivalmisteita, aromiaineita, luontaisia aromiaineita, maltodekstriiniä, arabikumia (E414), alfa-tokoferolia (E307)) ja sitruuna-limettiaromi (sitruuna-limettiaromi sisältää luontaisia aromivalmisteita, luontaisia aromiaineita, maltodekstriiniä, arabikumia (E414), sitruunahappoa (E330)).

## **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)**

Vistaprep on valkoinen jauhe oraaliliuosta varten.

Vistaprep jauhe oraaliliuosta varten on saatavana pakkauksissa, joissa on 4 tai 64 annospussia, ja monipakkauksissa, joissa on 12 x 4 annospussia.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

### **Myyntiluvan haltija**

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Str. 80

79618 Rheinfelden

Saksa

### **Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja**

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

SE-167 51 Bromma

Ruotsi

### **Valmistaja**

Klocke Pharma Service GmbH

Strassburger Str. 77

77767 Appenweier

Saksa

**Tämä pakkausseleoste on tarkistettu viimeksi 31.01.2024**

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Vistaprep pulver till oral lösning**

makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid

#### **Läs nog i genombipackse del innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

#### **I denna bipackse del finns information om följande :**

1. Vad Vistaprep är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Vistaprep
3. Hur du tar Vistaprep
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vistaprep ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Vistaprep är och vad det används för**

Vistaprep är ett vitt pulver till oral lösning. Läkemedlet har laxerande effekt.

Vistaprep är avsett till vuxna över 18 års ålder för att rengöra tarmen inför en tjocktarmundersökning (kolonoskopi).

Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid som finns i Vistaprep kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och fölж alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Vistaprep**

##### **Ta inte Vistaprep**

- om du är allergisk mot makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kaliumklorid, sackarinnatrium, apelsinsmakämne, citron- och limesmakämne eller vattenfri kolloidal kiseldioxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har tarmstopp eller misstänkt tarmstopp, förträningar eller perforationer i magtarmkanalen eller om du har risk för att få perforationer i magtarmkanalen.
- om du har problem med att tömma tarmen eller om du har en svår tjocktarminflammation och i samband med det förekommande onormalt utvidgad tjocktarm (toxisk megakolon).
- om du har försämrat förmåga att svälja och försvagad kräkningsreflex eller om du har ett allmänt svaghetsstillstånd.

Vistaprep ska inte ges till patienter med nedsatt medvetande eller till patienter som har risk för att svälja fel (aspirera) vid intag av vätska.

## **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare

- om du är äldre
- om du har refluxsjukdom (halsbränna, refluxesofagit)
- om du har rytmstörningar (sinus-atrial blockad eller "sick-sinus" syndrom)
- om ditt hjärtas pumpförmåga är försvagad s.k. hjärtsvikt och du får symtom vid medelsvår belastning eller vid vila
- om din njur- eller leverfunktion är försvagad (njursvikt eller leversvikt)
- om du har njursvikt eller leversjukdom
- om din kropp är allvarligt uttorkad (dehydrerad)
- om du har en svår tjocktarminflammation, blindtarmsinflammation eller kronisk inflammatorisk tarmsjukdom.

I dessa fall ska Vistaprep användas endast under en läkares övervakning, och elektrolyt- och vätskebalansen ska observeras.

Om du upplever plötslig buksmärta eller ändtarmsblödning medan du tar Vistaprep för tarmrengöring ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka sjukvård.

Om du får biverkningar såsom svullnad, andfåddhet, trötthetskänsla, uttorkning (symtom omfattar ökad törst, muntorrhet och svaghet) eller hjärtproblem ska du sluta ta Vistaprep och kontakta läkare omedelbart.

## **Barn**

Det saknas erfarenhet av användning till barn. Vistaprep ska därför inte användas till barn.

## **Andra läkemedel och Vistaprep**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du tar andra läkemedel precis innan, under eller upp till 1 timme efter att du tagit Vistaprep, finns det risk för att läkemedlen sköljs ut under tarmskölingen och inte hinner eller kanske inte hinner ha någon effekt. Om det är nödvändigt att du tar andra läkemedel ska du rådgöra med läkaren i förväg om alternativ medicinering. Detta gäller också preventivtablett(er) (p-piller).

Macrogol 3350 kan påverka testresultat på prover som tagits från tarmvätskan.

## **Vistaprep med mat och dryck**

Du ska inte äta fast föda under 2–3 timmar innan du ska ta Vistaprep och fram tills undersökningen är avslutad.

Om du behöver förtjocka vätskor för att kunna svälja dem säkert, kan Vistaprep motverka förtjockningsmedlets effekt.

## **Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Det saknas erfarenhet om användning under graviditet.

Om du är gravid, kommer läkaren att genomföra en fullständig risk-nytta bedömning innan du kan börja ta Vistaprep.

Vistaprep kan, vid behov, användas under amningstiden.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Inga särskilda försiktighetsåtgärder.

### **Vistaprep innehåller natrium och kalium**

Detta läkemedel innehåller 20 mmol kalium och 260 mmol natrium per 4 liter Vistaprep lösning. Detta bör beaktas av patienter med kalium- eller natriumfattig kost eller med försvagad njurfunktion.

### **3. Hur du tar Vistaprep**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

#### **Dosering för vuxna (över 18 års ålder)**

Rekommenderad dos för grundlig rengöring av tarmen är 3 eller högst 4 liter Vistaprep lösning. En dospåse motsvarar 1 liter färdig lösning.

Drick lösningen i 200-300 ml portioner med 10 minuters intervaller, tills du ser att avföringen är klar eller tills du har druckit högst 4 liter.

Drick lösningen under ungefär 4 timmar, vanligen på undersökningen. Du kan även dricka hela den nödvändiga mängden under kvällen före undersökningsdagen eller en del under kvällen och den återstående delen på morgonen samma dag som undersökningen ska utföras. Rådgör med läkaren om ett lämpligt förfaringssätt.

#### **Användning:**

Vistaprep är avsett för engångsanvändning före en planerad tarmundersökning.

#### **Beredning av lösningen:**

Bered den nästan färglösa och svagt grumliga lösningen precis före användning. Innehållet i en dospåse ska lösas upp i 1 liter ljummet vatten. Bered 3-4 liter lösning på detta sätt. Eftersom 1 dospåse Vistaprep motsvarar 1 liter lösning, behöver du 3-4 dospåsar för 3-4 liter färdig lösning. Du kan kyla ner den färdigberedda lösningen i kylskåpet. Nerkylt lösning är behagligare att dricka.

Tillsätt inga andra lösningar eller tillsatser (särskilt inte socker eller smakämnen) som inte är blandbara med Vistaprep i lösningen, eftersom detta bland annat kan leda till förändringar i blodets elektrolytsammansättning. Dessutom kan en explosiv gasblandning bildas i tarmkanalen när lösningen bryts ned av tarmbakterierna.

Rådfråga läkaren om du tycker att effekten av Vistaprep är för stark eller för svag.

#### **Om du har tagit för stor mängd av Vistaprep**

Målet med Vistaprep behandlingen är att åstadkomma diarré eller vattnig avföring. Om du har tagit en större mängd Vistaprep än du borde, kan svåra diarrésymtom uppstå.

Om så sker, ska du dricka mycket vätska och alltid kontakta läkare för att få råd.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

#### **Om du har glömt att ta Vistaprep**

Om du dricker för lite av den mängd lösning som har rekommenderats för dig, kan det hända att tarmen inte töms grundligt. I så fall kan undersökningen inte utföras som planerat. Följ därför den dosering som läkaren föreskrivit eller som rekommenderas i denna bipacksedel.

### **Om du slutar att ta Vistaprep**

Om du slutar ta Vistaprep eller avbryter behandlingen för tidigt, kan det hända att tarmen inte har tömts grundligt. I detta fall kan undersökningen inte utföras som planerat.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkning**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Betydande biverkningar eller symtom som du ska observera och vad du ska göra om sådana uppstår: Alla läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner. Svåra allergiska reaktioner är dock mycket sällsynta. Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta Vistaprep och kontakta läkaren så fort som möjligt.

- allergiskt hudutslag
- blodcirculationsrubbningar
- andnöd
- svettningsskov och illamående

Följande biverkningar har också observerats:

### **Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):**

- illamående, fyllnadskänsla och gasbildning

### **Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):**

- kräkningar, magkramper och irritation vid analöppningen.

Dessa symtom beror vanligen på intag av mycket stora mängder vätska under en kort tidsperiod. Om symtom uppstår i magtarmkanalen ska du temporärt dricka Vistaprep längsammare eller hålla en paus tills symtomen avklingar.

### **Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):**

- allmän sjukdomskänsla och sömnsvårigheter (insomnia).

### **Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):**

- oregehbunden eller snabb hjärtrytm (hjärtrytmstörningar, takykardi) och vätskeansamling i lungorna (lungödem).
- neurologiska symtom (till följd av rubbningar i elektrolytbalanzen i blodet) som kan omfatta allt från lindrig disorientation till generella krampfall.
- nässelutslag, utsöndring från näsan, rinnnsnuva eller plötslig hudinflammation som troligen är av allergisk natur, anafylaktisk chock.

### **Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):**

- Förändrad vätske- och elektrolytbalans i kroppen (läga nivåer av kalcium, kalium och natrium).

### **Observera:**

I vissa fall har det förekommit kräkningar, åtföljda av blödning p.g.a. bristningar i matstrupen (Mallory-Weiss syndrom) efter att personer druckit av tarmsköljningslösningar som innehållit makrogol.

### Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## 5. Hur Vistaprep ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

### Förvaringsanvisningar

Pulver: Inga särskilda anvisningar.

Färdigberedd lösning: Förvaras vid högst 25 °C i 3 timmar eller i kylskåp (2 °C-8 °C) i högst 48 timmar.

Kassera kvarbliven oral lösning som inte har använts inom 48 timmar.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är (per dospåse):

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| makrogol 3350       | 105,000 g |
| natriumklorid       | 2,800 g   |
| natriumvätekarbonat | 1,430 g   |
| kaliumklorid        | 0,370 g   |

Innehållet av elektrolytjoner per 1000 ml lösning, berett på 1 dospåse motsvarar:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| natrium             | 65 mmol/l |
| klorid              | 53 mmol/l |
| natriumvätekarbonat | 17 mmol/l |
| kalium              | 5 mmol/l  |

- Övriga innehållsämnen är:

sackarinnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, apelsinsmakämne (apelsinsmakämne innehåller arompreparat, aromämnen, naturliga aromämnen, maltodextrin, gummi arabicum (E414),  $\alpha$ -tokoferol (E307)) och citron- och limesmakämne (citron- och limesmakämne innehåller naturliga arompreparat, naturliga aromämnen, maltodextrin, gummi arabicum (E414), citronsyra (E330)).

## Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlet är ett vitt pulver till oral lösning.

Vistaprep pulver till oral lösning finns att få i förpackningar med 4 eller 64 dospåsar och i multipelförpackningar med 12 x 4 dospåsar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

**Innehavare av godkännande för försäljning**

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Str. 80

79618 Rheinfelden

Tyskland

**Lokal representant för innehavaren av godkännandet för försäljning**

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

SE-167 51 Bromma

Sverige

**Tillverkare**

Klocke Pharma Service GmbH

Strassburger Str. 77

77767 Appenweier

Tyskland

**Denna bipacksedel ändrades senast 31.01.2024**