

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Linezolid Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen linetsolidi**

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännny lääkärin, apteekkikenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin, apteekkikenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Linezolid Accord on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Linezolid Accord -tabletteja
3. Miten Linezolid Accord -tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Linezolid Accord -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Linezolid Accord on ja mihin sitä käytetään**

Linetsolidi, jota Linezolid Accord sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkikenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilailesta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Linezolid Accord on antibiootti, joka kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä oksatsolidinonit. Se vaikuttaa lopettamalla tietyjen infektioita aiheuttavien bakteerien (taudinaiteuttajien) kasvun. Linezolid Accord -tabletteja käytetään keuhkokuumeen ja joidenkin ihmisen ja ihonlaisten kudosten infektioiden hoitoon. Lääkärin arvion mukaan Linezolid Accord sopii infektiosi hoitoon.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Linezolid Accord -tabletteja**

**Älä otta Linezolid Accord -tabletteja:**

- jos olet allerginen linetsolidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos käytät tai olet kahden viime viikon aikana käyttänyt monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO:n estäjiksi) kutsuttuja lääkkeitä (esim. feneltsiimi, isokarboksatsidi, selegiliini, moklobemidi). Näitä lääkkeitä voidaan käyttää masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon
- jos imetät. Linetsolidi kulkeutuu äidinmaitoon ja voi vaikuttaa lapsen.

## **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Linezolid Accord -tabletteja.

Linezolid Accord ei ehkä sovi sinulle, jos vastaat **kyllä** johonkin seuraavista kysymyksistä. Keskustele tällöin lääkärin kanssa, koska hänen on tutkittava yleiskuntosi ja mitattava verenpaineesi ennen hoitoa ja sen aikana. Lääkäri voi myös päätää, että jokin toinen hoito on sinulle parempi.

Kysy lääkärltä, jos et ole varma, koskevatko seuraavat kysymykset omaa tilannettasi.

- Onko verenpaineesi kohonnut ja otatko sen vuoksi mahdollisesti lääkkeitä?
- Onko sinulla todettu kilpirauhasen liikatoimintaa?
- Onko sinulla lisämunuaisen kasvain (feokromosytooma) tai karsinoidioireyhtymä (tiettyjä hormoneja erittävä kasvain, jonka oireita ovat ripuli, ihmisen panoitus, hengityksen vinkuna)?
- Onko sinulla maaninen masennus, skitsoaffektiivinen häiriö, sekavuutta tai muita mielenterveyshäiriöitä?
- Onko sinulla aiemmin ollut hyponatremiaa (veren alhainen natriumpitoisuus) tai käytätkö lääkkeitä, jotka alentavat veren natriumpitoisuutta (diureetteja, joita kutsutaan myös nesteenpoistolääkkeiksi), kuten hydroklooritiatsidia?
- Käytätkö opioideja?

Tiettyjen lääkkeiden, kuten masennuslääkkeiden ja opioidien, käyttö yhdessä Linezolid Accordin kanssa voi johtaa mahdollisesti hengenvaaralliseen tilaan, serotoniiocioireyhtymään (ks. kohta 2 ”Muut lääkevalmisteet ja Linezolid Accord” ja kohta 4).

## **Ole erityisen varovainen Linezolid Accord -tablettien käytön suhteen**

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista, jos

- olet iäkäs
- saat helposti mustelia ja verenvuotoja
- olet aneeminen (punasolumääräsi on alhainen)
- sairastut helposti infektioihin
- sinulla on ollut aiemmin kouristuskohtauksia
- sinulla on maksa- tai munuaismuistoja, erityisesti jos saat dialysisihoitoa
- sinulla on ripulia.

Kerro lääkärille heti, jos sinulla ilmenee hoidon aikana

- näköhäiriötä, kuten näön hämärtymistä, värinäön muutoksia, näöntarkkuuden heikkenemistä tai näkökentän kaventumista
- käsivarsien tai jalkojen tunnottomuutta tai tunnet kihelmöintiä tai pistelyä käsivarsissa tai jaloissa ripulia. Sinulle voi ilmaantua ripulia antibioottien, mukaan lukien Linezolid Accord -tablettien käytön aikana tai sen jälkeen. Jos ripuli on vaikeaa tai pitkäkestoina tai ulosteessa on verta tai limaa, lopeta heti Linezolid Accord -tablettien käyttö ja ota yhteys lääkäriin. Älä käytä tällöin lääkkeitä, jotka estävät tai hidastavat suolen toimintaa.
- toistuvaa pahoinvointia tai oksentelua, vatsakipua tai tiheää hengitystä.
- sairaudentunnetta ja huonovointisuutta, johon liittyy lihasheikkoutta, päänsärkyä, sekavuutta ja muistin heikkenemistä, mikä voi viittata hyponatremiaan (alhainen veren natriumpitoisuus).

## **Muut lääkevalmisteet ja Linezolid Accord**

Linezolid Accord -tableteilla voi toisinaan olla yhteisvaikutuksia tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa, jolloin voi ilmetä sellaisia haittavaikutuksia kuin muutokset verenpaineessa, ruumiinlämmössä tai sydämensykkeessä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkeitä.

**Kerro lääkärille, jos käytät tai olet kahden viime viikon aikana käyttänyt** seuraavia lääkeitä, koska Linezolid Accord -tabletteja **ei saa** käyttää, jos jo käytät tai olet äskettäin käyttänyt näitä lääkeitä ks. myös edellä oleva kohta 2 ”Älä ota Linezolid Accord -tabletteja”)

- monoamiinioksidaasin estäjät (MAO:n estäjät, esim. feneltsiini, isokarboksatsidi, selegiliini, moklobemidi). Näitä lääkeitä voidaan käyttää masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon.

Kerro lääkärille myös, jos käytät jotakin seuraavista lääkeistä. Lääkäri voi silti määrättää sinulle Linezolid Accord -tabletteja, mutta tällöin hänen on tutkittava yleiskuntosi ja mitattava verenpaineesi ennen hoitosi aloittamista ja sen aikana. Joissakin tapauksissa lääkäri voi päättää, että jokin muu hoito on sinulle parempi.

- Tukkoisuutta vähentävät flunssalääkkeet, jotka sisältävät pseudoefedriiniä tai fenyylipropanoliimiinia.
- Astmalääkkeet, kuten salbutamoli, terbutaliini, fenoteroli.
- Tietty masennuslääkkeet, joita kutsutaan trisyklisiksi lääkkeiksi tai SSRI-lääkkeiksi (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät). Tällaisia lääkeitä on paljon, esim. amitriptyliini, sitalopraami, klomipramiini, dosulepiini, doksepiini, fluoksetiini, fluovoksamiini, imipramiini, lofepramiini, paroksetiini, sertraliini.
- Migreenilääkkeet, kuten sumatriptaani ja tsolmitriptaani.
- Lääkkeet, joita käytetään äkillisten, vaikeiden allergisten reaktioiden hoitoon, kuten adrenaliihi.
- Verenpainetta nostavat lääkkeet, kuten noradrenaliini, dopamiini ja dobutamiini.
- Opioidit, kuten petidiini, joita käytetään keskivaikean tai vaikean kivun hoitoon.
- Lääkkeet, joita käytetään ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon, kuten buspironi.
- Veren hyytymisen estävät lääkkeet, kuten varfariini.
- Antibiootti nimeltä rifampisiini

## **Linezolid Accord ruuan, juoman ja alkoholin kanssa**

- Voit ottaa Linezolid Accord -tabletin joko ennen ateriaa, aterian aikana tai sen jälkeen.
- Vältä syömästä suuria määriä kypsytettyä juustoa, hiivauitteita tai soijapapu-uutteita (kuten soijakastiketta) ja nauttimasta alkoholia (erityisesti olutta ja viiniä). Tämä johtuu siitä, että Linezolid Accord voi reagoida joissakin ruoka-aineissa luonnostaan olevan tyramiini-nimisen aineen kanssa, ja yhteisvaikutus voi nostaa verenpainetta.
- Jos sinulle kehittyy tykkyvä päänsärky syömisen tai juomisen jälkeen, ota heti yhteys lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

## **Raskaus, imetys ja hedelmällisyys**

Ei tiedetä, miten tämä lääke vaikuttaa raskaana oleviin naisiin. Siksi Linezolid Accord -tabletteja tulisi

käyttää raskausaikana vain lääkärin määräyksestä. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä imetä Linezolid Accord -hoidon aikana, koska lääke kulkeutuu äidinmaitoon ja voi vaikuttaa lapseen.

### Ajamineen ja koneiden käyttö

Linezolid Accord voi aiheuttaa heitehuimausta tai ongelmia näkökyvyn kanssa. Jos näin käy, älä aja äläkä käytä koneita. Muista, että jos voit huonosti, kykysi ajaa autoa tai käyttää koneita voi olla heikentynyt.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikuttuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastuksesesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Linezolid Accord -tabletti sisältää soijalesitiiniä. Jos olet allerginen sojalle, älä käytä tästä lääkettä.

### Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per 600 mg tabletti eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

## 3. Miten Linezolid Accord -tabletteja otetaan

### Aikuiset

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kerrottu tai lääkäri, apteekkienkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

- Suositeltu annos on yksi kalvopäällysteinen tabletti (600 mg linetsolidia) kahdesti vuorokaudessa (12 tunnin välein). Niele kalvopäällysteinen tabletti kokonaisen veden kanssa.

Jos saat munuaisten dialyysihoitoa, ota Linezolid Accord -annoksesi vasta dialyysihoitosi jälkeen.

Hoitokuuri kestää tavallisesti 10–14 päivää, mutta voi kestää jopa 28 päivää. Tämän lääkkeen turvallisuutta ja tehokkuutta yli 28 päivän hoidossa ei ole osoitettu. Lääkäri päättää hoitosi keston.

Lääkäri määrää sinulle Linezolid Accord -hoidon aikana säännöllisesti verikokeita verisolumäärien seuraamiseksi. Lääkäri tarkastaa näkökykysi, jos käytät Linezolid Accord -valmistetta yli 28 päivää.

### Käyttö lapsille ja nuorille

Linezolid Accord -tabletteja ei normaalisti käytetä lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hoitoon.

### Jos otat enemmän Linezolid Accord -tabletteja kuin sinun pitäisi

Kerro välittömästi lääkärille tai apteekkiin. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkystytietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

## **Jos unohtat ottaa Linezolid Accord -tabletti**

Ota unohtunut tabletti heti, kun muistat. Ota seuraava tabletti 12 tunnin kuluttua tästä ja jatka kalvopäällysteisten tabletteiden ottamista 12 tunnin välein. **Älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen kalvopäällysteisen tabletin.**

## **Jos lopetat Linezolid Accord -tablettien otton**

On tärkeää, että jatkat Linezolid Accord -tablettien ottamista, jollei lääkäri kehota sinua lopettamaan hoitoa.

Jos lopetat hoidon ja alkuperäiset oireesi palaavat, ota heti yhteys lääkärin tai apteekkiin. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkikenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

**Kerro heti lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkikenkilökunnalle**, jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista Linezolid Accord -hoidon aikana:

Linezolid Accordin vakavat haittavaikutukset ovat (esiintyvyys suluissa):

- vaikea ihoreaktio (melko harvinainen), turvotus, erityisesti kasvoissa ja kaulassa (melko harvinainen), hengityksen vinkuminen ja/tai hengenahdistus (harvinainen). Nämä voivat olla merkkejä allergisesta reaktiosta, ja Linezolid Accord -tablettien käyttö on ehkä lopetettava. Ihoreaktiot, kuten ihosta kohoava purppura, verisuonitulehdus aiheuttama ihottuma (harvinainen), ihmisen punoitus ja kosketusarkkuus sekä kesiminen (ihotulehdus) (melko harvinainen), ihottuma (yleinen), kutina (yleinen)
- näköhäiriöt (melko harvinainen), kuten näön hämärtyminen (melko harvinainen), värinäön muutokset (tuntematon), näöntarkkuuden heikkeneminen (tuntematon) tai näkökentän kaventuminen (harvinainen)
- vaikea verinen ja/tai limainen ripuli (antibioottihoitoon liittyvä paksusuolen tulehdus, mukaan lukien pseudomembranoottinen koliitti), joka voi harvinaisissa tapauksissa johtaa henkeä ulkaaviin komplikaatioihin (melko harvinainen)
- toistuva pahoinvointi tai oksentelu, vatsakipu tai tiheä hengitys (harvinainen)
- kouristuksia (melko harvinainen) on raportoitu Linezolid Accord-tabletteja käytettäessä
- serotonioireyhtymä (esiintymistilheys ei ole tiedossa): Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee kiihyneisyyttä, sekavuutta, deliriumia, jäykkyyttä, vapinaa, koordinaatiolahiriötä, kouristuksia, nopeaa sydämensykettä, vaikeita hengitysongelmia ja ripulia (viittaa serotonioireyhtymään) käyttäessäsi samanaikaisesti masennuslääkkeitä, joita kutsutaan selektiivisiksi serotoninin takaisinoton estäjiksi (SSRI), tai opioideja (katso kohta 2)
- selittämätön verenvuoto tai mustelointi, mikä voi johtua tiettyjen verisolujen määränpidosta, mikä voi vaikuttaa veren hyytymiseen tai aiheuttaa anemiaa (yleinen)
- tiettyjen verisolujen määrien muutokset, mikä voi heikentää elimistön kykyä puolustautua infektiolta (harvinainen), joiden oireet ovat mm: kuume (yleinen), kurkkukipu (melko harvinainen), suun haavauma (melko harvinainen) ja väsymys (melko harvinainen)

- haimatulehdus (melko harvinainen)
- kouristukset (melko harvinainen)
- ohimenevät aivoverenkiertohäiriöt (ns. TIA-kohtauksset, joissa hetkellinen aivoverenkiertohäiriö aiheuttaa lyhytkestoisia oireita, kuten näönmenetys, jalkojen ja käsienvoimattomuus, puheen puuroutuminen ja tajunnanmenetys) (melko harvinainen)
  - korvien soiminen (tinnitus) (melko harvinainen)

Yli 28 päivää Linezolid Accord -tabletteja saaneet potilaat ovat ilmoittaneet puutumista, kihelmöintiä tai näön hämäryymistä. Jos sinulle ilmenee näköhäiriötä, ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin.

### **Muita haittavaikutuksia ovat:**

**Yleiset** (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

- sieni-infektiot, erityisesti emättimessä tai suussa (sammas)
- päänsärky
- metallin maku suussa
- ripuli, pahoinvoindi tai oksentelu
- joidenkin verikokeiden tulosten muutokset, myös munuaisten tai maksan toimintaan vaikuttavat (kuten valkuaisaineiden, suolojen tai entsyyymiiden muutokset) tai verensokeritasoa mittaavat testit)
- univaikeudet
- kohonnut verenpaine
- anemia (alhainen punaverisolumäärä)
- heitehuimaus
- paikallistunut tai yleinen vatsakipu
- ummetus
- ruoansulatushäiriöt
- paikallistunut kipu
- verihiutaleiden vähenneminen

**Melko harvinaiset** (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

- emättimen tai sukupuolielinten alueen tulehdus naisilla
- erilaiset tuntemukset, kuten kihelmöinti tai puutuminen
- kielen turvotus, aristus tai värjäytyminen
- suun kuivuminen
- tihentynyt virtsaamistarve
- vilunväreet
- janontunne
- lisääntynythikoilu
- hyponatremia (natriumin alhainen pitoisuus veressä)
- munuaisten vajaatoiminta
- vatsan turvotus
- suurentunut kreatiniinipitoisuus
- vatsakipu
- muutokset sydämen lyöntitilheydessä (esim. sykkeen nopeutuminen).
- verisolujen vähenneminen
- voimattomuus ja/tai tunnon muutokset

**Harvinaiset** (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta):

- hampaiden pintojen värjäytymät, jotka hammaslääkäri voi poistaa.

**Seuraavia haittavaikutuksia on myös ilmoitettu** (tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- alopecia (hiustenlähtö)

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55  
00034 FIMEA

### **5. Linezolid Accord -tablettien säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakkaussessa tai läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

HDPE-purkki tulee käyttää 90 päivän kuluessa avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet ympäristöä.

### **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

#### **Mitä Linezolid Accord sisältää**

Vaikuttava aine on linetsolidi. Yksi tabletti sisältää 600 mg linetsolidia.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, hydroksipropyliselluloosa-L, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A) ja magnesiumstearaatti. Kalvpääällyste sisältää osittain hydrolysoitua polyvinylalkoholia, titaanidioksidia (E171), talkchia, lesitiiniä (sojaa) ja ksantaanikumia.

#### **Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoko (-koot)**

Linezolid Accord 600 mg kalvpääällysteiset tabletit ovat valkoisia tai melkein valkoisia, soikeita, kaksoiskuperia tabletteja, joiden toisella puolella on kohomerkintä "EQ1" ja jonka toinen puoli on kuvionton.

Tabletteja on saatavana koteloon pakatuissa alumiiini-alumiini-läpipainopakkauksissa tai HDPE-purkissa. HDPE-purkeissa on valkoinen läpinäkymätön, lapsiturvallinen polypropyleenikorkki (ja tiivistelevy) sekä kuivausaineekiekko.

Yksi alumiiini-alumiini-läpipainopakkaus sisältää 1, 10, 20, 30, 50, 60 tai 100 tablettia.

Yksi HDPE-purkki sisältää 10, 30 tai 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

**Myntiluvan haltija ja valmistaja**

**Myntiluvan haltija**

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht, Alankomaat

**Valmistaja**

Accord Healthcare B.V.,  
Winthontlaan 200,  
3526 KV Utrecht,  
Alankomaat

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,  
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Puola

**Tämä pakausse ostot on tarkistettu viimeksi 25.08.2023**

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Linezolid Accord 600 mg filmdrage rade tabletter linezolid**

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I den här bipackselet finns information om följande:**

1. Vad Linezolid Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Linezolid Accord
3. Hur du tar Linezolid Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Linezolid Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Linezolid Accord är och vad det används för**

Linezolid som finns i Linezolid Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Linezolid är ett antibiotikum i en grupp kallas oxazolidinoner som förhindrar tillväxten av vissa bakterier som orsakar infektioner. Det används för att behandla lunginflammation och vissa hud- och mjukdelinfektioner. Läkaren beslutar om Linezolid Accord är lämplig för att behandla din infektion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Linezolid Accord**

**Ta inte Linezolid Accord:**

- om du är allergisk mot linezolid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du tar eller om du under de senaste 2 veckorna har tagit något läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom
- om du ammar. Det beror på att linezolid går över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

#### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Linezolid Accord.

Linezolid Accord kanske inte är lämpligt för dig om du svarar **ja** på någon av frågorna nedan. Tala i detta fall om det för läkaren eftersom han/hon behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och ditt blodtryck före och under behandling, eller kan besluta att en annan behandling är lämpligare för dig. Fråga läkaren om du inte är säker på om nedanstående frågor gäller dig.

- Har du har högt blodtryck, oavsett om du tar något läkemedel för det?
- Hur du fått diagnosen överaktiv sköldkörtel?
- Har du en tumör på binjuren (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i hormonsystemet med symptom som diarré, hudrodnad, problem med väsande ljud vid andning)?
- Lider du av maniska depressioner, schizoaffektivt syndrom, (schizofreni med växlande sinnesstämning, förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?)
- Har du tidigare haft hyponatremi (låga natriumnivåer i blodet) eller tar du läkemedel som sänker natriumnivåerna i blodet, t.ex. vissa diureтика (som också kallas vätskedrivande läkemedel) såsom hydroklortiazid?
- Använder du opioider?

Användning av vissa läkemedel, inklusive antidepressiva läkemedel och opioider, tillsammans med Linezolid Accord kan leda till serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Linezolid Accord” och avsnitt 4).

### **Var särskilt försiktig med Linezolid Accord**

Tala om för din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel om du:

- är en äldre person
- lätt får blåmärken och börjar blöda
- har anemi (lägt antal röda blodkroppar)
- är känslig för infektioner
- tidigare har haft krampfall
- har leverproblem eller njurproblem, framför allt om du genomgår dialys
- har diarré.

Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av något av följande under behandling:

- problem med synen, t.ex. dimsyn, förändrat färgseende, nedsatt synskärpa eller begränsningar av synfältet
- minskad känslighet i armar eller ben, eller myrkrypningar eller stickningar i armar eller ben
- diarré. Du kan få diarré när du tar eller efter att du har tagit antibiotika, inklusive Linezolid Accord. Om diarrén blir allvarlig eller ihållande eller om du upptäcker att din avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart sluta ta Linezolid Accord och kontakta läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna upp eller förlängsamma tarmrörelser
- återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta (magsmärta) eller snabbandning.
- illamående och att inte må bra med muskelsvaghets, huvudvärk, förvirring och glömska. Det kan tyda på hyponatremi (låga natriumnivåer i blodet).

### **Andra läkemedel och Linezolid Accord**

Det finns en risk att Linezolid Accord ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar såsom förändringar av blodtryck, kroppstemperatur eller hjärtrytm.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

**Tala om för läkare om du tar eller eller under de senaste två veckorna** har tagit några av följande läkemedel eftersom Linezolid Accord inte får tas om du redan tar eller nyligen har tagit dessa läkemedel (se även avsnitt 2 ovan, ”Ta inte Linezolid Accord”)

- monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

Tala också om för läkare om du tar något av nedanstående läkemedel. Läkaren kan fortfarande besluta att ge dig Linezolid Accord, men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck före och under behandlingen. I annat fall kan läkaren besluta att en annan behandling är lämpligare för dig.

- avsvällande medel som används vid förkyllning och som innehåller pseudoefedrin eller fenylopropanolamin
- vissa läkemedel som används för att behandla astma, t.ex. salbutamol, terbutalin, fenoterol
- vissa antidepressiva läkemedel kända som tricykliska eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Det finns många sådana läkemedel, t.ex. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin och sertralini.
- läkemedel som används för att behandla migrän, t.ex. sumatriptan och zolmitriptan
- läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, t.ex. adrenalin
- läkemedel som höjer blodtrycket, t.ex. noradrenalin, dopamin och dobutamin
- opioider såsom petidin används för att behandla måttliga till kraftiga smärtstillstånd
- läkemedel som används för att behandla ångesttillstånd, t.ex. buspiron
- läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar, t.ex. warfarin.
- ett antibiotikum som kallas rifampicin

### **Linezolid Accord med mat, dryck och alkohol**

- Du kan ta Linezolid Accord antingen före, under eller efter en måltid.
- Undvik att äta stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (t.ex. sojasås) och undvik att dricka alkohol, framför allt fatöl och vin. Detta beror på att detta läkemedel kan reagera med en substans som heter tyramin som finns naturligt i vissa livsmedel och kan leda till förhöjt blodtryck.
- Informera omedelbart läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får dunkande huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

Effekten av detta läkemedel hos gravida kvinnor är okänd. Därför bör det inte användas under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte amma när du tar Linezolid Accord eftersom det går över i bröstmjölk och kan påverka barnet.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Linezolid Accord kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med synen. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra bil och använda maskiner påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Linezolid Accord inne håller sojale citin**

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot soja.

### **Linezolid Accord inne håller natrium**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 600 mg tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

## **3. Hur du tar Linezolid Accord**

### **Vuxna**

Använd alltid detta läkemedel enligt vad som står i denna bipacksedel eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

- Rekommenderad dos är en filmdragerad tablett (600 mg linezolid) två gånger dagligen (var 12:e timme). Svälj filmdragerade tabletten hel tillsammans med vatten.

Om du genomgår njurdialys ska du ta linezolid efter dialysbehandlingen.

Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar men kan vara upp till 28 dagar. Säkerhet och effekt för detta läkemedel har inte fastställts vid behandling längre än 28 dagar. Läkaren kommer att bestämma hur länge du ska få behandling.

Under tiden du tar Linezolid Accord ska läkaren regelbundet ta blodprover för att kontrollera din blodbild. Läkaren ska kontrollera din syn om du tar Linezolid Accord i mer än 28 dagar.

### **Användning för barn och ungdomar**

Linezolid Accord används normalt inte för att behandla barn och ungdomar (under 18 års ålder).

### **Om du har tagit för stor mängd av Linezolid Accord**

Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

### **Om du har glömt att ta Linezolid Accord**

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det. Ta den efterföljande tabletten 12 timmar efter detta och fortsätt sedan att ta filmdragerade tabletterna var 12:e timme. **Ta inte dubbeldos för att kompensera för glömd filmdrage rad tablett.**

### **Om du slutar att ta Linezolid Accord**

Det är viktigt att du fortsätter att ta linezolid, om inte läkaren uppmanat dig att avsluta behandlingen.

Tala omedelbart om för läkare eller apotekspersonal om du avbryter behandlingen och dina ursprungliga symtomen kommer tillbaka. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjukskötarska.

#### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

**Tala omedelbart om för din läkare, sjukskötarska eller apotekspersonal** om du upplever några av dessa biverkningar under behandlingen med Linezolid Accord:

De allvarligaste biverkningarna (med frekvens inom parentes) vid behandling med Linezolid Accord är:

- allvarliga hudreaktioner (mindre vanlig), svullnad framför allt i ansiktet och på halsen (mindre vanlig), pipande andning och/eller svårigheter att andas (sällsynt). Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen med Linezolid Accord. Hudreaktioner såsom ett upphöjt, lilafärgat utslag på grund av inflammation i blodkärlen (sällsynt), öm rodnad och fjällande hud (dermatit) (mindre vanlig), utslag (vanlig), kläda (vanlig).
- problem med synen (mindre vanlig), såsom dimsyn (mindre vanlig), förändrat färgseende (har rapporterats), svårigheter att se detaljer (har rapporterats) eller om du upplever att ditt synfält blir begränsat (sällsynt).
- allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inklusive pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer (mindre vanlig).
- återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller snabbare andning (sällsynt).
- krampfall (mindre vanligt) har rapporterats med Linezolid Accord
- serotonergt syndrom (har rapporterats): Du ska omedelbart kontakta din läkare om du upplever oro, konfusion, sinnesförvirring, stelhet, skakningar, svårigheter att koordinera dina rörelser, får krampfall, snabbare puls, allvarliga andningssvårigheter och diarré (tecken på serotonergt syndrom) om du samtidigt också tar antidepressiva läkemedel kända som SSRI eller opioider (se avsnitt 2).
- oförklarliga blödningar eller blåmärken som kan bero på förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka blodets förmåga att levras (koagulera) eller leda till blodbrist (anemi) (vanlig).
- förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka din förmåga att bekämpa infektioner (mindre vanlig). Tecken på infektion inkluderar feber (vanlig), halsont (mindre vanlig), munsår (mindre vanlig) och trötthet (mindre vanlig).
- inflammation i bukspottkörteln (mindre vanlig).
- krämper (mindre vanlig).
- transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket orsakar korta, övergående symtom såsom synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal samt medvetslöshet) (mindre vanlig).
- öronsusning (tinnitus) (mindre vanlig).

Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som har fått Linezolid Accord i mer än 28 dagar. Om du får problem med synen ska du kontakta läkare som snart som möjligt.

**Andra biverkningar innefattar:**

**Vanliga** (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- svampinfektioner, framför allt i slidan eller munhålan
- huvudvärk
- metallsmak i munnen
- diarré, illamående eller kräkningar
- förändringar av vissa blodprovsresultat, inklusive de som mäter proteinnivåer, salter eller enzymer, vilket visar din njur- Eller leverfunktion eller blodsockernivå
- sömnsvårigheter
- förhöjt blodtryck
- anemi (lågt antal röda blodkroppar)
- yrsel
- lokalisering eller allmän buksmärta (magsmärta)
- förstopning
- matsmältningsbesvär
- lokalisering smärta
- minskat antal blodplättar.

**Mindre vanliga** (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor
- känselförnimmelser såsom domningar och myrkrypningar
- svullen, öm eller missfärgad tunga
- muntorrhet
- behov att kissa oftare
- frossa
- ökad törst
- ökad svettning
- hyponatremi (läga halter av natrium i blodet)
- njursvikt (nedslatt njurfunktion)
- gaser i magen
- inflammation i huden
- förhöjt kreatinin
- magsmärta
- förändringar av hjärtrytmen (t.ex. snabbare hjärtrytm).
- minskat antal blodkroppar
- svaghet och/eller sensoriska förändringar

**Sällsynta** (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell borttagning).

**Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):**

- alopeci (hårvavfall)

**Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

webplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret  
PL 55  
00034 FIMEA

**Sverige**  
Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala  
Webbplats: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

## **5. Hur Linezolid Accord ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller burken efter Utg.dat., eller på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.

HDPE-flaska bör användas inom 90 dagar efter att den öppnats för första gången.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är linezolid. En tablett innehåller 600 mg linezolid
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, hydroxypropylcellulosa-L, natriumstärkelseglykolat (typ A) och magnesiumstearat. Filmdrageringen innehåller polyvinylalkohol, delvis hydrolyserad, titandioxid (E171), talk, lecitin (soja) och xantangummi.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Linezolid Accord 600 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter präglade med "EQ1" på ena sidan och släta på den andra sidan.

Tabletterna finns i Alu-Alu-blister förpackade i en kartong eller HDPE-flaska.  
HDPE-flaskor har en vit barnskyddande förslutning av polypropen (med vadd med induktionsförslutning) och torkmedel.

En kartong med Alu-Alu-blister innehåller 1, 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 tablettar.  
En HDPE-flaska innehåller 10, 30 eller 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

**Innehavare av godkännande för försäljning**

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht, Nederländerna

**Tillverkare**

Accord Healthcare B.V.,  
Winthontlaan 200,  
3526 KV Utrecht,  
Nederländerna

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,  
ul. Lutomierska 50, 95-200 Pabianice, Polen

**Denna bipack sedel godkändes senast 25.08.2023**