

PAKKAUSSELOSTE

WIDMER

WICARBA emulsiovoide

Koostumus:

1 g emulsiovoidetta sisältää:

Vaikuttavat aineet:

Retinolipalmitaatti vastaa A-vitamiinia	3000 I.U.
Dekspantenoli	10,0 mg
Karbamidi	120,0 mg

Apuaineet:

Dekyylioleaatti
Isopropyylimyristaatti
Propyleeniglykoli
1,3-butyleeniglykoli
Sorbitoli 70 % kiteytymätön
Dibutyylidipaatti
 α -tokoferoliasetaatti
Arlacel 582 (polyoksietylenei-(1)-glyseriinisorbitaani-isostearaatti)
Parafiini, kevyt nestemäinen
Lunacera P (parafiini, kiinteä)
Butyylihydroksianisoli (E320)
Butyylihydroksitolueeni (E321)
Atlas G2330 (polyoksietylenei-(30)-sorbitoli)
Magnesium sulfaatti
Sitruunahappomonohydraatti
Fenoksietanoli
Protegin WX (valkovaseliini, sorbitaaniseskvioleaatti, polyetyleenivaha, glyseridit)
Puhdistettu vesi

Farmakoterapeuttinen ryhmä:

Ihon liikasarveistumistilojen pehmentäminen.

Myyntiluvan haltija:

Louis Widmer GmbH, Rheinfeld, Saksa

Käyttötarkoitus:

WICARBA emulsiovoidetta käytetään ihon erityyppisten liikasarveistumistilojen hoitoon. Se pehmentää ihon kovettunutta sarveiskerrosta ja lisää ihon vedensitomiskykyä.

Vasta-aiheet käytölle:

Yliherkkyys jollekin WICARBA emulsiovoiteen aineosalle.

Varotoimenpiteet:

Valmisteen joutumista silmiin ja limakalvoille on vältettävä. WICARBA emulsiovoidetta käytettäessä on syytä huomata, että karbamidia sisältävät valmisteet saattavat lisätä muiden paikallisesti käytettävien yhdisteiden (esim. kortikoidien) imeytymistä ihon läpi.

Käyttöohje:

WICARBA emulsiovoidetta levitetään 1-2 kertaa päivässä vedellä puhdistetulle, kuivatulle iholle ja hierotaan huolellisesti ihoon. Sarveistumista voidaan ehkäistä käsittelemällä iho 2 kertaa viikossa tai tarpeen mukaan. Noudata pakkausselosteen tai lääkärin antamia ohjeita. Vain ulkoiseen käyttöön.

Sivuvaikutukset:

WICARBA emulsiovoiteen paikallinen käyttö saattaa aiheuttaa ihon lievää ärtymistä, sillä emulsiovoide sisältää karbamidia, butyylihydroksianisolia ja butyylihydroksitolueenia. Mikäli muita sivuvaikutuksia esiintyy, on syytä keskustella asiasta lääkärin kanssa.

Kestoaika ja säilyvyys:

Viimeinen käyttöpäivä on painettu pakkaukseen. Valmistetta ei tule käyttää pakkauksessa ilmoitetun ajankohdan jälkeen. Säilytä pakkaus huoneenlämmössä (+15 - 25 °C).

Ei lasten ulottuville.

Pakkausseloste tarkistettu 28.5.2000

BIPACKSEDEL

WIDMER

WICARBA kräm

Deklaration:

1 g kräm innehåller:

De verksamma ämnena:

Retinolpalmitat motsvarande A-vitamin	3000 I.U.
Dexpantenol	10,0 mg
Karbamid	120,0 mg

Hjälpsubstanserna

Decyloleat

Isopropylmyristat

Propylenglykol

1,3-butylenglykol

Sorbitol 70 % okristalliserad

Dibutyladipat

α -Tokoferolacetat

Arlacel 582 (polyoxyetylen(1)glyserinsorbitanisostearat)

Paraffinolja

Lunacera P (hård paraffin)

Butylhydroxanisol (E320)

Butylhydroxtoluen (E321)

Atlas G2330 (polyoxyetylen(30)sorbitol)

Magnesiumsulfat

Citronsyra monohydrat

Fenoxetanol

Protegin WX (vitt vaselin, sorbitanseskvioleat, polyetylen vax, glyserider)

Renat vatten

Farmakoterapeutisk grupp:

Uppmjukning av hudens förtjockade hornbildningar.

Innehavare av försäljningstillstånd:

Louis Widmer GmbH, Rheinfeld, Tyskland

Användningsändamål:

WICARBA kräm används för behandling av olika slag av förtjockade hornbildningar. Den mjukar upp hudens förtjockade hornbildningar och ökar hudens förmåga att binda vatten.

Kontraindikationer:

Känd överkänslighet för ingående substanser i WICARBA kräm.

Försiktighetsåtgärder:

Undvik beröring av preparatet med ögon och slemhinnor.

Vid användning av WICARBA kräm är det skäl att observera att preparat, som innehåller karbamid, kan underlätta absorptionen av andra ämnen (t. ex. kortikoider), som används vid lokalbehandling.

Dosering:

WICARBA kräm appliceras 1-2 gånger dagligen på torkad hud, som rengjorts med vatten, och gnids omsorgsfullt in i huden. För att förhindra hornbildning kan huden behandlas 2 gånger i veckan eller enligt behov.

Följ bipacksedelns dosering eller använd enligt läkares anvisning.

Endast utvärtes.

Biverkningar:

Lokal behandling med WICARBA kräm kan förorsaka lindrig hudirritation, eftersom krämen innehåller karbamid, butylhydroxanisol och butylhydroxtoluen. Om andra biverkningar uppkommer, är det skäl att kontakta läkare.

Hållbarhetstid och förvaring:

Den sista användningsdagen står tryckt på förpackningen.

Preparatet bör ej användas efter utgångsdatum angivet på förpackningen. Förpackningen bör förvaras i rumstemperatur (+15 - 25 °C).

Förvaras oåtkomligt för barn.

Bipacksedeln senast reviderades 28.5.2000