



## Hyperiforce Nova tabletti

### Tärkeää tietoa

#### Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Hyperiforce Novaa huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet pahenevat tai eivät lievene 6 viikon jälkeen.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

### Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Hyperiforce Nova on ja mihin sitä käytetään?
2. Ennen kun käytät Hyperiforce Novaa
3. Miten Hyperiforce Novaa käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Hyperiforce Novan säilyttäminen
6. Muuta tietoa

### 1. Mitä Hyperiforce Nova on ja mihin sitä käytetään?

Hyperiforce Nova on kasvirohdosvalmiste lyhytaikaiseen lievän masennustilan hoitoon.

### 2. Ennen kun käytät Hyperiforce Novaa

#### Älä käytä Hyperiforce Novaa jos:

- olet allerginen (yliherkkä) mäkikuismaalle tai jollekin valmisteen muulle aineelle, soijalle tai maapähkinälle
  - olet raskaana tai imetät
  - olet valoherkkä.
- Ole erityisen varovainen
- jos sinulla on heikentynyt maksan tai munuaisten toiminta. Keskustele lääkärisi kanssa ennen valmisteen käytön aloittamista.
  - olet menossa leikkaukseen.

#### Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö:

Kerro lääkärille tai apteekkienkilo-kunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Mäkikuisma voi alentaa samanaikaisesti käytettävien lääkeaineiden tehoa.

Mäkikuismaa ei suositella yhdessä seuraavien lääkevalmisteiden kanssa: immunosuppressantit (kuten siklosporiini, takrolimuusi, sirolimuusi), anti-HIV lääkkeet, jotka kuuluvat NNRTI-lääkkeisiin (esim. nevirapiini) ja proteaasintästäjiin (esim. indinaviiri), tietyt sytostaattiset lääkkeet (esim. imatinibi, irinotekaani), digoksiini ja kumariinityyppiset suu kautta otettavat antikoagulantit (esim. asenokumaroli, fenprokumaroli ja varfariini).

Seuraavia lääkkeitä tulee käyttää varoen, asiantuntijan valvonnassa: SSRI lääkkeet (esim. buspironi, amitriptyliini, nortriptyliini, sitalopraami, essitalopraami, fluoksetiini, paroksitiini, sertraliini), hypolipidimiset lääkkeet (esim. simvastatiini, midatsolaami ja steroidihormonit) ja metadoni.

Naisten, jotka käyttävät hormonaalisia ehkäisylääkkeitä, on syytä huolehtia lisäehkäisystä sillä mäkikuisma voi alentaa hormonaalisten ehkäisylääkkeiden tehoa.

#### Hyperiforce Novan käyttö ruuan ja juoman kanssa

Otetaan veden kera.

#### Raskaus ja imetyks

Ei suositella raskauden ja imetyksen aikana.

#### Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisteen vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita ei ole tutkittu.

#### Tärkeää tietoa Hyperiforce Novan sisältämistä aineista

Tuote sisältää soijaöljypolysakkaridia eikä sitä suositella potilaille jotka ovat allergisia maapähkinälle tai soijalle.

### 3. Miten Hyperiforce Novaa käytetään?

Aikuiset: 1 tabletti veden kera korkeintaan 3 kertaa päivässä. Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Vaikutuksen alkaminen on odotettavissa 4 viikon sisällä hoidon aloittamisesta. Jos oireet jatkuvat hoidon aikana, ota yhteys lääkäriin. Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

#### Jos otat enemmän Hyperiforce Novaa kuin sinun pitäisi

- Huomattavan suurien yliannosten jälkeen suojaa ihosi auringon valolta ja muulta UV-säteilyltä 1-2 viikon ajan. Epävarmoissa tapauksissa ota yhteyttä apteekkiin tai lääkäriin.

#### Jos unohdat ottaa Hyperiforce Novan

- Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kertaannoksen.

### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Hyperiforce Novakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.

Seuraavia lieviä oireita voi esiintyä:

- ruoansulatuskanava vaivat
- ihottuma

- väsymys ja hermostuneisuus

Jos saat näitä oireita, keskeytä käyttö. Jos oireet vaivaavat sinua keskustele lääkärin kanssa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

### 5. Hyperiforce Novan säilyttäminen

- Säilytä alle 25°C. Älä säilytä kylmässä
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville
- Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. .

### 6. Muuta tietoa

#### Mitä Hyperiforce Nova sisältää?

Vaikuttava aine on mäkikuisman (Hypericum perforatum L.), versoista valmistettu kuivauute (3,1-4,0:1) 40-73 mg (uuttoliuotin 68% V/V etanoli).

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, soijapolysakkaridi, hydrogenoitu puuvillansiemenöljy.

#### Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Hyperiforce Nova tabletti on ruskeahko, kaksoiskupera, viistoreunainen tabletti. Pakkauskoost 30 tablettia (35 ml), 60 tablettia (35 ml), 120 tablettia (60 ml).

Kaikkia pakkauskojoja ei välttämättä ole myynnissä.

#### Myyntiluvan haltija:

A.Vogel Oy, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava, 09-874 121

#### Valmistaja:

Bioforce AG, CH-9325, Roggwil, Sveitsi

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 12.1.2012



## Hyperiforce Nova tablett

### Viktig information

#### Läs noggrant denna bipacksedel, eftersom den innehåller viktig information.

Detta läkemedel är receptfritt. Läkemedlet måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotek eller läkare om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symptomen försämras eller inte lindras inom 6 veckor.
- Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel eller om biverkningarna är värre (se punkt 4), kontakta läkare eller apotek.

#### I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Hyperiforce Nova är och vad det används för
2. Innan du använder Hyperiforce Nova
3. Hur du använder Hyperiforce Nova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hyperiforce Nova ska förvaras
6. Övriga upplysningar

#### 1. Vad Hyperiforce Nova är och vad det används för

Hyperiforce Nova är ett växtbaserat läkemedel för kortvarig lindrig depression.

#### 2. Innan du använder Hyperiforce Nova

##### Använd inte Hyperiforce Nova om

- du är allergisk (överkänslig) mot johannesört, mot någon annan beståndsdel i preparatet eller mot soja eller jordnötter
  - du är gravid eller ammar
  - du är ljuskänslig.
- Var särskilt försiktig om
- du har nedsatt lever- eller njurfunktion. Diskutera med din läkare innan du börjar använda detta preparat.
  - du väntar på en operation

##### Användning av andra läkemedel:

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Johannesört kan minska läkemedels effekt om de tas samtidigt.

Användning av johannesört rekommenderas inte samtidigt med följande läkemedel: immunosuppressanter (såsom cyklosporin, tacrolimus, sirolimus), läkemedel för behandling av HIV tillhörande NNRTI-läkemedel (t.ex. nevirapin) samt proteasinhämmare såsom indinavir, vissa cytotostatläkemedel (imatinib, irinotecan), digoxin samt blodtunnande kumariner som intas oralt (t.ex. asenokumarol, fenprokumarol och varfarin).

Följande läkemedel bör användas försiktigt och under kontroll av en sakkunnig person: SSRI läkemedel (t.ex. buspiron, amitriptylin, nortriptylin, citalopram, escitalopram, fluoxetin, paroxitin, centralin), hypolipidemiska läkemedel (t.ex. simvastatin, midatsolam och steroidhormoner) samt metadon.

Kvinnor som använder hormonala preventivmedel har anledning att använda tilläggsprevention, eftersom johannesört kan minska effekten av de hormonala preventivmedlen.

#### Intag av Hyperiforce Nova med mat och dricka

Intas med vatten.

#### Graviditet och amning

Rekommenderas inte under graviditet och amning.

#### Körförmåga och användning av maskiner

Hyperiforce Nova s inverkan på körförmåga eller användning av maskiner har inte undersökts.

#### Viktig information om några innehållsämnen i Hyperiforce Nova

Preparatet innehåller polysackarid av sojaolja varför det inte rekommenderas för personer som är allergiska mot jordnötter eller soja.

#### 3. Hur använder du Hyperiforce Nova?

Vuxna: 1 tablett med vatten högst 3 gånger om dagen. Rekommenderas inte till barn eller ungdomar under 18 år.

Inverkan av Hyperiforce Nova kan väntas framträda inom 4 veckor sedan påbörjad användning. Kontakta läkare, ifall symptomen ändå fortsätter. Vänd dig till din läkare eller apotek om du har frågor beträffande användningen av detta läkemedel.

#### Om du har tagit för stor mängd av Hyperiforce Nova

- Efter en betydande överdosering ska du skydda dig mot solljus eller annan UV-strålning under 1-2 veckors tid.
- I osäkra fall kontakta apotek eller läkare.

#### Om du glömmet att ta Hyperiforce Nova

- Fördubbla inte dosen för att ersätta den bortglömda dosen.

#### 4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel, kan även Hyperiforce Nova förorsaka biverkningar. Alla behöver dock inte få dem.

Följande lindriga symptom kan förekomma:

- besvär i matsmältningskanalen
- hudutslag
- trötthet och nervositet.

Om sådana symptom förekommer, bör användningen avbrytas. Tala om symptomen för läkaren ifall de besvärar dig. Om biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta din läkare eller apotek.

#### 5. Hur Hyperiforce Nova ska förvaras

- Förvaras under 25°C. Förvara inte kallt.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Använd inte efter utgångsdatumet som anges på förpackningen..

#### 6. Övriga upplysningar

##### Vad innehåller Hyperiforce Nova?

Det verksamma ämnet är torrextrakt (3,1-4,0:1) 40-73 mg (extraheringsmedel 68% V/V etanol) som tillverkats av johannesörstens (*Hypericum perforatum L.*) skott. De övriga beståndsdelarna är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, sojapolysackarid och hydrogenerad olja av bomullsfrön.

##### Läkemedlets utseende, förpackningens innehåll

Hyperiforce Nova tablettarna är brunaktiga, bikonvexa och sneddade i kanten. Förpackningsstorlekarna 30 tablett (35 ml), 60 tablett (35 ml), 120 tablett (60 ml). Alla storlekar finns nödvändigtvis inte till salu.

##### Innehavare av försäljningstillstånd:

A.Vogel Oy, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kervo, p. 09-874 121

##### Tillverkare:

Bioforce AG, CH-9325, Roggwil, Schweiz

Bipacksedeln godkänd 12.1.2012