

Pakkausselostetiedot

**Lamotrin Orion 25 mg dispergoituvat tabletit
Lamotrin Orion 50 mg dispergoituvat tabletit
Lamotrin Orion 100 mg dispergoituvat tabletit
Lamotrin Orion 200 mg dispergoituvat tabletit**

lamotriini

Lue tämä pakkausselostetiedot huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännyn lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselostetiedossa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselostetiedossa kerrotaan:

1. Mitä Lamotrin Orion on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lamotrin Orion -tabletteja
3. Miten Lamotrin Orion -tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Lamotrin Orion -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lamotrin Orion on ja mihin sitä käytetään

Lamotrin Orion on epilepsialääke. Sitä käytetään kahden eri taudin – **epilepsian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön** – hoitoon.

Lamotrin Orion tehoaa epilepsiaan estämällä aivoissa signaaleja, jotka laukaisevat kouristuksia (kohtauksia).

- Aikuisille ja vähintään 13-vuotiaille lapsille Lamotrin Orion -valmistetta voidaan käyttää ainoana lääkkeenä tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa epilepsian hoitoon. Lamotrin Orion -valmistetta voidaan myös käyttää yhdessä muiden lääkkeiden kanssa estämään kouristuksia, joita on Lennox–Gastaut’n oireyhtymäksi kutsutussa sairaudessa.
- 2–12-vuotiaille lapsille Lamotrin Orion -valmistetta voidaan käyttää yhdessä muiden lääkkeiden kanssa yllämainittujen tilojen hoitoon. Sitä voidaan käyttää ainoana lääkkeenä tyypillisiksi poissalolohauksiksi kutsutussa epilepsian muodossa.

2. Mitä Lamotrin Orion tehoaa myös kaksisuuntaisen mielialahäiriöön

Henkilöillä, joilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö (jota kutsutaan myös maanisdepressiivisydeksi), on jyrkkiä mielialanvaihteluita: maniajaksoja (innostuneisuutta tai hyvänolontunnetta) ja depressiojaksoja (syvä surullisuutta tai epätoivoa). Lamotrin Orion -valmistetta voidaan käyttää aikuisille ja yli 18-vuotiaille ainoana lääkkeenä tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa estämään kaksisuuntaisen mielialahäiriön depressiovaiheita. Vielä ei tiedetä, miten Lamotrin Orion vaikuttaa aivoissa saadessaan aikaan tämän vaikutuksen.

2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Lamotrigin Orion -tabletteja

Älä käytä Lamotrigin Orion -tabletteja

- **jos olet allerginen (ylipherkkä)** lamotrigiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Jos tämä koskee sinua:

- **Kerro asiasta lääkärille** äläkä ota Lamotrigin Orion -valmistetta.

Varoituksset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen Lamotrigin Orion -valmisteen suhteeseen

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Lamotrigin Orion -tabletteja,

- **jos sinulla on munuaisvaivoja**
- **jos olet saanut ihottumaa**, kun olet ottanut lamotrigiinia tai muita lääkkeitä kaksisuuntaisen mielialahäiriön tai epilepsian hoitoon; tai jos sinulla ilmenee ihottuma tai auringonpolttama, kun olet ottanut lamotrigiinia ja altistunut auringonvalolle tai keinovalolle (esim. solariumissa). Lääkäri tarkistaa lääkityksesi, ja hän voi kehottaa sinua vältämään auringonvaloa tai suoautumaan auringolta (esimerkiksi käyttämällä aurinkosuojavaiteita ja/tai pukeutumaan suojavaatteisiin).
- **jos sinulle on aikaisemmin kehittynyt aivokalvontulehdus lamotrigiinin ottamisen jälkeen** (lue tämän oireista pakkausselosten kohdasta 4: *Harvinaiset haittavaikutukset*)
- **jos otat jo jotain lamotrigiinia sisältävää lääketettä**
- **jos sinulla on Brugandan oireyhtymäksi kutsuttu tila tai muita sydänongelmia.** Brugadan oireyhtymä on geneettinen sairaus, jonka yhteydessä sydämen sähköinen toiminta on poikkeavaa. Lamotrigiini voi laukaista EKG:n poikkeavuuksia, jotka voivat johtaa sydämen rytmihäiriöihin.

Jos jokin näistä koskee sinua:

- **Kerro asiasta lääkärille**, joka saattaa alentaa annosta tai todeta, että Lamotrigin Orion ei sovi sinulle.

Tärkeää tiedoa mahdollisesti hengenvaarallista reaktioista

Pieni osa Lamotrigin Orion -valmistetta saavista potilaista saa allergisen reaktion tai ihoreaktion, joka voi olla hengenvaarallinen ja joka voi kehittyä vakavammaksi, jos sitä ei hoideta. Sinun on tiedettävä Lamotrigin Orion hoidon aikana seurattavat oireet. Näitä ovat Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja yleisoireinen eosinofillinen oireyhtymä. Riski voi liittyä geenimuunokseen aasialaista (ensiäisesti han-kiinalaista tai thaimalaista) syntyperää olevilla henkilöillä. Jos olet tälläista syntyperää ja sinulla on aiemmin todettu kyseinen geenimuunnos (HLA-B*1502), keskustele lääkärin kanssa ennen Lamotrigin Orion -valmisteen ottamista.

- **Lue oireiden kuvaus tämän pakkausselosten kohdasta 4 ”Ihoreaktio, joka voi olla hengenvaarallinen: ota heti yhteys lääkäriin”.**

Hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi (HLH)

Lamotrigiinia käytäneillä potilailla on ilmoitettu harvinainen mutta hyvin vakavia immuunijärjestelmän reaktioita.

- **Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai apteekkiin**, jos sinulla on lamotrigiinihoidon aikana mitä tahansa seuraavista oireista: kuume, ihottuma, hermosto-oireet (esim. tärinä tai vapina, sekavuustila, aivotoiminnan häiriöt).

Itseltuhoiset ajatuksset tai itsemurha-ajatuksset

Epilepsialääkkeitä käytetään eri tautien hoitoon, mm. epilepsian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat henkilöt voivat joskus saada itseltuhoisia tai itsemurha-ajatuksia. Jos sinulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, nän voi käydä todennäköisemmin:

- kun aloitat hoidon

- jos sinulla on aikaisemmin ollut itsetuhoisia tai itsemurha-ajatuksia
- jos olet alle 25-vuotias.

Jos koet masentavia ajatuksia tai kokemuksia tai jos huomaat, että vointisi huononee tai saat uusia oireita Lamotrigin Orion -hoidon aikana:

➔ **Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian tai me ne lähimpään sairaalaan saadaksesi apua.**

Voi olla avuksi kertoa perheenjäsenelle, hoitajalle tai läheiselle ystävälle, että saatat kokea masennusta tai muita merkittäviä muutoksia mielialassa. Pyydä heitä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit myös pyytää heitä kertomaan sinulle, jos masennuksesi tai muut muutokset käytöksessäsi huolestuttavat heitä.

Pienellä määrällä henkilötä, jotka saavat epilepsialääkeitä, kuten Lamotrigin Orion -valmistetta, on myös ollut itsetuhoisia tai itsemurha-ajatuksia. Jos jossain vaiheessa koet tällaisia ajatuksia, ota heti yhteys lääkäriin.

Jos saat Lamotrigin Orion -tabletteja ja epilepsian hoitoon

Joidenkin epilepsiatyyppejä kohtaukset voivat pahentua tai niitä voi tulla useammin Lamotrigin Orion -hoidon aikana. Jotkut potilaat voivat saada vakavia kohtauksia, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveysriskejä. Jos saat kohtauksia useammin kuin ennen tai jos saat vakavia kouristuksia Lamotrigin Orion -hoidon aikana:

➔ **Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.**

Lapset ja nuoret

Lamotrigin Orion -tabletteja ei pidä antaa alle 18-vuotiaille kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Masennuksen ja muiden psykkisten sairauksien hoitoon käytetyt lääkkeet lisäävät lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten itsemurha-ajatuksien ja itsemurhakäyttäytymisen vaaraa.

Muut lääkevalmisteet ja Lamotrigin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskeettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkeitä, myös kasvirohdosvalmisteita ja ilman reseptiä myytäviä lääkeitä.

Lääkärin pitää tietää, jos otat muita epilepsia- tai mielialalääkeitä. Tieto on tärkeä, jotta Lamotrigin Orion -annoksesi määritetään oikein. Näitä lääkeitä ovat:

- **oxcarbamazepiini, felbamaatti, gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini, topiramaatti** tai **tsonisamidi**, joita käytetään epilepsian hoitoon
- **litium, olantsapiini tai aripipratsoli**, joita käytetään **mielialahäiriöiden** hoitoon
- **bupropioni**, jota käytetään **mielialahäiriöiden** hoitoon tai avuksi **tupakoinnin lopettamisessa**
- **parasetamoli**, jota käytetään **kivun ja kuumeen** hoitoon.

➔ **Kerro lääkärille**, jos saat jotain näistä lääkkeistä.

Joillakin lääkeillä on yhteisvaikutuksia Lamotrigin Orion -valmisteen kanssa tai ne voivat lisätä haittavaikutusten mahdollisuutta. Näitä lääkeitä ovat:

- **valproaatti**, jota käytetään **epilepsian ja mielialahäiriöiden** hoitoon
- **karbamatsapiini**, jota käytetään **epilepsian ja mielialahäiriöiden** hoitoon
- **fenytoini, primidoni** tai **fenoobarbitaali**, joita käytetään **epilepsian** hoitoon
- **risperidoni**, jota käytetään **mielialahäiriöiden** hoitoon
- **rifampisiini**, joka on **antibiootti**
- **HIV-infektion** hoitoon käytettävät lääkkeet (**lopinaviirin ja ritonaviirin** tai **atatsanaviirin ja ritonaviirin** yhdistelmä)
- **hormonaaliset ehkäisyvalmisteet**, kuten **ehkäisytabletit** (ks. alla).

➔ **Kerro lääkärille**, jos saat jotain näistä lääkkeistä tai jos lopetat tai aloitat jonkin näistä käytön.

Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet (kuten ehkäisytabletit) voivat vaikuttaa siihen, miten Lamotrinin Orion vaikuttaa

Lääkäri voi suositella, että käytät joitain tietyntyyppisiä hormonaalista ehkäisyvalmisteita tai joitain muuta ehkäisymenetelmää, esim. kondomia, pessaaria tai kierukkaa. Jos käytät hormonaalista ehkäisyä, kuten ehkäisytabletteja, lääkäri voi ottaa verikokeita tarkistaakseen veresi lamotrigiinipitoisuuden. Jos käytät hormonaalista ehkäisyä tai jos suunnittelet alkavasi käyttää sitä:

- ➔ **Keskustele lääkärin kanssa sinulle sopivista ehkäisymenetelmistä.**

Lamotrinin Orion voi myös vaikuttaa siihen, miten hormonaaliset ehkäisyvalmisteet toimivat, vaikkakin on epätodennäköistä, että se heikentää niiden tehoa. Jos käytät hormonaalista ehkäisyvalmisteita ja huomaat muutoksia kuukautiskierrossasi, kuten välivuotoja:

- ➔ **Kerro asiasta lääkärille.** Nämä voivat olla merkki siitä, että Lamotrinin Orion vaikuttaa ehkäisyvalmisteesi tehoon.

Raskaus ja imetyksessä

- ➔ **Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.**
- **Älä lopeta hoitoa keskustele matta asiasta lääkärin kanssa.** Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on epilepsia.
- Raskaus saattaa muuttaa Lamotrinin Orion -valmisten tehoa, joten voit tarvita verikokeita ja tarvittaessa Lamotrinin Orion -annostasi voidaan muuttaa.
- Synnynnäisten epämuidostumien riski, mukaan lukien huulihalkio tai kitalakihalkio, voi olla hieman lisääntynyt, jos Lamotrinin Orion -valmistetta otetaan raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.
- Lääkärisi voi neuvoa sinua ottamaan **foolihappolisää**, jos suunnittelet raskautta ja kun olet raskaana.
- ➔ **Jos imettät tai suunnittelet imettämistä, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.** Lamotrinin Orion -tablettien vaikuttava aine erittyy rintamaitoon ja voi vaikuttaa vauvaan. Lääkäri keskustlee kanssasi siitä, mitä riskejä ja hyötyjä lamotrigiinihoidon aikana imettämiseen liittyy. Jos päätät imettää, lääkäri seuraa ajoittain vauvaa vointia unelaisuuden, ihottuman ja heikon painonkehityksen varalta. Kerro lääkärille, jos huomaat vauvalla jonkin näistä oireista.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Lamotrinin Orion voi aiheuttaa huimausta ja kahtena näkemistä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkarenkilokunnan kanssa, jos olet epävarma.

Jos sinulla on epilepsia, keskustele lääkärisi kanssa auton ajamisesta ja koneiden käytöstä.

Lamotrinin Orion -tabletit sisältävät aspartaamia

Tämä lääke sisältää aspartaamia 1,88 mg (25 mg tabletti), 3,75 mg (50 mg tabletti), 7,5 mg (100 mg tabletti) ja 15 mg (200 mg tabletti). Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilölle, joilla on fenyylketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

3. Miten Lamotrin Orion -tabletteja otetaan

Ota tästä lääketötä juuri sitten kuin lääkäri on määränyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Lamotrin Orion -tabletteja tulee ottaa

Voi viedä jonkin aikaa ennen kuin löydetään paras Lamotrin Orion -annos juuri sinulle. Annos riippuu:

- iästäsi
- siitä, saatko muita lääkkeitä samanaikaisesti Lamotrin Orion -valmisteen kanssa
- siitä, onko sinulla munuais- tai maksavaivoja.

Lääkärisi määräää sinulle ensin pienen annoksen. Annosta nostetaan vähitellen muutaman viikon aikana, kunnes saavutat annoksen, joka tehoaa sinuun. **Älä koskaan ota enemmän Lamotrin Orion -tabletteja kuin lääkäri on määränyt.**

Tavallinen tehokas Lamotrin Orion -annos aikuisille ja yli 13-vuotiaille lapsille on 100 mg:n ja 400 mg:n välillä vuorokaudessa.

2–12-vuotiaiden lasten tehokas annos riippuu painosta, tavallisesti se on 1 mg–15 mg painokiloa kohden, ylläpitoannoksena enintään 200 mg vuorokaudessa.

Lamotrin Orion -valmistetta ei suositella alle 2-vuotiaille lapsille.

Miten Lamotrin Orion -annos otetaan

Ota Lamotrin Orion -annoksesi kerran tai kaksi kertaa päivässä sen mukaan kuin lääkäri on määränyt. Voit ottaa sen ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

- **Ota aina koko lääkärisi määräämää annos.** Älä koskaan ota vain osaa tabletista.

Lääkärisi voi myös kehottaa sinua aloittamaan tai lopettamaan joidenkin muiden lääkkeiden käytön, riippuen siitä, mihin tautiin saat Lamotrin Orion -tabletteja tai miten hoito vaikuttaa sinuun.

Lamotrin Orion dispergoituvat tabletit voidaan ottaa nielemällä ne kokonaisenä pienen vesimäärän kanssa, pureskelemalla ne tai liuottamalla ne veteen. Älä koskaan juo vain osaa nesteestä.

Jos pureskelet tabletin:

Sinun voi olla tarpeen juoda vähän vettä samalla, jotta tabletti liukenee suussasi. Juo tämän jälkeen vielä vähän vettä varmistaaksesi, että olet niellyt koko lääkemäärän.

Nän tee lääkeestä nestemäisen:

- laita tabletti lasiin, jossa on vähintään niin paljon vettä, että koko tabletti peittyy
- sekoita liuottaaksesi tabletin tai odota, kunnes tabletti on kokonaan liuennut
- juo koko nestemäärä
- lisää lasiin vielä vähän vettä ja juo sekin varmistaaksesi, että lasiin ei jää lääkettä.

Jos otat enemmän Lamotrin Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

➔ **Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääketötä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkyystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.** Jos mahdollista näytä heille Lamotrin Orion -paketia.

Jos otat liikaa Lamotrin Orion -valmiste tta, voit saada todennäköisemmin vakavia haittavaikutuksia, jotka voivat olla kuolemaan johtavia.

Henkilö, joka on ottanut liikaa Lamotrin Orion -valmistetta, voi saada seuraavia oireita:

- nopeita hallitsemattomia silmän liikkeitä (nystagmus)
- kömpelyyttä tai koordinaatiokyvyn puutetta, joka vaikuttaa tasapainoaistiiin (ataksia)
- sydänrytmien muutoksia (havaitaan tavallisesti EKG-tutkimuksessa)
- tajuttomuus, kouristuskohtaukset tai syvä tajuttomuus.

Jos unohdat ottaa kerta-annoksen Lamotrin Orion –valmiste tta

→ Älä ota ylimääräisiä tabletteja korvatakseen unohtamasi kerta-annoksen. Ota vain seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Jos unohdat ottaa useita Lamotrin Orion -annoksia

→ Kysy lääkäriltä ohjeita, miten aloittaa hoito uudestaan. On tärkeää, että teet näin.

Jos lopetat Lamotrin Orion -tablettien oton

Älä lopeta Lamotrin Orion -tablettien ottoa ilman lääkärin ohjetta.

Lamotrin Orion -tabletteja on otettava niin kauan kuin lääkäri määrää. Älä lopeta niiden käyttöä ellei lääkärisi neuvoo sinua tekemään niin.

Jos otat Lamotrin Orion -tabletteja epilepsian hoitoon

Kun Lamotrin Orion -hoito lopetetaan, on tärkeää, että annosta pienentää vähitellen, noin kahden viikon aikana. Jos lopetat Lamotrin Orion -tablettien ottamisen äkillisesti, voit saada epilepsiakohtauksia tai kohtaukset voivat pahentua.

Jos otat Lamotrin Orion -tabletteja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon

Voi viedä jonkin aikaa ennen kuin Lamotrin Orion tehoa, joten et todennäköisesti voi heti hoidon aloituksen jälkeen paremmin. Jos lopetat Lamotrin Orion -tablettien käytön, annostasi ei tarvitse pienentää vähitellen. Keskustele kuitenkin ensin lääkärisi kanssa, jos haluat lopettaa Lamotrin Orion -tablettien käytön.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ihoreaktio, joka voi olla hengenvaarallinen: ota heti yhteys lääkäriin.

Pieni osa lamotrigiinia saavista potilaista saa allergisen reaktion tai ihoreaktion, joka voi olla hengenvaarallinen. Nämä voivat kehittyä vakavammiksi, jos niitä ei hoideta.

Näitä oireita tulee todennäköisemmin ensimmäisten Lamotrin Orion -hoitokuukausien aikana, erityisesti, jos aloitusannos on liian suuri tai annosta nostetaan liian nopeasti tai jos Lamotrin Orion -tabletteja otetaan toisen, valproaatti-nimisen lääkkeen kanssa. Jotkut oireista ovat tavallisempia lapsilla, joten vanhempien on syytä seurata näitä erityisen huolella.

Tällaisten reaktioiden oireita ovat:

- **ihottumat tai ihmisen punaisuus**, jotka voivat kehittyä hengenvaarallisiksi ihoreaktioiksi, esim. laaja-alaiseksi ihottumaksi, jossa on rakkaja ja ihmisen kuoriutumista, erityisesti suun ympärillä, nenässä, silmissä ja sukupuolielimissä (Stevens–Johnsonin oireyhtymä), ihmisen kuoriutumiseksi laajoilta alueilta (yli 30 % kehon pinta-alasta; toksinen epidermaalinen nekrolyysi) tai laajalle levinnyt ihottuma, johon liittyy muutoksia maksassa, muissa sisäelimissä ja veressä (yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä eli ns. DRESS-hypersensitiviteettisyndrooma)
- **haavaumat suussa, kurkussa, nenässä tai sukupuolielimissä**

- **suun kirvelyt tai punaiset tai turvonneet silmät** (sidekalvotulehdus)
- **korkeat kuumeet**, nuhakuumetta muistuttavat oireet tai väsymys
- **kasvojen turpoaminen tai rauhasten turpoaminen** niskassa, kainaloissa tai nivusissa
- **odottamaton verenvuoto tai odottamattomat mustetelmat** tai sormien sinistyminen
- **kurkkukipu** tai tavallista enemmän tulehduksia (kuten nuhakuumeita)
- maksa-arvojen suureneminen verikokeissa
- erään valkosolutyypin (eosinofilit) määärän lisääntyminen
- imusolmukkeiden suureneminen
- sisälinten, kuten maksan ja munuaisten toiminnan muutokset.

Monissa tapauksissa nämä oireet ovat merkki vähemmän vakavista haittavaikutuksista. **Mutta sinun tulee tiedostaa, että ne voivat olla hengenvaarallisia ja voivat kehittyä vakavammiksi ongelmiksi, kuten elinten toiminnan pettämisen, jos niitä ei hoide ta.** Jos huomaat tällaisia oireita:

- ➔ **Ota välittömästi yhteys lääkäriin.** Lääkärisi voi päättää otattaa maksan, munuaisten tai veresi tilaa selvittäviä tutkimuksia ja voi neuvoa sinua lopettamaan Lamotrigin Orion -tablettien käytön. Jos sinulle on kehittynyt Stevens–Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi, lääkäri kertoo sinulle, että et saa enää koskaan käyttää lamotrigiinia.

Hemofagosyttinen lymfohisiosytoosi (HLH) (ks. kohta 2: Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lamotrigin Orion -tabletteja)

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

- päänsärky
- ihottuma.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

- vihamielisyys tai ärttyvyys
- väsymys tai uneliaisuus
- pyörrytys
- tärinä tai vapina
- univaikeudet (unettomuus)
- kiihyneisyys
- ripuli
- suun kuivuminen
- pahoinvoiointi tai oksentelu
- väsymyksen tunne
- selän, nivelten tai muu kipu.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- kömpelyys ja koordinaation puute
- kahtena näkeminen tai näön hämärtyminen
- epätavallinen hiustenlähtö
- ihottuma tai auringonpolttama auringonvalolle tai keinovalolle altistumisen jälkeen (valoherkkyyys).

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- hengenvaarallinen ihoreaktio (*Stevens–Johnsonin oireyhtymä; ks. myös kohdan 4 alussa oleva tieto*)
- oireryhmä, johon kuuluu kuume, pahoinvoiointi, oksentelu, päänsärky, niskajäykkyys ja voimakas herkkyyys kirkkaalle valolle. Tämä voi johtua aivoja ja selkäydintä suojaavien kalvojen tulehduksesta (*meningiitti*). Nämä oireet menevät yleensä ohi, kun hoito lopetetaan. Jos oireet kuitenkin jatkuvat tai pahenevat, **ota yhteys lääkäriin.**
- silmän nopeat hallitsemattomat liikkeet (*nystagmus*)

- kutisevat, vuotavat silmät ja karheat silmäluomet (*konjunktiviitti eli sidekalvontulehdus*).

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

- hengenvaarallinen ihoreaktio (*toksinen epidermaalinen nekrolyysi; ks. myös kohdan 4 alussa oleva tieto*)
- yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (*ks. myös kohdan 4 alussa oleva tieto*)
- korkea kuume (ks. myös kohdan 4 alussa oleva tieto)
- kasvojen turpoaminen (*edeema*) tai niskan, kainaloiden tai nivosten rauhasten turpoaminen (*lymfadenopatia; ks. myös kohdan 4 alussa oleva tieto*)
- maksan toiminnan muutokset, jotka näkyvät verikokeissa, tai maksan toiminnan pettäminen (*ks. myös kohdan 4 alussa oleva tieto*)
- vakava veren hyytyksen häiriö, joka voi aiheuttaa odottamattomia verenvuotoja tai mustelmia (DIC; *ks. myös kohdan 4 alussa oleva tieto*)
- hemofagosyttinen lymfohistiosytoosi (HLH) (ks. kohta 2 ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lamotrigin Orion -tabletteja”)
- muutokset, joita voidaan nähdä verikokeissa, mm. punaisten verisolujen määärän pieneneminen (*anemia*), veren valkosolujen määärän pieneneminen (*leukopenia, neutropenia, agranulosytoosi*), verihiualeiden määärän pieneneminen (*trombosytopenia*), kaikkien näiden solulajien määärän pieneneminen (*pansytopenia*) ja luuytimen häiriö, jota kutsutaan *aplastiseksi anemiaksi*
- hallusinaatiot (näkö- tai kuuloharhat)
- sekavuus
- epävakaa olo liikuessa
- hallitsemattomat toistuvat kehon liikkeet ja/tai äänänhädykset tai sanat, hallitsemattomat lihassupistukset silmissä, päässä ja kehossa tai muut poikkeavat kehon liikkeet, kuten nykimiset, tärinä tai jäykkyys
- henkilöillä, joilla on epilepsia, voi olla kouristuksia useammin
- henkilöillä, joilla on Parkinsonin tauti, oireet voivat pahentua
- ”lupuksen kaltaiset” reaktiot (oireita ovat mm. selkä- tai niveliipu, johon joskus liittyy kuume ja/tai yleinen sairaudentunne).

Esiintymistilheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- luustomuutoksia, kuten osteopeniaa ja -porosia (luun heikentymistä) sekä murtumia, on raportoitu tämän lääkkeen käytön yhteydessä. Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos käytät pitkääikaista epilepsialääkitystä tai steroideja tai sinulla on todettu osteoporosi.
- munuaistulehdus (tubulointerstitiaalinen nefriitti), mikä voi esiintyä silmätulehduksen yhteydessä (uveitti)
- painajaiset
- immuunipuolustuksen heikkeneminen, koska infektioilta suojaavia immunoglobuliinvasta-aineita on veressä tavallista vähemmän
- punaiset kyhmyt tai läiskät ihossa (pseudolymfooma).

Haittavaikutuksista ilmoittamineen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

5. Lamotrinin Orion -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärään jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lamotrinin Orion ei vaadi eirtysiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lamotrinin Orion dispergoituvat tabletit sisältävät

- Vaikuttava aine on lamotrigiini. Yksi dispergoituva tabletti sisältää 25 mg, 50 mg, 100 mg tai 200 mg lamotrigiinia.
- Muut aineet ovat krospovidoni, povidoni K-30, mannitoli (E421), silikonoitu mikrokiteinen selluloosa, aspartaami (E951), kroskarmelloosinatrium, mustaherukka-aromi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lamotrinin Orion 25 mg dispergoituva tabletti on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen ja viistoreunainen tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä, halkaisija n. 5,5 mm.

Lamotrinin Orion 50 mg dispergoituva tabletti on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen ja viistoreunainen tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä, halkaisija n. 7 mm.

Lamotrinin Orion 100 mg dispergoituva tabletti on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen ja viistoreunainen tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä, halkaisija n. 8,5 mm.

Lamotrinin Orion 200 mg dispergoituva tabletti on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen ja viistoreunainen tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä, halkaisija n. 12 mm.

Lamotrinin Orion 25 mg ja 50 mg: 30 tai 50 tablettia/pakkaus.

Lamotrinin Orion 100 mg: 30, 50 tai 100 tablettia/pakkaus.

Lamotrinin Orion 200 mg: 50 tai 100 tablettia/pakkaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
24100 Salo

Tämä pakkausseleoste on tarkistettu viimeksi 1.11.2023

Bipacksedel: Information till användaren

**Lamotrin Orion 25 mg dispergerbara tabletter
Lamotrin Orion 50 mg dispergerbara tabletter
Lamotrin Orion 100 mg dispergerbara tabletter
Lamotrin Orion 200 mg dispergerbara tabletter**

lamotrin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Lamotrin Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lamotrin Orion
3. Hur du tar Lamotrin Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lamotrin Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lamotrin Orion är och vad det används för

Lamotrin Orion hör till en läkemedelsgrupp som kallas *antiepileptika*. Det används för att behandla två tillstånd – **epilepsi** och **bipolär sjukdom**.

Lamotrin Orion behandlar epilepsi genom att blockera de signaler i hjärnan som utlöser epileptiska anfall (attacker).

- För vuxna och barn från 13 år och uppåt kan Lamotrin Orion användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla epilepsi. Lamotrin Orion kan också användas med andra läkemedel för att behandla de anfall som förekommer vid ett tillstånd som kallas för Lennox-Gastaut syndrom.
- För barn i åldrarna mellan 2 och 12 år kan Lamotrin Orion användas tillsammans med andra mediciner för att behandla dessa tillstånd. Det kan användas som enda behandling för att behandla en typ av epilepsi som kallas för typiska absenser.

Lamotrin Orion behandlar också bipolär sjukdom

Personer med bipolär sjukdom (kallas ibland för *manisk depression*) får mycket kraftiga humörsvägningar med perioder av mani (upphetsning eller lyckorus) omväxlande med depressionsperioder (djup sorgsenhet eller förtvivlan). För vuxna från 18 år och uppåt kan Lamotrin Orion användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att förhindra de depressionsperioder som förekommer vid bipolär sjukdom. Det är ännu inte känt hur Lamotrin Orion fungerar i hjärnan för att ha denna effekt.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lamotrin Orion

Ta inte Lamotrin Orion:

- **om du är allergisk** (*överkänslig*) mot lamotrin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om detta gäller dig:

- **Tala om det för läkaren** och ta inte Lamotrin Orion.

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Lamotrin Orion

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lamotrin Orion:

- **om du har problem med njurarna**
- **om du någon gång har utvecklat hudutslag** när du har tagit lamotrin eller andra läkemedel mot bipolär sjukdom eller epilepsi, eller om du får hudutslag eller blir bränd när du tagit lamotrin och har vistats i solen eller konstgjort ljus (t.ex. solarium). Läkaren kommer att kontrollera din behandling och rekommenderar dig kanske att undvika solljus eller att skydda huden mot solstrålarna (t.ex. med solskyddsmedel och/eller skyddande klädsel).
- **om du någon gång har utvecklat hjärnhinneinflammation (meningitis) när du har tagit lamotrin** (*läs om symtomen under avsnitt 4 av denna bipacksedel: Sällsynta biverkningar*)
- **om du redan tar medicin som innehåller lamotrin**
- **om du har ett tillstånd som kallas Brugadas syndrom eller andra hjärtproblem.**
Brugadas syndrom är en genetisk sjukdom som leder till onormal elektrisk aktivitet i hjärtat. EKG-avvikelse som kan leda till arytmier (onormal hjärtrytm) kan utlösas av lamotrin.

Om något av detta gäller dig:

- **Tala om det för läkaren** som kan bestämma att dosen behöver sänkas eller att Lamotrin Orion inte är lämpligt för dig.

Viktig information om eventuellt livshotande reaktioner

Ett litet antal personer som tar Lamotrin Orion får en allergisk reaktion eller hudreaktion, som kan vara livshotande och utväcklas till allvarligare problem, om de inte behandlas. Detta kan inkludera Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys samt läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom. Du behöver känna till de symtom som du skall vara uppmärksam på under tiden du tar Lamotrin Orion. Denna risk kan vara förknippad med en variant av gener hos personer med asiatiskt ursprung (främst hankineser och thailändare). Om du har detta ursprung och tester tidigare visat att du har denna genetiska variant (HLA-B*1502), diskutera detta med din läkare innan du tar Lamotrin Orion.

- **Läs beskrivningen av dessa symtom under avsnitt 4 i denna bipacksedel under "Eventuell livshotande hudreaktion: kontakta omedelbart läkare".**

Hemofagocytterande syndrom (HLH)

Rapporter har inkommit om en sällsynt men mycket allvarlig reaktion i immunsystemet hos patienter som tar lamotrin.

- **Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal** om du får något av följande symptom: feber, utslag, neurologiska symptom (t.ex. skakningar eller tremor, förvirrat tillstånd, störningar i hjärnans funktion).

Tankar på att skada dig själv eller på självmord

Läkemedel mot epilepsi används för att behandla olika tillstånd, inklusive epilepsi och bipolär sjukdom. Personer med bipolär sjukdom kan ibland ha tankar på att skada sig själva eller att begå självmord. Om du har bipolär sjukdom är det mer troligt att du har sådana tankar:

- nära du påbörjar behandlingen

- om du tidigare haft tankar på att skada dig själv eller på självmord
- om du är under 25 år.

Om du har oroande tankar eller erfarenheter eller om du märker att du mår sämre eller utvecklar nya symtom medan du tar Lamotrigin Orion:

➔ **Kontakta läkare snarast eller uppsök närmaste sjukhus för hjälp.**

Det kan vara av hjälp att berätta för en familjemedlem, vårdgivare eller nära vän att du kan bli deprimerad eller få märkbara förändringar i ditt humör, och be dem att läsa denna bipacksedel. Du kan be dem att tala om för dig om de är oroade kring din depression eller andra förändringar i ditt beteende.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t. ex Lamotrigin Orion har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

Om du tar Lamotrigin Orion mot epilepsi

Anfall vid vissa typer av epilepsier kan ibland bli värre eller inträffa oftare medan du tar Lamotrigin Orion. En del patienter kan uppleva svåra anfall som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Om dina anfall inträffar oftare eller om du upplever ett svårt anfall när du tar Lamotrigin Orion:

➔ **Kontakta läkare snarast.**

Barn och ungdomar

Lamotrigin Orion ska inte ges till personer under 18 års ålder för behandling av bipolär sjukdom. Läkemedel för behandling av depression och andra mentala hälsoproblem ökar risken för självmordstankar och självmordsbeteende hos barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Lamotrigin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även naturläkemedel eller receptfria läkemedel.

Läkaren behöver veta om du tar några andra läkemedel för att behandla epilepsi eller mentala hälsoproblem. Detta är för att säkerställa att du tar rätt dos Lamotrigin Orion. Dessa läkemedel omfattar:

- **oxkarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller zonisamid** som används för att behandla **epilepsi**
 - **litium, olanzapin eller aripiprazol** som används för att behandla **mentala hälsoproblem**
 - **bupropion** som används för att behandla **mentala hälsoproblem** eller för att **sluta röka**
 - **paracetamol** som används för att behandla **smärta** och **feber**.
- ➔ **Berätta för din läkare om du tar något av dessa.**

Vissa läkemedel påverkar Lamotrigin Orion eller gör det mer sannolikt att man får biverkningar. Dessa omfattar:

- **valproat** som används för att behandla **epilepsi** och **mentala hälsoproblem**
 - **karbamazepin** som används för att behandla **epilepsi** och **mentala hälsoproblem**
 - **fentyoin, primidon** eller **fenobarbital** som används för att behandla **epilepsi**
 - **risperidon** som används för att behandla **mentala hälsoproblem**
 - **rifampicin** som är ett **antibiotikum**
 - läkemedel som används för att behandla **HIV** (en kombination av **lopinavir** och **ritonavir** eller **atazanavir** och **ritonavir**)
 - **hormonella preventivmedel** som till exempel **p-piller** (*se nedan*).
- ➔ **Berätta för din läkare om du tar eller om du börjar eller slutar ta något av dessa.**

Hormonella preventivmedel (till exempel p-piller) kan påverka det sätt på vilket Lamotrigin Orion fungerar

Läkaren kan rekommendera att du använder en speciell typ av hormonellt preventivmedel eller en annan preventivmetod som till exempel kondom, pessar eller spiral. Om du använder ett hormonellt preventivmedel som p-piller kan läkaren eventuellt ta blodprov för att kontrollera lamotriginnivån. Om du använder eller planerar att börja använda hormonellt preventivmedel:

- **Berätta det för din läkare** som diskuterar lämpliga preventivmetoder med dig.

Lamotrigin Orion kan också påverka det sätt som hormonella preventivmedel fungerar på, även om det är osannolikt att de blir mindre effektiva. Om du använder ett hormonellt preventivmedel och märker någon förändring i din menscykel som till exempel en mensliknande blödning eller småblödningar mellan menstruationerna:

- **Berätta det för din läkare.** Det kan vara tecken på att Lamotrigin Orion påverkar det sätt som ditt preventivmedel fungerar på.

Graviditet och amning

- **Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.**
- **Sluta inte behandlingen utan att tala om det med läkaren.** Det är speciellt viktigt om du har epilepsi.
- Graviditeten kan ändra effektiviteten av Lamotrigin Orion, du kan därför behöva ta blodprover och din dos av Lamotrigin Orion kan behöva ändras.
- Det kan finnas en liten ökad risk för missbildning hos foster, inklusive läpp- eller gomspalt, om Lamotrigin Orion tas under de första tre månaderna av graviditeten.
- Läkaren kan ge dig rådet att ta extra **folsyra** om du planerar att bli gravid och under tiden du är gravid.
- **Om du ammar eller planerar att amma, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.** Den aktiva substansen i Lamotrigin Orion utsöndras i bröstmjölk och kan påverka barnet. Din läkare kommer att diskutera risker och fördelar med amning under behandling med lamotrigin. Om du väljer att amma kommer läkaren att kontrollera barnet då och då för att se om barnet uppvisar dåsigitet, utslag eller dålig väktuppgång. Informera läkaren om du upptäcker något av dessa symptom hos ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Lamotrigin kan orsaka yrsel och dubbelseende.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har epilepsi ska du tala med din läkare om att köra fordon och använda maskiner.

Lamotrigin Orion innehåller aspartam

Detta läkemedel innehåller aspartam 1,88 mg (25 mg tablett), 3,75 mg (50 mg tablett), 7,5 mg (100 mg tablett) ja 15 mg (200 mg tablett). Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylnetonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du tar Lamotrigin Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Lamotrigin Orion du ska ta

Det kan ta ett tag att finna den Lamotrigin Orion dos som är bäst för dig. Dosen du tar beror på:

- din ålder
- om du tar Lamotrigin Orion tillsammans med andra läkemedel eller inte
- om du har problem med njurarna eller levern.

Din läkare börjar med att ge dig en låg dos och ökar dosen gradvis under några veckor tills du når en dos som fungerar för dig (kallas den *effektiva dosen*). **Ta aldrig mer Lamotrigin Orion än din läkare har sagt.**

Den vanliga effektiva dosen av Lamotrigin Orion för vuxna och barn från 13 års ålder är mellan 100 mg och 400 mg dagligen.

För barn mellan 2 och 12 års ålder beror den effektiva dosen på kroppsvikten – vanligtvis är den mellan 1 mg och 15 mg för varje kilo av barnets vikt upp till högst 200 mg dagligen som underhållsdos.

Lamotrigin Orion rekommenderas inte åt barn under två år.

Hur du tar din dos Lamotrigin Orion

Ta din dos Lamotrigin Orion en eller två gånger dagligen enligt läkarens anvisningar. Du kan ta den med eller utan mat.

- **Ta alltid hela den dos** som läkaren har ordinerat. Ta aldrig bara en del av en tablett.

Din läkare kan också tala om för dig att du ska börja eller sluta ta andra läkemedel, beroende på vilket tillstånd du behandlas för och hur du reagerar på behandlingen.

Lamotrigin Orion dispergerbara tablettter kan antingen sväljas hela med vatten, tuggas eller blandas med vatten till en flytande medicin. Ta aldrig bara en del av lösningen.

Om du tuggar tabletten:

Du behöver kanske dricka lite vatten samtidigt så att tabletten löses upp i munnen. Drick sedan lite mer vatten så att du säkert sväljer all medicin.

Så här gör du en flytande medicin:

- Lägg tabletten i ett glas med minst så mycket vatten att hela tabletten täcks.
- Rör om så att tabletten löses upp eller vänta tills tabletten är helt upplöst.
- Drick all vätska.
- Tillsätt lite mer vatten i glaset och drick det för att säkerställa att inget läkemedel är kvar i glaset.

Om du har tagit för stor mängd av Lamotrigin Orion tablettter

- ➔ **Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.** Visa dem Lamotrigin Orion förpackningen om möjligt.

Om du tar för mycket Lamotrin Orion är risken större att du får allvarliga biverkningar vilka kan vara livshotande.

En person som tagit för mycket Lamotrin Orion kan få något av dessa symtom:

- snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)
- klumpighet och bristande koordinationsförmåga som påverkar balansen (ataxi)
- förändringar i hjärtrytmen (upptäcks vanligen på EKG)
- förlust av medvetandet, krampfall (konvulsioner) eller koma.

Om du har glömt att ta en dos Lamotrin Orion tablett

→ **Ta inte extra tablettter för att kompensera för en glömd dos. Ta helt enkelt din nästa dos på den vanliga tiden.**

Om du har glömt att ta flera doser Lamotrin Orion

→ **Fråga din läkare hur du ska börja ta medicinen igen.** Det är viktigt att du frågar om detta.

Om du slutar att ta Lamotrin Orion

Sluta inte ta Lamotrin Orion utan att ha rådgjort med läkare.

Lamotrin Orion tas så länge läkaren rekommenderar det. Sluta inte utan att läkaren talar om för dig att du ska göra det.

Om du tar Lamotrin Orion för epilepsi

För att sluta ta Lamotrin Orion är det viktigt att **dosen minskas gradvis** under omkring 2 veckor. Om du plötsligt slutar att ta Lamotrin Orion kan din epilepsi komma tillbaka eller förvärras.

Om du tar Lamotrin Orion mot bipolär sjukdom

Det kan ta tid innan Lamotrin Orion verkar och därför kommer du troligtvis inte att må bättre på en gång. Om du slutar ta Lamotrin Orion behöver dosen inte minskas gradvis. Men du bör ändå prata med din läkare först, om du vill sluta ta Lamotrin Orion.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuellt livshotande hudreaktion: kontakta omedelbart läkare

Ett litet antal personer som tar Lamotrin Orion får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara livshotande och utvecklas till allvarligare problem om den inte behandlas.

Det är troligast att du får dessa symtom under de första månadernas behandling med Lamotrin Orion, speciellt om du börjar på en för hög dos eller om dosen ökas för snabbt eller om du tar Lamotrin Orion tillsammans med en annan medicin som innehåller *valproat*. Vissa symtom är vanligare hos barn så föräldrar ska vara extra uppmärksamma.

Symtom på sådana reaktioner är bland annat:

- **hudutslag eller rodnad**, vilket kan utvecklas till en livshotande hudreaktion som inkluderar utbrett hudutslag med blåsor och flagnande hud, framför allt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom) omfattande flagning av huden (mer än 30 % av kroppssytan – toxisk epidermal nekroly), eller omfattande hudutslag med påverkan på lever, blodet och andra kroppsorgan (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, som också kallas för DRESS-överkänslighetssyndrom).
- **sår i munnen, halsen, näsan eller genitalier**
- **ont i munnen eller röda eller svullna ögonen** (konjunktivitis)

- **feber**, influensaliknande symtom eller sömnighet
- **svullnad runt ansiktet eller svullna körtlar** i hals, armhåla eller ljumske
- **oväntad blödning eller blåmärke** eller att fingrarna blir blå
- **ont i halsen** eller fler infektioner (till exempel förkylningar) än vanligt
- förhöjda leverenzymvärden i blodtester
- en ökning av en sorts vita blodkroppar (eosinofiler)
- förstorade lymfkörtlar
- påverkan på kroppsorgan, omfattande lever och njurar.

I många fall är dessa symtom tecken på mindre allvarliga biverkningar. **Men du måste vara medveten om att de kan vara livshotande och leda till allvarligare problem, såsom organsvikt, om de inte behandles.** Om du upptäcker något av dessa symtom:

- **Kontakta omedelbart läkare.** Din läkare kan bestämma att prover ska tas på din lever, dina njurar eller ditt blod och kan säga att du ska sluta ta Lamotrigin Orion. Om du har fått Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolysis, kommer din läkare att berätta dig att du inte någonsin skall använda lamotrigin igen.

Hemofagocytterande syndrom (HLH) (se avsnitt 2: Vad du behöver veta innan du tar Lamotrigin Orion)

Mycket vanliga (*kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare*):

- huvudvärk
- hudutslag.

Vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare*):

- aggressivitet eller irritabilitet
- sömnighet eller dåsighet
- yrsel
- skakningar eller tremor
- sömnsvårigheter
- att känna sig agiterad
- diarré
- torr mun
- illamående eller kräkningar
- trötthet
- värv i rygg eller ledar eller någon annanstans.

Mindre vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare*):

klumpighet och bristande koordinationsförmåga

- dubbelseende eller dimsyn
- onormalt hårvavfall eller förtunning
- hudutslag eller solskador efter exponering för sol eller konstgjort ljus (fotosensitivitet).

Sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare*):

- en livshotande hudreaktion (*Stevens-Johnsons syndrom*); se även informationen i början av *avsnitt 4*
- en grupp av symtom som inkluderar:
 - feber, illamående, kräkning, huvudvärk, nackstelhet och extrem känslighet för starkt ljus.
 - Detta kan bero på en inflammation i membranen som skyddar hjärnan och ryggraden (*meningit*). Dessa symtom försvinner vanligtvis när man slutar behandlingen. Om symtomen skulle fortsätta eller bli värre, **kontakta läkare**.
 - snabba, okontrollerade ögonrörelser (*nystagmus*)
 - klåda i ögonen med utsöndringar och skorpor på ögonlocken (*konjunktivit*).

Mycket sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare*):

- en livshotande hudreaktion (*toxisk epidermal nekrolys*), *se även informationen i början av avsnitt 4*
- läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, *se även informationen i början av avsnitt 4*
- feber, *se även informationen i början av avsnitt 4*
- svullnad runt ansiktet (*ödem*) eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske (*lymfadenopati*), *se även informationen i början av avsnitt 4*
- förändringar i leverfunktionen, vilket visar sig i blodprover, eller leversvikt, *se även informationen i början av avsnitt 4*
- en allvarlig störning i blodkoaguleringen som kan orsaka oväntad blödning eller blåmärke (*disseminerad intravaskulär koagulation*), *se även informationen i början av avsnitt 4*
- hemofagocyterande syndrom (HLH) (se avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du tar La motrin Orion”)
- förändringar som kan visa sig i blodprover – bland annat minskat antal röda blodkroppar (*anemi*), minskat antal vita blodkroppar (*leukopeni, neutropeni, agranulocytos*), minskat antal blodplättar (*trombocytopeni*), minskat antal av alla dessa blodkroppstyper (*pancytopeni*) och en sjukdom i benmärgen som kallas *aplastisk anemi*
- hallucinationer (att ”se” eller ”höra” saker som egentligen inte finns)
- förvirring
- känsla av att ”vingla” eller vara ostadig när du rör dig
- okontrollerbara upprepade kroppsrörelser och/eller ljud eller ord (*tics*), okontrollerbara muskelpasmer som påverkar ögonen, huvudet och bålen (*koreoatetos*) eller andra ovanliga kroppsrörelser som ryckningar, skakningar eller stelhet
- oftare förekommande anfall hos dem som redan har epilepsi
- förvärrade symtom hos dem som redan har Parkinsons sjukdom
- ”lupus-liknande” reaktion (symtom kan inkludera: ryggvärk eller ledvärk vilket ibland medföljs av feber och/eller allmän sjukdomskänsla).

Har rapporterats (*förekommer hos ett okänt antal användare*):

- det har kommit rapporter om bensjukdomar t.ex. minskad bentäthet i skelettet, benskörhet och benbrott. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du behandlas med epilepsimedicin under lång tid, om du vet att du har benskörhet eller om du medicinerar med steroider.
- njurinflammation (tubulointerstitiell nefrit), vilket kan förekomma med inflammation I ögat (uveit)
- mardrömmar
- sämre immunförsvar till följd av lägre nivåer av immunoglobuliner, en sorts blodkroppar som hjälper till att skydda mot infektioner
- röda knutor eller fläckar på huden (pseudolymfom).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Lamotrin Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är lamotrin. En dispergerbar tablett innehåller 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg lamotrin.
- Övriga innehållsämnen är krospovidon, povidon K-30,mannitol (E421), silikonerasad mikrokristallin cellulosa, aspartam (E951), kroskarmellosnatrium, svartvinbärsarom och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lamotrin Orion 25 mg dispergerbara tablettar är vita eller nästan vita, runda, jämna, har sneda kanter och är omärkta på båda sidor, diameter ca. 5,5 mm.

Lamotrin Orion 50 mg dispergerbara tablettar är vita eller nästan vita, runda, jämna, har sneda kanter och är omärkta på båda sidor, diameter ca. 7 mm.

Lamotrin Orion 100 mg dispergerbara tablettar är vita eller nästan vita, runda, jämna, har sneda kanter och är omärkta på båda sidor, diameter ca. 8,5 mm.

Lamotrin Orion 200 mg dispergerbara tablettar är vita eller nästan vita, runda, jämna, har sneda kanter och är omärkta på båda sidor, diameter ca. 12 mm.

Lamotrin Orion 25 mg och 50 mg: 30 eller 50 tablettar/förpackning.

Lamotrin Orion 100 mg: 30, 50 eller 100 tablettar/förpackning.

Lamotrin Orion 200 mg: 50 eller 100 tablettar/förpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 1.11.2023