

## Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

### Divifarm 1000 IU kalvopäällysteinen tabletti Divifarm 7000 IU kalvopäällysteinen tabletti Divifarm 30 000 IU kalvopäällysteinen tabletti

1000 IU kolekalsiferoli ( $D_3$ -vitamiini) – 25 mikrog  
7000 IU kolekalsiferoli ( $D_3$ -vitamiini) – 175 mikrog  
30 000 IU kolekalsiferoli ( $D_3$ -vitamiini) – 750 mikrog

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määräty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tao apteekkikenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Divifarm on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Divifarm-tabletteja
3. Miten Divifarm-tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Divifarm-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Divifarm on ja mielin sitä käytetään**

Divifarm sisältää  $D_3$ -vitamiinia, joka säätelee kalsiumin imeytymistä, aineenvaihduntaa ja sitoutumista luustoon.

Divifarm-tabletteja käytetään aikuisten ja nuorten  $D_3$ -vitamiinin puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Lääkäri saattaa määrättää Divifarm-tabletteja luukatoa estävän lääkityksen lisäksi.

Kolekalsiferolia, jota Divifarm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkikenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Divifarm-tabletteja**

##### **Älä ota Divifarm-tabletteja**

- jos olet allerginen kolekalsiferolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on hyperkalsemiaa (suurentunut veren kalsiumpitoisuus) tai hyperkalsiuriaa (suurentunut virtsan kalsiumpitoisuus).
- jos sinulla on D-hypervitaminoosi (suurentunut veren D-vitamiinipitoisuus).
- jos sinulla on munuaiskiviä.

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua, keskustele lääkärin tai apteekkikenkilökunnan kanssa ennen Divifarm-tablettien käyttöä.

## **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Divifarm-tabletteja.

- jos sinulla on sarkoidoosi (eräs mm. keuhkoihin, ihoon ja niveliin vaikuttava sidekudostauti).
- jos käytät muita D-vitamiinia sisältäviä lääkkeitä.
- jos sinulla on munuaisvaivoja tai jos sinulla on ollut munuaiskiviä.

## **Muut lääkevalmisteet ja Divifarm**

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Tämä koskee seuraavia lääkkeitä:

- Kolestyramiini (kolesterolilääke).
- Fenytoomi tai barbituraatit (epilepsialääkkeitä).
- Laksatiivit (käytetään ummetuksen hoitoon ja/tai ehkäisyyn), jos ne sisältävät parafinilöjyä.
- Tiatsididiureetit (verenpainelääkkeitä).
- Glukokortikoidit (tulehdusta hillitseviä lääkkeitä).
- Digoksiini, digitoksiini (sydänlääke).
- Aktinomysiini (syöpälääke).
- Imidatsoli (sienilääke).
- Orlistaatti (painonpudotus).

## **Raskaus, imetyks ja he de lmällisyys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskausaikana D-vitamiinin päivittäisen saannin ei pidä olla yli 600 IU.

Divifarm-tabletteja tulee käyttää raskauden aikana vain, jos lääkäri on todennut D-vitamiinin puutoksen.

Divifarm-tabletteja voidaan käyttää imetyksen aikana. D<sub>3</sub>-vitamiini erittyy rintamaitoon. Tämä tulee ottaa huomioon, jos imetettävä lapsi saa jo D-vitamiinisää.

## **Ajamineen ja koneiden käyttö**

Divifarm-tablettien ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

## **Divifarm sisältää sakkaroosia ja laktoosia**

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

## **3. Miten Divifarm-tabletteja otetaan**

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletit voidaan niellä kokonaисina tai murskata. Tabletit voidaan ottaa ruuan kanssa.

D<sub>3</sub>-vitamiinitarpeesi riippuu D-vitamiinitasoistasi ja hoidolle saatavasta vasteesta.

Ylläpitohoitot:

- Divifarm 1000 IU tabletit: 1 tai 2 tablettia päivittäin
- Divifarm 7000 IU tabletit: 1 tai 2 tablettia viikoittain
- Divifarm 30 000 IU tabletit: 1 tai 2 tablettia kuukausittain.

Vaikeissa D-vitamiinin puutostiloissa aikuisille (korkeampi aloitusannos ns. latausannos):

- Divifarm 30 000 IU tabletit: 1 tabletti viikoittain 12 viikon ajan jatkaen ylläpitoannoksella.

## **Käyttö lapsille**

Divifarm-tabletteja ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 12-vuotiaalle lapsille, koska tutkimustulokset puuttuvat.

- D-vitamiinin puutoksen ehkäisyyn 12–18-vuotiailla lapsilla: 1 Divifarm 1000 IU tabletti tulisi ottaa päivittäin.
- D-vitamiinin puutoksen hoitoon 12–18-vuotiailla lapsilla: 2 Divifarm 1000 IU tablettia tulisi ottaa päivittäin.

## **Jos otat enemmän Divifarm-tabletteja kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkärin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

## **Jos unohtat ottaa Divifarm-tabletteja**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla on vakavia yliherkkyyssreaktio oireita, kuten angioedeema tai kurkunpään turvotus, lopeta Divifarm-tablettien käyttö ja käänny heti lääkärin puoleen. Näitä oireita voivat olla mm.:

- kasvojen, hulten, kielen tai nielun turvotus
- nielemisvaikeus
- nokkosihottuma ja hengitysvaikeus

*Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä sadasta): Hyperkalsemia (suurentunut veren kalsiumpitoisuus) ja hyperkalsiuria (suurentunut virtsan kalsiumpitoisuus).*

*Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä tuhannesta): Kutina, ihottuma ja nokkosihottuma.*

## **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **5. Divifarm-tablettien säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pahvikotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25°C. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### Mitä Divifarm sisältää

- Vaikuttava aine on kolekalsiferolia (D<sub>3</sub>-vitamiinia).
  - Yksi Divifarm 1000 IU tabletti sisältää 25 mikrog kolekalsiferolia, joka vastaa 1000 IU D<sub>3</sub>-vitamiinia.
  - Yksi Divifarm 7000 IU tabletti sisältää 175 mikrog kolekalsiferolia, joka vastaa 7000 IU D<sub>3</sub>-vitamiinia.
  - Yksi Divifarm 30 000 IU tabletti sisältää 750 mikrog kolekalsiferolia, joka vastaa 30 000 IU D<sub>3</sub>-vitamiinia.
- Muut aineet ovat:
  - Tabletti: laktoosimonohydraatti; selluloosajauhe; modifioitu tärkkelys; maissitärkkelys; kroskarmelloosinatrium; sakkaroosi; piidioksiidi, kolloidinen, vedetön; magnesiumstearaatti; natriumaskorbaatti; keskipitkäketjuiset triglyseridit; all-rac- $\alpha$ -Tokoferoli.
  - Kalvopäällyste: poly(vinyllalkoholi); titaanidioksiidi (E171); makrogoli; talkki; kinoliinikeittainen (E104); keltainen rautaoksidi (E172).

### Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskokot

Divifarm 1000 IU on keltainen, pyöreä, halkaisijaltaan 7,2 mm, kalvopäällysteinen tabletti, jossa on molemmilla puolilla sileä, kupera pinta ja "D" painettuna toiselle puolelle.

Pakauskoot: 30 tablettia läpikuultamattomissa PVC/PVdC-Alu-läpipainopakkauksissa japahvikotelossa.

Divifarm 7000 IU on keltainen, pyöreä, halkaisijaltaan 7,2 mm, kalvopäällysteinen tabletti, jossa on molemmilla puolilla sileä, kupera pinta ja "W" painettuna toiselle puolelle.

Pakauskoot: 4 ja 12 tablettia läpikuultamattomissa PVC/PVdC-Alu-läpipainopakkauksissa japahvikotelossa.

Divifarm 30 000 IU on keltainen, pyöreä, halkaisijaltaan 13,2 mm, kalvopäällysteinen tabletti, jossa on molemmilla puolilla sileä, kupera pinta.

Pakauskoot: 1 ja 3 tablettia läpikuultamattomissa PVC/PVdC-Alu-läpipainopakkauksissa japahvikotelossa.

Kaikkia pakaus kokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### Myyntiluvan haltija ja valmistaja

#### Myyntiluvan haltija

Orifarm Generics A/S  
Energivej 15  
DK-5260 Odense S  
Tanska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.  
[info@orifarm.com](mailto:info@orifarm.com)

#### Valmistaja

Pharma Patent Kft.  
Váci út 36-38. 4. emelet  
1132 Budapest

Unkari

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.10.2023**

## Bipacksedel: Information till användare

### Divifarm 1000 IU filmdrage rade tabletter Divifarm 7000 IU filmdrage rade tabletter Divifarm 30 000 IU filmdrage rade tabletter

1000 IU kolekalciferol (vitamin D<sub>3</sub>) – 25 mikrogram  
7000 IU kolekalciferol (vitamin D<sub>3</sub>) – 175 mikrogram  
30 000 IU kolekalciferol (vitamin D<sub>3</sub>) – 750 mikrogram

#### Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

#### I den här bipackse del finns information om följande :

1. Vad Divifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Divifarm
3. Hur du tar Divifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Divifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### 1. Vad Divifarm är och vad det används för

Divifarm innehåller vitamin D<sub>3</sub> som reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.

Divifarm används för att förebygga och behandla brist på vitamin D<sub>3</sub> hos vuxna och ungdomar.

Din läkare kan förskriva Divifarm som ett komplement till specifik behandling mot benskörhet (osteoporos).

Kolekalciferol som finns i Divifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i den här produktinformationen. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följd alltid deras instruktion.

#### 2. Vad du behöver veta innan du tar Divifarm

##### Ta inte Divifarm:

- om du är allergisk mot kolekalciferol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har hyperkalciemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).
- om du har hypervitaminosis D (ett överskott av vitamin D i blodet).
- om du har njursten.

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Divifarm.

## **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Divifarm.

- om du lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl.a. drabbar lungor, hud och leder).
- om du använder andra läkemedel som innehåller vitamin D.
- om du har nedsatt njurfunktion eller har haft njursten.

## **Andra läkemedel och Divifarm**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta gäller följande läkemedel:

- Kolestyramin (behandling av högt kolesterol).
- Fenytoin eller barbiturater (behandling av epilepsi).
- Laxermedel (används vid behandling och/eller för att förebygga förstopning) om de innehåller paraffinolja.
- Tiazid-diureтика (mot högt blodtryck).
- Glukokortikoider (behandling av inflammation).
- Digoxin, digitoxin (mot oregelbunden hjärtrytm).
- Aktinomycin (kancermedicin).
- Imidazol (mot svampinfektioner).
- Orlistat (vid viktnedgång).

## **Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 600 IU vitamin D.

Divifarm ska endast användas under graviditet om vitamin D-brist har fastställts av läkare.

Divifarm kan användas under amning. Vitamin D<sub>3</sub> passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man redan ger vitamin D-tillägg till barn som ammas.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Divifarm har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

## **Divifarm innehåller sackaros och laktos**

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

## **3. Hur du tar Divifarm**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna kan sväljas hela eller krossas. Tabletterna kan intas i samband med måltid.

Den mängd vitamin D<sub>3</sub> du behöver kommer att bero på dina vitamin D-nivåer och hur du svarar på behandlingen.

Underhållsbehandling:

- Divifarm 1000 IU tablett: 1 eller 2 tablett dagligen
- Divifarm 7000 IU tablett: 1 eller 2 tablett varje vecka
- Divifarm 30 000 IU tablett: 1 eller 2 tablett varje månad.

Vid kraftig D-vitaminbrist hos vuxna (laddningsdos):

- Divifarm 30 000 IU tablettter: 1 tablett per vecka i 12 veckor följt av underhållsdosering.

### **Användning för barn**

Divifarm ska inte användas till barn under 12 år då underlag från kliniska studier saknas.

- För att förebygga D-vitaminbrist hos barn mellan 12-18 års ålder; 1 Divifarm 1000 IU tablett bör tas dagligen.
- För att behandla D-vitaminbrist hos barn mellan 12-18 års ålder; 2 Divifarm 1000 IU tablettter bör tas dagligen.

### **Om du har tagit för stor mängd av Divifarm**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

### **Om du har glömt att ta Divifarm**

Ta inte dubbeldos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Divifarm och kontakta omedelbart läkare om du upplever symptom på överkänslighetsreaktioner som angioödem och/eller laryngealödem, t.ex.:

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter

*Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) och hyperkaliuri (ökad mängd kalcium i urinen).*

*Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Klåda, utslag och nässelutslag.*

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## **5. Hur Divifarm ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är kolekalciferol (vitamin D<sub>3</sub>).
  - En Divifarm 1000 IU tablett innehåller 25 mikrogram kolekalciferol motsvarande 1000 IU vitamin D<sub>3</sub>.
  - En Divifarm 7000 IU tablett innehåller 175 mikrogram kolekalciferol motsvarande 7000 IU vitamin D<sub>3</sub>.
  - En Divifarm 30 000 IU tablett innehåller 750 mikrogram kolekalciferol motsvarande 30 000 IU vitamin D<sub>3</sub>.
- Övriga innehållsämnen är:
  - Tablettkärna: laktosmonohydrat; cellulospulver; modifierad matstarkelse; majsstarkelse; kroskarmellosnatrium; sackaros; kiseldioxid, kolloidal, vattenfri; magnesiumstearat; natriumaskorbat; triglycerider, medellångkedjiga; all-rac- $\alpha$ -Tokoferol
  - Filmdrägering: poly(vinylalkohol); titandioxid (E171); makrogol; talk; kinolingul (E104); gul järnoxid (E172).

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Divifarm 1000 IU tablett är en gulfärgad, rund, 7,2 mm diameter filmdrägerad tablett med slät, konvex yta på båda sidor och märkta med "D" på ena sidan.

Förpackningsstorlekar: 30 tablett i ogenomskinligt PVC/PVdC-aluminium-blister och kartonglåda.

Divifarm 7000 IU tablett är en gulfärgad, rund, 7,2 mm diameter filmdrägerad tablett med slät, konvex yta på båda sidor och märkta med "W" på ena sidan.

Förpackningsstorlekar: 4 och 12 tablett i ogenomskinligt PVC/PVdC-aluminium-blister och kartonglåda.

Divifarm 30 000 IU tablett är en gulfärgad, rund, 13,2 mm diameter filmdrägerad tablett med slät, konvex yta på båda sidor.

Förpackningsstorlekar: 1 och 3 tablett i ogenomskinligt PVC/PVdC-aluminium-blister och kartonglåda.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

#### Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

#### Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com

#### Tillverkare

Pharma Patent Kft.

Váci út 36-38. 4. emelet

1132 Budapest  
Ungern

**Den här bilden ändrades senast 31.10.2023**