

## PAKKAUSSELOSTE

### VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos

***Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.***

*Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Visclear silmätippoja tarkoin pakkausselosteen ohjeiden mukaisesti parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi.*

- *Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.*
- *Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.*
- *Mene lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.*

#### **Koostumus**

Yksi millilitra silmätippaliuosta sisältää:

*Vaikuttava aine:* 0,5 mg tetrahydropoliinihydrokloridia.

*Apuaineet:*

Bentsalkoniumkloridi	0,1 mg
Natriumkloridi	2,2 mg
Booraksi	0,5 mg
Boorihappo	12,3 mg
Dinatriumedetaatti	1,0 mg
Puhdistettu vesi	ad 1,0 ml

*Valmisteen kuvaus:* Kirkas, väritön liuos.

#### **Vaikutustapa**

Visclear silmätippojen vaikutus perustuu silmän verisuonien supistumiseen, mikä lievittää mm. silmän sidekalvon punoitusta.

#### **Myyntiluvan haltija**

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy  
Vaisalantie 2  
02130 Espoo

#### **Valmistaja**

Janssen Pharmaceutica N.V.  
Beerse, Belgia

#### **Käyttötarkoitus**

Visclear-silmätipat on tarkoitettu erilaisten allergisten ja silmää ärsyttävien tilojen aiheuttaman silmien arkuuden, polton, kutiamisen, ärsytyksen ja punoituksen lievitykseen. Heinänuhan, muiden siitepölyallergioiden, savun, pölyn ja tuulen tms. aiheuttamat silmän ärsytystilat ja punoitus.

## **Käytön esteet**

Älä käytä Visclear-silmätippoja, jos

- silmästä vuotaa märkää
- silmässä on vierasesine
- silmässä on mekaaninen, kemiallinen tai lämmön aiheuttama kudosaaurio
- sinulla on jokin vakava silmäsairaus, kuten glaukooma
- tiedät olevasi yliherkkä valmisteeseen jollekin aineosalle.

## **Erityisesti huomattavaa**

Käytä Visclear-silmätippoja vain lieviin silmien ärsytystiloihin. Jos oireet eivät häviä 48 tunnin kuluessa tai jos ärsytys tai punoitus pahenee, lopeta hoito ja ota yhteys lääkäriin.

Jos käytät pehmeitä piilolinsejä, poista ne ennen Visclear-silmätippojen annostelua. Piilolinssit saa laittaa takaisin paikoilleen aikaisintaan 15 minuutin kuluttua annostelusta.

Visclear voi värjätä pehmeät piilolinssit.

## **Käyttö raskauden ja imetyksen aikana**

Keskustele lääkärisi kanssa, ennen kuin käytät Visclear-silmätippoja raskauden tai imetyksen aikana.

## **Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn**

Visclear saattaa laajentaa mustuaisia, mikä yleensä ilmenee erilaisina näköhäiriöinä. Tämä voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä.

## **Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa**

Visclear-hoidon teho voi muuttua, jos käytät samanaikaisesti tiettyjä muita lääkkeitä. Kerro siis lääkärillesi, jos käytät seuraavantyyppisiä lääkkeitä:

- sympatomimeetit
- trisykliset masennuslääkkeet
- MAOn estäjät.

## **Annostus**

1-2 Visclear-tippaa kumpaankin silmään 2-3 kertaa vuorokaudessa.

*Lapset:* 1 tippa 2-3 kertaa vuorokaudessa.

## **Käyttöohje**

Pese ensin kädet. Kallista päätäsi taaksepäin ja vedä alaluomea sormella alaspäin siten, että alaluomi muodostaa ikään kuin taskun. Tiputa alaluomen sisäpinnalle taskuun yksi tippa ja sulje silmä. Jos sinusta tuntuu, että koko annos tai osa siitä meni hukkaan eli silmän ohi, ota uusi annos.

Varo koskettamasta tippapullon kärjellä silmää tai muita pintoja. Näin estät epäpuhtauksien pääsyn pulloon. Jos käytät piilolaseja, poista ne ennen lääkkeen annostelua. Aseta piilolasit paikoilleen, vasta kun Visclear on imeytynyt ja silmän pinta tuntuu normaalin kostealta.

## **Yliannostus**

Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

## **Haittavaikutukset**

Muiden lääkevalmisteiden tavoin myös Visclear voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Visclear silmätippojen käytön aikana voi ilmetä silmien kirvelyä, polttelua, verekkyyttä, näön hämärtymistä ja sidekalvon ärsytystä. Joskus harvoin voi ilmetä myös mustuaisten laajenemista, jos valmistetta käytetään liikaa.

## **Säilytys ja viimeinen käyttöpäivämäärä**

Säilytä huoneenlämmössä (+15 – +25 °C).

Lääke on avaamattomana käyttökelpoinen pakkaukseen merkittyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.

Käytä pullo yhden kuukauden kuluessa avaamisesta.

Palauta käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet apteekkiin.

Ei lasten ulottuville.

**Pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 2.12.2009**

## **Ohjeet pullon avaamiseksi**

1. Poista korkin sinettirengas kokonaan.
2. Kierrä korkkia kiinni, jolloin korkin sisällä oleva piikki puhkaisee pulloon reiän.

## **BIPACKSEDEL**

### **VISCLEAR 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning**

**Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Detta läkemedel är receptfritt för att du skall kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Visclear måste trots det användas omsorgsfullt enligt anvisningarna i denna bipacksedel för att uppnå det bästa möjliga behandlingsresultatet.

- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa om den.
- Vänd dig till din farmaceut om du behöver mera information eller råd.
- Du måste uppsöka läkare om symptomen försämras eller inte förbättras.

#### **Sammansättning**

En milliliter av ögondroppslösning innehåller:

Verksamt ämne: 0,5 mg tetrazyolinhydroklorid.

Hjälpämnen:

Bensalkoniumklorid	0,1 mg
Natriumklorid	2,2 mg
Borax	0,5 mg
Borsyra	12,3 mg
Dinatriumedetat	1,0 mg
Renat vatten	ad 1,0 ml

*Produktbeskrivning:* Klar, färglös lösning.

#### **Verkningsätt**

Effekten hos Visclear baseras på att blodkärlen i ögats bindehinna dras samman vilket bland annat minskar rodnaden i bindehinnan.

#### **Innehavare av försäljningstillstånd**

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Vaisalavägen 2

02130 Esbo

#### **Tillverkare**

Janssen Pharmaceutica N.V.

Beerse, Belgien

#### **Användningsområde**

Visclear ögondroppar är avsedda för lindring av varierande allergiska och retande tillstånd som gör ögonen känsliga, orsakar en brännande känsla, klåda, irritation och rödögdhet. Irritation samt röda ögon till följd av hösnuva, andra former av pollenallergi, rök, damm, blåst etc.

## **När skall preparatet inte användas**

Använd inte Visclear ögondroppar om

- det kommer varigt sekret från ögat
- du har en främmande kropp (skräp) i ögat
- du har en vävnadsskada på grund av mekanisk eller kemisk påverkan eller värme
- du har en allvarlig ögonsjukdom såsom glaukom (grön starr)
- du vet att du är överkänslig mot någon beståndsdel i preparatet.

## **Observera särskilt**

Använd Visclear ögondroppar uteslutande för lindring av lindriga irritationstillstånd i ögonen. Om symtomen inte avklingar inom loppet av 48 timmar eller om dina ögon blir ännu mer irriterade eller röda, stoppa behandlingen och konsultera läkaren.

Om du använder mjuka kontaktlinser, ta ut dem före applicering av Visclear. Du får inte sätta in kontaktlinserna igen förrän tidigast 15 minuter efter administreringen.

Visclear kan missfärga mjuka kontaktlinser.

## **Användning under graviditet och amning**

Rådfråga din läkare innan du använder detta preparat under graviditet eller amning.

## **Inverkan på körförmågan och förmågan att använda maskiner**

Visclear kan orsaka pupillutvidgning vilket brukar märkas som synstörningar av olika slag. I dessa fall kan förmågan att köra bil och använda maskiner försämrats.

## **Sammanverkningar med andra läkemedel**

Effekten av behandlingen med Visclear kan ändras om du använder samtidigt vissa andra läkemedel. Berätta därför för din läkare om du använder läkemedel av följande typ:

- sympatomimetiska läkemedel
- tricykliska antidepressiva medel
- MAO-hämmare.

## **Dosering**

1-2 droppar Visclear i vardera ögat 2–3 gånger per dygn.

*Barn:* en droppe 2–3 gånger per dygn.

## **Bruksanvisning**

Börja med att tvätta händerna. Böj huvudet bakåt och drag med fingret ned det nedre ögonlocket så att en ficka bildas. Droppa en droppe i denna ficka och slut ögat. Om du har en känsla av att hela dosen eller en del av den gick förlorad, inte nådde ögat, skall du upprepa dosen.

Se till att droppflaskans spets inte kommer i kontakt med ögat eller andra ytor. Detta förhindrar att innehållet i flaskan förorenas. Om du använder kontaktlinser skall du

ta ut dem innan du droppar läkemedlet. Sätt inte tillbaka kontaktlinserna förrän Visclear har absorberats och ögats yta återfått sin normala fuktighet.

## **Överdoser**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen.

## **Biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan även Visclear förorsaka biverkningar.

Under behandling med Visclear kan ögonen svida eller bränna, blodfyllnaden i bindehinnans blodkärl kan öka, dimsyn och irritation i bindehinnan kan utvecklas. I sällsynta fall utvecklas pupillutvidgning om preparatet används för mycket.

## **Förvaring och utgångsdatum**

Förvaras vid rumstemperatur (+15 – +25 °C).

Läkemedel i en oöppnad förpackning är hållbart fram till det utgångsdatum som anges på kartongen.

En bruten förpackning skall användas inom en månad efter det att flaskan öppnats.

Lämna in oanvänt eller föråldrat läkemedel på apoteket.

Förvaras oåtkomligt för barn.

**Datum för senaste revidering av bipacksedel: 2.12.2009**

Så här öppnar du flaskan:

1. Riv av förseglingsremsan runt locket helt och hållet.

2. Dra åt locket så att piggen på lockets undersida punkterar flaskan.