

## **Pakkausseloste: Tietoa potilaalle**

### **Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletit** pantopratsoli

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Pantoprazole ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pantoprazole ratiopharm enterotabletteja
3. Miten Pantoprazole ratiopharm enterotabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Pantoprazole ratiopharm enterotablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Pantoprazole ratiopharm on ja mihin sitä käytetään**

Pantoprazole ratiopharm -lääkkeen vaikuttavan aineen nimi on pantopratsoli.

Pantopratsoli on ns. selektiivinen protonipumpun estäjä, joka vähentää mahalaukussa muodostuvan hapon määrää. Sillä hoidetaan liialliseen haponeritykseen liittyviä vatsan ja suoliston sairauksia.

*Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletit on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden nuorten:*

- ruokatorven refluksisairauteen liittyvien oireiden (esim. närästys, happaman mahansisällön nousu ruokatorveen, nielemiskivut) hoitoon. Sairauden aiheuttaa happaman mahalaukun sisällön nouseminen ruokatorveen, ja siihen saattaa joskus liittyä lievä ruokatorven tulehdus.
- ruokatorven refluksitulehduksen (johon liittyy happaman mahansisällön nousua ruokatorveen) pitkäaikaishoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn.

*Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletit on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla:*

- tulehduskipulääkkeiden (NSAID-lääkkeiden, kuten ibuprofeenin) aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen ehkäisyyn riskipotilailla, jotka tarvitsevat jatkuvaa tulehduskipulääkehoitoa.

Pantopratsolia, jota Pantoprazole ratiopharm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

## 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pantoprazole ratiopharm enterotabletteja

### Älä käytä Pantoprazole ratiopharm enterotabletteja

- jos olet allerginen pantopratsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos olet allerginen muita protonipumpun estäjiä sisältäville lääkkeille.

### Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Pantoprazole ratiopharm enterotabletteja,

- jos sinulla on vaikeita maksavaivoja. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on joskus aiemmin ollut maksavaivoja. Hän seuraa maksaentsyymiarvojesi tavallista useammin, erityisesti jos käytät Pantoprazole ratiopharm enterotabletteja pitkään. Jos maksaentsyymiarvot suurenevät, hoito pitää lopettaa.
- jos tarvitset tulehduskipulääkitystä jatkuvasti ja käytät myös Pantoprazole ratiopharm enterotabletteja, koska vatsa- ja suolistokomplikaatioiden riskisi on suurentunut. Riskin suureneminen arvioidaan henkilökohtaisten riskitekijöiden, kuten ikäsi (vähintään 65 vuotta), aiempien maha- tai pohjukaissuolihaavojen ja maha- tai suolistoverenvuodon, perusteella.
- jos elimistösi B<sub>12</sub>-vitamiinivarastot ovat vähentyneet tai sinulla on B<sub>12</sub>-vitamiinia vähentäviä riskitekijöitä ja käytät pitkäaikaista pantopratsolihoitoa. Kuten kaikki haponeritystä vähentävät lääkkeet, myös pantopratsoli voi vähentää B<sub>12</sub>-vitamiinin imeytymistä elimistöön
- jos käytät jotakin HIV-proteasasin estäjää, kuten atatsanaviiria (käytetään HIV-infektion hoitoon), sisältävää lääkettä samanaikaisesti pantopratsolin kanssa, kysy neuvoa lääkäriltäsi
- jos käytät protonipumpun estäjää (kuten Pantoprazole ratiopharmia) pitkään ja etenkin, jos käytät tällaista lääkettä yli vuoden ajan, sillä riskisi saada lonkka-, ranne- tai selkärankamurtuma voi olla hieman tavallista suurempi. Kerro lääkärille, jos sinulla on osteoporoosi tai jos käytät kortikosteroideja (sillä nämä lääkkeet voivat suurentaa osteoporoosiriskiä)
- jos olet menossa tiettyyn verikokeeseen (kromograniini A)
- jos sinulla on joskus ollut jokin ihoreaktio, joka on liittynyt Pantoprazole ratiopharmin kaltaisen mahahapon erittymistä vähentävään lääkkeeseen käyttöön.
- Jos sinulle kehittyi ihottuma etenkin auringonvalolle alttiille ihoalueelle, kerro siitä lääkärille mahdollisimman pian, koska hoito Pantoprazole ratiopharmilla voidaan joutua lopettamaan. Muista mainita myös muut sairauden oireet kuten nivelkipu.

**Kerro lääkärillesi välittömästi**, jos huomaat joitakin seuraavista oireista joko ennen lääkkeen käytön aloittamista tai sen jälkeen, sillä nämä oireet voivat olla merkki jostakin toisesta, vakavammasta sairaudesta:

- tahaton painonlasku
- oksentelu, etenkin jos se on toistuvaa
- verioksenukset, jotka voivat ilmetä kahviporon näköisenä oksennuksena
- verta ulosteissa, mikä saattaa ilmetä mustina tai tervamaisen tahmean oloisina ulosteina
- nielemisvaikeudet tai -kipu
- kalpeus ja heikotus (anemia)
- rintakivut
- vatsakivut
- vaikea ja/tai sitkeä ripuli, sillä Pantoprazole ratiopharm enterotablettien käyttöön on liittynyt tulehdusripulin vähäistä lisääntymistä.

Lääkärisi saattaa olla sitä mieltä, että tarvitset lisätutkimuksia, joilla suljetaan pois pahanlaatuinen sairaus. Pantopratsoli lievittää myös syövän oireita ja saattaa siis viivyttää syöpädiagnoosin tekoa. Jos oireet jatkuvat hoidosta huolimatta, lisätutkimuksien tekemistä harkitaan.

Jos käytät Pantoprazole ratiopharm -lääkettä yli kolmen kuukauden ajan, magnesiumpitoisuus veressäsi saattaa laskea. Alhainen magnesiumpitoisuus voi aiheuttaa oireita, kuten uupumusta, tahattomia lihassupistuksia, sekavuutta, kouristuksia, huimausta ja tavallista nopeampaa sydämen sykettä. Jos saat näitä oireita, kerro heti asiasta lääkärille. Alhaiset magnesiumpitoisuudet voivat myös johtaa kalium- tai kalsiumpitoisuuksien laskuun. Lääkäri voi haluta seurata magnesiumarvojesi säännöllisin verikokein.

Jos käytät Pantoprazole ratiopharm enterotabletteja pitkään (yli vuoden ajan), lääkärisi haluaa todennäköisesti seurata vointiasi säännöllisesti. Ilmoita aina lääkärillesi kaikista uusista ja poikkeavista oireista ja olosuhteista.

#### *Lapset ja nuoret*

Pantoprazole ratiopharm -lääkkeen käyttöä ei suositella lasten hoidossa, sillä lääkkeen vaikutusta alle 12-vuotiailla lapsilla ei ole osoitettu.

#### **Muut lääkevalmisteet ja Pantoprazole ratiopharm**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Pantoprazole ratiopharm saattaa vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon, joten kerro lääkärillesi, jos käytät

- muita lääkkeitä, kuten ketokonatsolia, itrakonatsolia ja posakonatsolia (käytetään sieni-infektioiden hoitoon) tai erlotinibiä (käytetään tiettyjen syöpien hoitoon), sillä Pantoprazole ratiopharm saattaa estää näiden ja muiden lääkkeiden kunnollisen vaikutuksen
- varfariinia ja fenprokumonia, jotka vaikuttavat veren hyytymiseen tai ohenemiseen. Sinulle on ehkä tehtävä lisätutkimuksia.
- HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten atatsanaviiria
- metotreksaattia (esim. nivelreuman, psoriaasin tai syövän hoitoon); jos käytät metotreksaattia, lääkärin voi olla tarpeen tilapäisesti keskeyttää pantopratsolihoitosi, sillä pantopratsoli saattaa suurentaa metotreksaattipitoisuutta veressäsi.
- fluvoksamiinia (masennuksen ja muiden psyykkisten sairauksien hoitoon); jos käytät fluvoksamiinia, lääkäri tulee mahdollisesti pienentämään Pantoprazole ratiopharm -annostasi.
- rifampisiinia (infektiolääke).
- mäkikuismaa (*Hypericum perforatum*; lievän masennuksen hoitoon).

#### **Raskaus ja imetys**

Ei ole olemassa riittäviä tietoja pantopratsolin käytöstä raskaana oleville naisille. Valmisteen on raportoitu erittyvän rintamaitoon.

Jos olet raskaana tai imetat, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käytä tätä lääkettä vain siinä tapauksessa, että lääkärin mielestä sinulle koitua hyöty on suurempi kuin syntymättömälle tai imetettävänä olevalle lapsellesi aiheutuva riski.

#### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Pantoprazole ratiopharm -lääkkeellä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Jos sinulle tulee haittavaikutuksia, kuten huimausta tai näköhäiriöitä, älä aja autoa äläkä käytä koneita.

Lääke voi siis heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko

pakkauseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

### **3. Miten Pantoprazole ratiopharm enterotabletteja käytetään**

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

#### **Antotapa**

Ota tabletit tuntia ennen ateriaa ja niele ne kokonaisena veden kera. Älä pureskele tai riko tabletteja.

Suositteltu annos on:

#### Aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille

*Ruokatorven refluksisairauteen liittyvien oireiden (esim. närästys, happaman mahansisällön nousu ruokatorveen, nielemiskivut) hoitoon*

Suositteltu annos on yksi tabletti (20 mg) vuorokaudessa. Tämä annos lievittää oireita tavallisesti 2–4 viikossa, viimeistään seuraavan neljän viikon kuluessa. Lääkäri kertoo, kuinka pitkään lääkkeen käyttöä pitää jatkaa. Tämän jälkeen uusiutuvia oireita voidaan hoitaa ottamalla tarvittaessa yksi tabletti (20 mg) vuorokaudessa.

*Ruokatorven refluksitulehduksen pitkäaikaishoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn*

Suositteltu annos on yksi tabletti (20 mg) vuorokaudessa. Jos sairaus uusiutuu, lääkärisi voi kaksinkertaistaa annoksen. Tällöin otetaan yksi Pantoprazole ratiopharm 40 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa. Oireiden häviämisen jälkeen annoksen voi pienentää takaisin yhteen 20 mg:n tablettiin kerran vuorokaudessa.

#### Aikuiset

*Maha- ja pohjukaissuolihaavojen ehkäisy, kun potilas tarvitsee jatkuvaa tulehduskipulääkehoitoa*

Suositteltu annos on yksi tabletti (20 mg) vuorokaudessa.

#### Potilaat, joilla on jokin maksavaiva:

Jos sinulla on vakavia maksavaivoja, ota korkeintaan yksi 20 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa.

#### *Käyttö lapsille ja nuorille:*

Näiden tablettien käyttöä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

#### **Jos otat enemmän Pantoprazole ratiopharm enterotabletteja kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus ei aiheuta tunnettuja oireita.

#### **Jos unohdat ottaa Pantoprazole ratiopharm enterotabletin**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava annos normaalisti tavanomaiseen aikaan.

#### **Jos lopetat Pantoprazole ratiopharm enterotablettien käytön**

Älä lopeta näiden tablettien käyttöä keskustelematta ensin asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

#### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

**Jos sinulle tulee joitakin alla mainituista haittavaikutuksista, lopeta heti näiden enterotablettien käyttö ja kerro asiasta lääkärille, tai ota yhteyttä lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikkaan:**

- *Vakavat allergiset reaktiot* (harvinaisia eli voivat esiintyä enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä tuhannesta): kielen ja/tai kurkun turvotus, nielemisvaikeudet, ihopaukammat (nokkosihottuma), hengitysvaikeudet, allerginen kasvojen turvotus (Quincken edeema / angioedeema), vaikea heitehuimaus, johon liittyy hyvin nopea sydämensyke ja runsasta hikoilua.
- *Vakavat ihovaivat* (esiintymistiheys tuntematon eli saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin): ihorakkulat ja yleisen voinnin nopea heikkeneminen, silmien, nenän, suun/huulten tai sukupuolielinten pinnalliset haavaumat (myös lievä verenvuoto) (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, Lyellin oireyhtymä, *erythema multiforme*) ja valoyliherkkyys.
- *Muita vakavia tiloja* (esiintymistiheys tuntematon eli saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin): ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus (vaikea maksasolujen vaurio) tai kuume, ihottuma ja munuaisten suureneminen, johon joskus liittyy virtsaamiskipua ja alaselkäkipua (vakava munuaistulehdus) ja joka mahdollisesti voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan.

#### **Muita haittavaikutuksia:**

- *Yleiset* (enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä kymmenestä) mahalaukun hyvänlaatuiset polyypit.
- *Melko harvinaiset* (enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä sadasta) päänsärky, heitehuimaus, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, vatsan turpoaminen ja ilmavaivat, ummetus, suun kuivuminen, kipu ja epämiellyttävä tunne vatsassa, ihottuma, rokkoihottuma, ihottuman puhkeaminen, kutina, heikotuksen, uupumuksen tai yleisen huonovointisuuden tunne, unihäiriöt, lonkan, ranteen tai selkärangan murtuma.
- *Harvinaiset* (enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä tuhannesta) makuu- ja näköaistimusten muutokset tai makuu- ja näköaistin puutos, näköhäiriöt, kuten näön hämärtyminen, ihopaukammat, nivelkipu, lihaskipu, painon muutokset, lämmön nousu, korkea kuume, turvotus raajoissa (ääreisturvotus), allergiset reaktiot, masennus, rintojen suureneminen miehillä.
- *Hyvin harvinaiset* (enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta) ajan ja paikan tajun hämärtyminen (desorientaatio).
- *Esiintymistiheys tuntematon* (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin) hallusinaatiot, sekavuus (erityisesti, jos potilaalla on aiemmin ollut näitä oireita), natriumin määrän väheneminen veressä, magnesiumin määrän väheneminen veressä (ks. kohta 2), kalsiumin määrän väheneminen veressä (pienentyneeseen magnesiumin määrään liittyen), kaliumin määrän väheneminen veressä, elektrolyyttihäiriöistä johtuvat lihaskouristukset, kihelmöinti, pistely, polttava tunne tai puutumiset, ihottuma sekä mahdollinen siihen liittyvä nivelkipu.

### **Verikokeissa todettuja haittavaikutuksia:**

- *Melko harvinaiset* (enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä sadasta) maksaentsyymiarvojen suureneminen.
- *Harvinaiset* (enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä tuhannesta) bilirubiiniarvon suureneminen, veren rasva-arvojen suureneminen, jyrkkä pudotus kiertävien valkosolujen määrässä korkean kuumeen kera.
- *Hyvin harvinaiset* (enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta) verihiutaleiden määrän väheneminen, joka voi aiheuttaa tavallista helpommin verenvuotoa tai mustelmia, valkosolujen määrän väheneminen, joka voi aiheuttaa tavallista helpommin tulehduksia, samanaikainen normaalista poikkeava veren puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden määrän väheneminen.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
FI-00034 Fimea.

## **5. Pantoprazole ratiopharm enterotablettien säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainolevyssä, HDPE-purkin etiketissä tai ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

#### *HDPE-purkki:*

Pantoprazole ratiopharm enterotabletit on käytettävä 100 päivän kuluessa purkin ensimmäisestä avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Pantoprazole ratiopharm sisältää**

Vaikuttava aine on pantopratsoli. Yksi enterotabletti sisältää 20 mg pantopratsolia (natriumseskvihydraattina).

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: dinatriumfosfaatti, mannitoli, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, natriumtärkkelysglykolaatti.

Tabletin päällyste: metakryylihapo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1), keltainen rautaoksidi (E172), trietyylisitraatti.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletti on keltainen, soikea tabletti alumiinisissa läpipainopakkauksissa, joissa on 7, 14, 15, 28, 30, 50x1, 56, 90, 98, 100 tai 120 tablettia, tai HDPE-purkissa, jossa on lapsiturvallinen suljin ja 14, 28 tai 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### **Myyntiluvan haltija ja valmistajat**

#### *Myyntiluvan haltija*

Teva Sweden AB

Box 1070

SE-251 10 Helsingborg

Ruotsi

#### *Valmistajat*

Teva Pharma S.L.U.

Poligono Industrial Malpica

Calle C, Numero 4

50016 Zaragoza, Espanja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen, Unkari

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, UK

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem, Alankomaat

*Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:*

ratiopharm Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.2.2019**

## **Bipacksedel: Information till patienten**

### **Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletter**

pantoprazol

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Pantoprazole ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazole ratiopharm
3. Hur du tar Pantoprazole ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pantoprazole ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Pantoprazole ratiopharm är och vad det används för**

Pantoprazole ratiopharm innehåller pantoprazol som aktiv substans.

Pantoprazol är en selektiv protonpumpshämmare, ett läkemedel som minskar mängden syra som bildas i magsäcken. Det används för behandling av magtarmsjukdomar, som är orsakade av magsyra.

*Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletter används hos vuxna och ungdomar över 12 år för:*

- behandling av symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning) förknippade med refluxsjukdom orsakade av återflöde av syra från magsäcken upp i matstrupen.
- långtidsbehandling och förebyggande av återfall av refluxesofagit (matstrupsinflammation).

*Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletter används hos vuxna som:*

- förebyggande behandling av sår i tolvfingertarmen och magsäcken orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs, t.ex. ibuprofen) hos riskpatienter som behöver långtidsbehandling med dessa läkemedel.

Pantoprazol som finns i Pantoprazole ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazole ratiopharm**

**Ta inte Pantoprazole ratiopharm**

- om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du är allergisk mot läkemedel som innehåller andra protonpumpshämmare.



## Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pantoprazole ratiopharm

- om du har allvarliga leverproblem. Tala om för din läkare om du någon gång haft leverproblem. Han kommer att kontrollera dina leverenzymvärden regelbundet, framför allt om du tar Pantoprazole ratiopharm som långtidsbehandling. Om förhöjda leverenzymvärden uppkommer ska behandlingen avslutas.
- om du fortlöpande behöver ta läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och får Pantoprazole ratiopharm kan du få en ökad risk att utveckla magtarmkomplikationer. Din läkare kommer att ta ställning till om du löper ökad risk utifrån dina egna riskfaktorer som din ålder (65 år eller äldre), om du haft magsår eller duodenalsår eller magtarmblödningar.
- om du har brist på eller har ökade riskfaktorer för brist på vitamin B<sub>12</sub> och får pantoprazol som långtidsbehandling. Som med alla läkemedel som hämmar magsyra, kan pantoprazol leda till att kroppens upptag av vitamin B<sub>12</sub> minskas.
- om du samtidigt tar någon HIV-proteashämmare som t.ex. atazanavir (för behandling av HIV-infektion), rådgör med din läkare
- om du tar någon protonpumpshämmare (t.ex. Pantoprazole ratiopharm) under en längre tid, och speciellt om du tar det i mer än ett år, eftersom detta kan orsaka en lätt ökning av risken för höft-, handleds- eller kotfrakturer. Tala om för läkare om du har osteoporos eller använder kortikosteroider (dessa kan öka risken för osteoporos).
- om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A)
- om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoprazole ratiopharm som minskar magsyran.
- Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazole ratiopharm. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

**Tala omedelbart om för din läkare** om du märker något av följande symtom före eller efter att du har tagit detta läkemedel, eftersom dessa kan vara tecken på någon annan, allvarligare sjukdom:

- oavsiktlig viktninskning
- kräkningar, speciellt om de är upprepade
- blodiga kräkningar, vilket kan se ut som kaffesump
- blodig avföring, som kan vara svart eller se ut som tjära
- sväljsvårigheter eller smärta då du sväljer
- du är blek och känner dig svag (anemi)
- bröstsmärtor
- magont
- svår och/eller ihållande diarré, eftersom Pantoprazole ratiopharm har förknippats med en liten ökning av smittsam diarré.

Din läkare kan vilja göra vissa tester för att utesluta att du lider av en tumörsjukdom. Pantoprazol kan nämligen lindra cancersymtom och därför göra att det tar längre tid innan korrekt diagnos ställs. Om symtomen fortsätter trots behandlingen kan det bli nödvändigt med ytterligare undersökningar.

Om du tar Pantoprazole ratiopharm i mer än 3 månaders tid, kan magnesiumhalten i ditt blod eventuellt sjunka. En låg magnesiumhalt kan orsaka utmattning, ofrivilliga muskelsammandragningar, förvirring, kramper, yrsel och ökad puls. Tala genast om för läkare om du får något av dessa symtom. En låg magnesiumhalt kan också leda till sänkta halter av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan bestämma sig för att följa upp dina magnesiumvärden med jämna mellanrum.

Om du tar Pantoprazole ratiopharm 20 mg som långtidsbehandling (längre än ett år) kommer troligen din läkare att undersöka dig regelbundet. Berätta för din läkare om du får nya ovanliga symtom eller hälsoproblem som du inte har haft tidigare.

### *Barn och ungdomar*

Pantoprazole ratiopharm rekommenderas inte till barn, eftersom effekt inte påvisats hos barn under 12 år.

### **Andra läkemedel och Pantoprazole ratiopharm**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Pantoprazole ratiopharm kan påverka effekten av andra läkemedel, så informera din läkare om du tar:

- läkemedel som ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (används för behandling av svampinfektioner) eller erlotinib (används för behandling av vissa cancertyper) eftersom Pantoprazole ratiopharm kan påverka dessa och andra läkemedels effekter.
- warfarin och fenprokumon, vilka är blodförtunnande läkemedel och påverkar blodkoagulationen (antikoagulantia). Om nödvändigt bör din läkare kontrollera din blodkoagulation oftare.
- läkemedel för behandling av HIV-infektion, såsom atazanavir
- metotrexat (för behandling av ledgångsreumatism, psoriasis eller cancer), eftersom läkaren i så fall tillfälligtvis kan behöva avbryta din behandling med pantoprazol, då detta läkemedel kan öka halten av metotrexat i blodet.
- fluvoxamin (för behandling av depression och andra psykiska besvär); om du tar fluvoxamin kan läkaren minska dosen av pantoprazol.
- rifampicin (för behandling av infektioner).
- Johannesört (*Hypericum perforatum*, för behandling av lindrig depression).

### **Graviditet och amning**

Det finns begränsad mängd data från användning av pantoprazol under graviditet. Det har rapporterats att pantoprazol utsöndras i bröstmjolk.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd detta läkemedel endast om läkaren anser att den nytta du får av behandlingen är större än den möjliga risk behandlingen kan utgöra för ditt ofödda barn eller ditt barn som ammas.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Pantoprazole ratiopharm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Om du får biverkningar som yrsel och synstörningar bör du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **3. Hur du tar Pantoprazole ratiopharm**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **Administreringsätt**

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vatten en timme före måltid. Tabletterna ska ej tuggas eller krossas.

Rekommenderad dos är följande:

### Vuxna och ungdomar över 12 år

*Behandling av symtom förknippade med refluxsjukdom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning)*

Rekommenderad dos är en tablett (20 mg) dagligen. Denna dos ger vanligen lindring inom 2 - 4 veckor – i bästa fall efter ytterligare 4 veckor. Din läkare talar om hur länge du ska ta läkemedlet. Därefter kan återkommande symtom behandlas efter behov med en tablett (20 mg) dagligen.

*Långtidsbehandling och förebyggande av återfall av matstrupsinflammation (refluxesofagit)*

Rekommenderad dos är en tablett (20 mg) dagligen. Läkaren kan öka dosen till det dubbla om symtomen återkommer, och då kan du istället ta Pantoprazole ratiopharm 40 mg enterotabletter. När matstrupsinflammationen är utläkt kan dosen reduceras till 20 mg pantoprazol igen.

### Vuxna

*Förebyggande behandling av sår i tolvfingertarmen och magsäcken orsakade av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)*

Rekommenderad dos är en tablett (20 mg) dagligen.

*Patienter med leverbesvär:*

Om du allvarliga leverproblem, bör du inte ta mer än en tablett (20 mg) dagligen.

*Användning för barn och ungdomar:*

Dessa tabletter rekommenderas ej till barn under 12 år.

### **Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazole ratiopharm**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det finns inga kända symtom på överdosering.

### **Om du har glömt att ta Pantoprazole ratiopharm**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa, vanliga dos, nästa dag vid vanlig tidpunkt.

### **Om du slutar att ta Pantoprazole ratiopharm**

Sluta inte att ta medicinen utan att först diskutera med läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

**Om du får någon av följande biverkningar ska du omedelbart sluta ta dessa enterotabletter och kontakta läkare eller uppsöka akutavdelningen på närmaste sjukhus:**

- *Allvarliga allergiska reaktioner* (sällsynta; kan förekomma hos upp till 1 användare av 1 000): svullnad i tungan och/eller halsen, sväljsvårigheter, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftiga svettningar.
- *Allvarliga hudtillstånd* (ingen känd frekvens; frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data): blåsor på huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, hud- och slemhinneförändringar (inklusive blödningar) i ögonen, näsan, munnen/läpparna eller könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, *erythema multiforme*) och ljuskänslighet.
- *Andra allvarliga tillstånd* (ingen känd frekvens; frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data): hud och ögonvitor får en gulaktig ton (svåra levercellsskador, gulsot) eller feber, utslag och förstörade njurar ibland med smärtsam urinering och smärta i nedre delen av ryggen (allvarlig inflammation i njurarna); kan möjligtvis leda till njursvikt.

**Andra biverkningar är:**

- *Vanliga* (hos högst 1 användare av 10) godartade polyper i magsäcken.
- *Mindre vanliga* (hos högst 1 användare av 100) huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, uppkördhet och gasbildning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, hudrodnad, blåsor, klåda, svaghetskänsla, utmattning eller allmän sjukdomskänsla, sömnstörningar, höft-, handleds- eller kotfrakturer.
- *Sällsynta* (hos högst 1 användare av 1 000) förändrade smakupplevelser eller förlorat smaksinne, synstörningar, däribland dimsyn, nässelutslag, ledvärk, muskelsmärta, viktförändringar, feber, hög feber, svullna ben eller armar (perifert ödem), allergiska reaktioner, depression, bröstförstoring hos män.
- *Mycket sällsynta* (hos högst 1 användare av 10 000) desorientering.
- *Ingen känd frekvens* (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data) hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft dessa symtom), minskade natriumhalter i blodet, sänkt magnesiumhalt i blodet (se avsnitt 2), sänkt kalciumhalt i blodet (i samband med en sänkt magnesiumhalt), sänkt kaliumhalt i blodet, muskelspasmer till följd av elektrolytrubbningar, stickningar, brännande känsla, myrkrypningar eller domningar, hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

**Biverkningar som upptäcks med hjälp av blodprover:**

- *Mindre vanliga* (hos högst 1 användare av 100) förhöjda levervärden.
- *Sällsynta* (hos högst 1 användare av 1 000) förhöjt bilirubin, förhöjda blodfetter, kraftig sänkning av antalet granulocyter (viss typ av vita blodkroppar) i blodet tillsammans med hög feber.
- *Mycket sällsynta* (hos högst 1 användare av 10 000) minskat antal blodplättar, vilket kan leda till fler blödningar eller blåmärken än normalt; minskat antal vita blodkroppar, vilket kan leda till fler infektioner, samtidigt onormalt minskat antal röda och vita blodkroppar samt blodplättar.

## Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea.

## 5. Hur Pantoprazole ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterskivan, HDPE-burken eller ytterkartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

*HDPE-tablettburken:*

Pantoprazole ratiopharm enterotabletterna ska användas inom 100 dagar efter att burken öppnats för första gången.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pantoprazol. Varje enterotablett innehåller 20 mg pantoprazol (som natriumseskvihydrat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: dinatriumfosfat, mannitol, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, natriumstärkelseglykolat.

Tablettdragring: metakrylsyra-etylakrylatsampolymer, gul järnoxid (E172), trietylцитrat.

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletter är ovala gula tabletter och tillhandahålls i aluminiumblisterförpackningar med 7, 14, 15, 28, 30, 50x1, 56, 90, 98, 100 eller 120 tabletter eller HDPE-burkar med barnsäker förslutning med 14, 28 eller 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

*Innehavare av godkännande för försäljning*

Teva Sweden AB

Box 1070

SE-251 10 Helsingborg

Sverige

*Tillverkare*  
Teva Pharma S.L.U.  
Poligono Industrial Malpica  
Calle C, Numero 4  
50016 Zaragoza, Spanien

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company  
Pallagi út 13  
4042 Debrecen, Ungern

TEVA UK Ltd  
Brampton Road, Hampden Park  
Eastbourne, East Sussex,  
BN22 9AG, Storbritannien

Pharmachemie B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem, Nederländerna

*Övriga upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:*

ratiopharm Oy  
PB 67  
02631 Espoo  
Tel: 020 180 5900

**Denna bipacksedel ändrades senast den 8.2.2019**