

Pakkaus seloste: Tie toa käyttäjälle

Lamisil 1 % emulsiovoide

terbinafiinhdrokloridi

Lue tämä pakkaus seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvooja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän kuluessa tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Lamisil-emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lamisil-emulsiovaidetta
3. Miten Lamisil-emulsiovaidetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Lamisil-emulsiovoiteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lamisil-emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

Lamisil-emulsiovaidetta käytetään jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoitoon. Se vaikuttaa tappamalla iho-oireita aiheuttavan sieniin.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muuhun käyttöaiheeseen.

Käännny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi 14 päivän kuluessa tai jos tunnet olosi huonommaksi.

Jos et ole varma johtuvatko vaivasi jalkasilsasta, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen saadaksesi neuvooja ennen Lamisil-emulsiovoiteen käyttämistä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lamisil-emulsiovaidetta

Älä käytä Lamisil-emulsiovaidetta

- jos olet allerginen terbinafiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Kerro lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle, jos tämä koskee sinua äläkää käytä Lamisil-emulsiovaidetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Lamisil-emulsiovaidetta.

- Käytä vain ulkoisesti.
- Älä laita valmistetta suuhun tai niele sitä.

Emulsiovoide voi ärsyttää silmiä. Jos lääkettä vahingossa joutuu silmiin, huuhtele silmät huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos ärsytys silmissä jatkuu, ota yhteyttä lääkäriin.

Paikallisesti iholle käytettäviä terbinafiinivalmisteita, kuten Lamisil-emulsiovoidetta, ei ole tarkoitettu kynsisienen hoitoon. Jos epäilet, että sinulla on kynsisiemi (esim. kyntesi väri on muuttunut tai kynsi on paksuuntunut), käänny lääkärin puoleen.

Lapset ja nuoret

Alle 12-vuotiaiden lasten ei pidä käyttää Lamisil-emulsiovoidetta.

Muut lääkevalmis teet ja Lamisil-e emulsiovoide

Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Älä käytä hoidettavalla alueella muita lääkkeitä tai hoitoja (myöskään ilman reseptiä saatavia itsehoitovalmisteita) samaan aikaan Lamisil-emulsiovoiteen kanssa.

Raskaus, imetyks ja he de lmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lamisil-emulsiovoidetta ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeellista.

Älä käytä Lamisil-emulsiovoidetta imetysaikana. Lääkeainetta saattaa kulkeutua rintamaitoon. Älä päästä imeväisiä kosketukseen Lamisililla hoidetun ihoalueen kanssa, rintojen iho mukaanlukien.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Lamisil-emulsiovoiteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita.

Lamisil-e emulsiovoide sisältää bentsyylialkoholia, setyylylalkoholia ja stearyylialkoholia

Tämä lääkevalmiste sisältää 10 mg/g bentsyylialkoholia. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

Setyylylalkoholi ja stearyylialkoholi saattavat aiheuttaa paikallisia iholeaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3. Miten Lamisil-emulsiovoidetta käytetään

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkikenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Miten usein ja kuinka kauan emulsiovoidetta levitetään

Tavallinen annos aikuisille ja 12 vuotta täyttäneille lapsille ja nuorille:

Kerran päivässä viikon ajan.

Jos lääke on lääkärin määräämä, noudata hänen antamiaan ohjeita, jotka ovat apteekissa kirjoitetussa ohjelipussa.

Käyttöohjeet

- Puhdista ja kuivaa hoidettava ja sitä ympäröivä ihoalue huolellisesti ennen Lamisil-emulsiovoiteen levittämistä ja pese kädet.
- Kierrä korkki auki ja jos käytät emulsiovoidetta ensimmäistä kertaa, puhkaise putkilon suu korkin terävällä päällä.
- Levitä emulsiovoidetta ohuena kerroksena ihottuma-alueelle ja sitä ympäröivälle iholle ja hiero kevyesti ihoon.
- Kierrä korkki takaisin putkiloon.
- Pese kädet Lamisil-emulsiovoiteen levittämisen jälkeen, koska infektio saattaa muutoin levitä toiselle ihoalueelle tai muihin ihmisiin.

Emulsiovoide on väritön iholla. Se ei värjää vaatteita ja voidaan pestä pois vedellä ja saippualla.

Jos hoidat ihopoimussa sijaitsevaa infektiota, voit peittää hoidetun alueen sideharsolla, etenkin yön ajaksi. Jos peität alueen sideharsolla, vaihda siihen uusi sideharso aina emulsiovoiteen levittämisen yhteydessä.

Käytä emulsiovoidetta suositellun hoitojakson ajan, vaikka oireet häviäisivät muutamassa päivässä. Sieni-infektio näyttää paranevan muutaman päivän jälkeen, mutta saattaa uusiutua jos Lamisil-emulsiovoidetta ei käytetä säännöllisesti tai hoito lopetetaan liian aikaisin.

Lamisil-emulsiovoiteen pitäisi alkaa helpottaa oireita muutamassa päivässä. Voiteen hoitava vaikutus säilyy myös hoitojakson loputtua.

Jos oireet eivät ala hävitä kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta, käänny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen saadaksesi neuvoja.

Hoitoa edistäviä tekojöitä

- Pidä hoidettava ihoalue puhtaana pesemällä se säännöllisesti. Kuivaa ihoalue hyvin, mutta älä hankaa sitä vaan taputtele kevyesti. Vaikka iho saattaa kutista, yrity olla raapimatta sitä, koska siitä voi aiheuttaa lisähaittaa ja se voi hidastaa paranemista tai levittää infektiota.
- Käytä omaa pyyhettä ja omia vaatteitasi lääkä anna toisten käyttää niitä, koska tällaiset infektiot voivat tarttua helposti. Pese vaatteesi ja pyyhkeesi usein vältyväksesi infektion uusiutumiselta.

Jos käytät enemmän Lamisil-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos sinä tai joku muu henkilö vahingossa nielee Lamisil-emulsiovoidetta, *ota aina yhteys lääkäriin tai Myrkyystietokeskukseen (p. 0800 147 111)*.

Jos unohdat käyttää Lamisil-emulsiovoidetta

Jos unohdat levittää emulsiovoidetta iholle, levitä sitä mahdollisimman pian ja jatka sitten hoitoa normaaliumiin tapaan. Jos muistat vasta, kun on aika levittää seuraava kerta-annos iholle, käytä emulsiovoidetta tavanomainen määrä ja jatka hoitoa sitten tavanomaiseen tapaan. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen kerta-annoksen.

Käytä emulsiovoidetta käyttöohjeen mukaisesti. Tämä on tärkeää, koska hoitokertojen poisjääminen suurentaa infektion uusiutumisriskiä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut henkilöt saattavat olla allergisia Lamisil-emulsiovoiteelle, mikä voi aiheuttaa **turvotusta ja kipua, ihottumaa tai nokkosihottumaa**. Näitä on raportoitu, mutta niiden *esiintymistäajuus on tuntematon (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella)*.

Jos sinulla on näitä oireita, **lope ta** Lamisil-emulsiovoiteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin välittömästi.

Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu

Yleiset haittavaikutukset (*voivat esiintyä yhdellä käyttäjällä kymmenestä*):
Hoidetun alueen ihmisen hilseily ja kutina.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (*voivat esiintyä yhdellä käyttäjällä sadasta*):

Ihovauriot, ihon karstoittuminen, iho-oireet, ihon värin muutokset, punaisuus, polttelu, hoidetun alueen kipu tai ärsytys.

Harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä yhdellä käyttäjällä tuhannesta):

Ihon kuivuminen, ekseema, oireiden pahaneminen, kosketusihottuma (erääänlainen ihotulehdus).

Esiintymis taajuuden tunte mottomat haittavaikutukset (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella):

Ihottuma.

Jos Lamisil-emulsiovoidetta on vahingossa joutunut silmiin, silmien ärsytystä voi esiintyä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilokunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Lamisil-emulsioiteen säilyttäminen

Ei erityisiä säilytystä koskevia määräyksiä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä läkettä pakauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Nämä menetellä suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lamisil-emulsioide sisältää

- Vaikuttava aine on terbinafinihydrokloridi. 1 gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg terbinafinihydrokloridia.
- Muut aineet ovat natriumhydroksidi, bentsyylialkoholi (säilytysaine), sorbitaanimonostearaatti, setyylipalmitaatti, setyylialkoholi, stearyylialkoholi, polysorbaatti 60, isopropyylimyristaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoko

Emulsioide on valkoista.

Lamisil-emulsiovoidetta on saatavana 15 gramman kalvopinnoitetussa alumiiniputkilossissa, jossa voi olla alumiinisinetti, tai laminoidussa LDPE-alumiini-HDPE-putkilossa, jossa on alumiini-etyleenisinetti. Putkilissa on polypropyleeniset kierrekorkit.

Myyntiluvan haltija
Karo Healthcare AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Ruotsi

Valmistaja
Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Tanska

Tämä pakausseloste on tarkistettu 01.11.2023

Bipacksedeln: Information till användaren

Lamisil 1 % kräm

terbinafinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre inom 14 dagar eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Lamisil kräm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lamisil kräm
3. Hur du använder Lamisil kräm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lamisil kräm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lamisil kräm är och vad det används för

Lamisil kräm används för behandling av fotsvamp och svampinfektion mellan tårna. Det verkar genom att döda svampen som orsakar hudproblemen.

Läkare kan ordinera krämen även för andra användningsområden.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre inom 14 dagar eller om du mår sämre.

Fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du använder Lamisil kräm om du är osäker på om dina problem verkligen orsakas av fotsvamp.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lamisil kräm

Använd inte Lamisil kräm

- om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig och använd inte Lamisil kräm.

Varngar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lamisil kräm.

- Endast avsett för utvärtes användning.
- Använd inte i munnen och svälj inte.
- Krämen kan irritera ögonen. Om kräm av misstag kommer i kontakt med ögonen, ska ögonen sköljas noga med rinnande vatten. Kontakta läkare om den störande känslan i ögat fortsätter.

Terbinafinprodukter, såsom Lamisil kräm, som används lokalt på huden är inte avsedda för behandling av svampinfektion i naglarna. Om du misstänker att du har en svampinfektion i naglarna (t.ex. missfärgning eller förtjockning av nageln), kontakta läkare.

Barn och ungdomar

Barn under 12 år får inte använda Lamisil kräm.

Andra läkemedel och Lamisil kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Applicera inte andra läkemedel eller behandlingar på det drabbade området (inklusive receptfria läkemedel) samtidigt med Lamisil.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Lamisil kräm får inte användas under graviditet om det inte är klart nödvändigt.

Använd inte Lamisil kräm när du ammar. Läkemedlet kan passera till bröstmjölk.

Spädbarn ska inte komma i kontakt med behandlat hudområde, inklusive brösthud.

Körförmåga och användning av maskiner

Användningen av Lamisil kräm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Lamisil kräm innehåller bensylalkohol, cetylalkohol och stearylalkohol

Detta läkemedel innehåller 10 mg/g bensylalkohol. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

Cetylalkohol och stearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

3. Hur du använder Lamisil kräm

Använd detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur ofta och hur länge ska krämen användas?

Vanlig dos för vuxna samt barn och ungdomar över 12 år:

1 gång dagligen under en vecka.

Om läkemedlet ordinerats av läkare, följ läkarens anvisningar som finns på apoteksetiketten.

Bruksanvisning

- Rengör och torka det drabbade hudområdet samt det omgivande hudområdet innan du applicerar Lamisil kräm och tvätta händerna.
- Skruva av korken och om det är första gången du använder krämen, perforera tubens mynning med korkens vassa ända.
- Lägg ett tunt lager kräm på och omkring det drabbade hudområdet och gnid in lätt.
- Skruva korken tillbaka på tuben.
- Tvätta händerna efter att du applicerat Lamisil krämen, annars finns det en risk att du sprider infektionen till andra delar av huden eller till andra mänskor.

Krämen är färglös på huden, färgar inte kläder och kan tvättas av med tvål och vatten.

Om du behandlar en infektion i något hudveck kan du täcka in det behandlade området med gasbinda, särskilt nattetid. Om du gör det, byt till en ny gasbinda varje gång du applicerar krämen.

Använd krämen hela den rekommenderade behandlingsperioden även om symptomen försvinner inom några dagar. Svampinfektionen verkar förbättras efter några dagar, men kan återkomma om Lamisil-kräm inte används regelbundet eller behandlingen slutas för tidigt.

Krämen bör börja lindra symtomen efter några dagar. Krämen fortsätter att fungera även efter att behandlingsperioden är slut.

Om symptomen inte börjat försvinna inom två veckor efter att behandlingen med lamisil kräm påbörjats, kontakta läkare eller apotekspersonal för råd.

För en lyckad behandling

- Håll det drabbade hudområdet rent genom att tvätta det regelbundet. Klappa huden torr omsorgsfullt men utan att gnugga. Även om huden kan klia, försök låta bli att skrapa eftersom det kan orsaka mera skada och fördöja tillfriskningsprocessen eller sprida infektionen.
- Använd separata handdukar och dina egna kläder och dela dem inte med andra eftersom infektionerna lätt kan sprida sig. Tvätta dina kläder och handdukar ofta för att skydda dig själv mot att bli återsmittad.

Om du har använt för stor mängd av Lamisil kräm

Om du eller någon annan person av misstag sväljer Lamisil kräm, *kontakta alltid läkare eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111)*.

Om du har glömt att använda Lamisil kräm

Om du glömmer att applicera kräm, applicera då genast när du märker det och fortsätt sedan behandlingen som normalt. Om du märker det först vid tiden för ditt nästa behandlingstillfälle, applicera då en normal mängd och fortsätt behandlingen som vanligt. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Använd krämen enligt anvisningarna. Detta är viktigt, eftersom uteblivna behandlingstillfällen ökar risken för att infektionen återkommer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa personer kan vara allergiska mot Lamisil kräm, vilket kan orsaka **svullnad och smärta, hudutslag eller nässelutslag**. Detta har rapporterats, men förekomstfrekvensen är okänd (*kan inte beräknas från tillgängliga data*).

Sluta använda Lamisil kräm och kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom.

Också följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga biverkningar (*kan förekomma hos en användare av 10*):
Hudfjällning och klåda vid appliceringsstället.

Mindre vanliga biverkningar (*kan förekomma hos en användare av 100*):
Skador på huden, skorv, hudsymtom, förändringar i hudens färg, hudrodnad, bränrande känsla på huden, smärta eller irritation vid appliceringsstället.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos en användare av 1 000):

Torr hud, eksem, försvårade symptom, kontakteksem (en typ av hudinflammation).

Biverkningar med okänd förekomstfrekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Utslag.

Om du av misstag får Lamisil kräm i ögonen kan irritation inträffa.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Lamisil kräm ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid. 1 g kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid.
- Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, bensylalkohol (konserveringsmedel), sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Krämen är vit.

Lamisil kräm är tillgänglig i 15 gram filmbelagd aluminiumtub, som kan ha en aluminiumförsegling, eller i laminerad LDPE-aluminium-HDPE tub med en aluminium-etylenförsegling. Båda tuberna är försedda med en skruvkork av polypropylen.

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige

Tillverkare

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Denna bipackseDEL ändrades senast 01.11.2023