

Pakkaus seloste: Tie toa käyttäjälle

DINIT® 1,25 mg/annos sumute suuonteloon, liuos

isosorbididinitraatti

Lue tämä pakkaus seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävä, käänny lääkärin tai apteekkienkilokunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisivat samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilokunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Dinit on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dinit-valmistetta
3. Miten Dinit-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dinit-valmistetta säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Dinit-valmiste on ja mielin sitä käytetään

Dinit-valmiste on sydänlääke, nitraattivalmiste (eli ”nitro”), joka vaikuttaa laajentamalla verisuonia.

Sitä käytetään äkillisen, sydänperäisen rintakipukohtauksen hoitoon ja näiden kohtausten lyhytaikaiseen ehkäisyyn. Sitä voidaan käyttää myös muun hoidon tukena sydämen vaikea-asteisen vajaatoiminnan hoitoon.

Suus umutinpallon normaalinen toiminnan varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että sumuttimeen pumpun nuppi puhdistetaan huolellisesti lämpimällä vedellä kappaleen 3 ohjeiden mukaisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Dinit-valmiste kiteytyy helposti sumuttimeen, ellei pumpun nupbia puhdisteta pakkausselosten ohjeiden mukaisesti jokaisen käyttökerran jälkeen ja kiteytyminen saattaa estää sumuttimen normaalinen toiminnan. Puhdistuksen jälkeen sumuttimen toimivuutta ei saa testata, koska sumutin voi mennä tukkoon lääkeaineen joutuessa sumutinpallon pumpun nuppiin.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dinit-valmistetta

Älä käytä Dinit-valmisteita

- jos olet allerginen isosorbididinitraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos käytät samanaikaisesti erektohäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten sildenafiliilia (Viagra®), tadalafililia (Cialis™) tai vardenafilia (Levitra®), sillä yhdessä Dinit-valmisteen kanssa käytettynä niillä on vaarallisen voimakas verenpainetta alentava vaikutus ja siksi näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on ehdottomasti kielletty
- jos sinulla on ahtauttava eli konstriktiivinen sydänpuissitulehdus
- jos sinulla on sydäntamponaatio (hengenvaarallinen tila, jossa sydänpussiin kertynyt neste estää sydämen toimintaa)
- jos sinulla on aivoverenvuoto
- jos sinulla on nestevajaus
- jos sinulla on sokki (oireena voimakas heikotus, jopa tajuttomuus, koska elimistön verenkierros on romahtanut)

- jos sinulla on matala verenpaine.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos sinulla on

- sydämen vajaatoiminta
- luonnostaan matala verenpaine
- tiettyjä sydämen läppävikoja (aortta- tai hiippaläpän ahtauma tai hiippaläpän prolapsi)
- tietynlainen sydänlihassairaus (obstruktivinen kardiomyopatia)
- keuhkosydänsairaus (cor pulmonale)
- aivoverenkiertohäiriötä
- pystyn nostessa ilmaantuvaa verenpaineen laskua eli ortostaattista hypotensiota
- taipumusta veren vähähappisuteen eli hypoksemiaan
- vaikea anemia.

Jos käytät Dinit-valmistetta ensimmäistä kertaa, asetu istumaan tai muutoin lepoon, sillä lääkkeen verisuonia laajentava vaikutus voi alentaa verenpainetta ja tällä tavoin aiheuttaa seisovalle ihmiselle huimausta tai eräissä tapauksissa jopa pyörtymisen.

Nitraatit saattavat nostaa kallonsisäistä painetta ja silmänpainetautia (glaukoomaa) sairastavilla potilailla silmänpainetta.

Varo valmisten joutumista silmiin tai kosketuksiin piilolinssien kanssa.

Muut lääkevalmisteet ja Dinit-valmiste

Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käytänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Dinit-valmisten teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkeitä samanaikaisesti. Seuraavien lääkkeiden samanaikainen käyttö Dinit-valmisten kanssa voi voimistaa sen verenpainetta alentavaa vaikutusta:

- verenpainelääkkeet
- muut verenpainetta alentavat tai verisuonia laajentavat lääkkeet (trisykliset masennuslääkkeet, erektilohäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet kuten sildenaifiili, tadalafilili tai vardenaifiili).

Migreenin ehkäisyyn ja pystyn nostessa ilmaantuvan verenpaineen laskun eli ortostaattisen hypotension hoitoon käytettävän dihydroergotamiinin ja Dinit-valmisten samanaikainen käyttö voi aiheuttaa verenpaineen nousua.

Dinit-valmiste alkoholin kanssa

Alkoholin samanaikainen käyttö Dinit-valmisten kanssa voi voimistaa sen verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Jos joudut ottamaan rintakivun vuoksi Dinit-valmistetta, on viisainta pidättäytyä samanaikaisesta autolla ajosta tai muista tarkkuutta vaativista suorituksista. Dinit-valmisten käyttö voi laskea verenpainetta ja aiheuttaa huimausta tai jopa pyörtymisen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkauselostekseen. Keskustele lääkärin tai apteekkikenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tämä lääkevalmiste sisältää 57,3 mg alkoholia (etanolia) per annos. Alkoholimäärä annoksessa tästä lääkevalmistetta vastaa alle 2 ml olutta ja 1 ml viiniä.

Tämän lääkevalmisten sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikuttuksia.

3. Miten Dinit-valmistetta käytetään

Käytä tästä lääketä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkienkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

(Katso myös oheiset kuvat.)


Dinit-valmistetta käytetään pulloon kiinnitetyn pumpun avulla. Jotta säiliöstä saatava annos olisi oikea, on pumpun nuppia painettava riittävän nopeasti ja voimakkaasti. Lisäksi pumpun nupin suuaukko on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Ennen ensimmäistä käyttöä sumuta useita kertoja ilmaan, kunnes suihku on tasainen.

Äkillisen rintakipukohtauksen sattuessa suihkauta yksi sumuteannos (1,25 mg) kielen päälle sumutepulloa pystyasennossa pitäen. Pidättele samalla hengitystä hetken aikaa. Annoksen ottamisen jälkeen sulje suu ja hengitä normaalisti. Tarvittaessa suihkeannos voidaan uusia. Suihkeiden välillä on pidettävä vähintään 30 sekunnin tauko. Suositeltu annos on 1–3 suihketta (1,25–3,75 mg). Tarvittaessa voidaan ottaa useampia suihkeita, enimmäisannos on yksilöllinen. Jos kipu pitkittyy, on syytä hakeutua ensiapupoliklinikalle hoitavan lääkärin antamien ohjeiden mukaan.


Rintakipukohtausten ehkäisy: Ota 1–3 suihketta muutamaa minuuttia ennen rasitusta, jonka tiedät saattavan aiheuttaa rintakipukohtauksen.

Sumuttime n käyttäminen:

1. Poista muovisuojuks.
2. Pidä sumutepulloa pystyasennossa ja aseta etusormesi pumpun nupin päälle.
3. Avaa suusi ja vie sumutepullo aivan suun eteen (kuva 1).



Kuva 1



Kuva 2


4. Paina pumpun nuppi nopeasti pohjaan suunnaten lääkesuihku kielen päälle. Vältä samanaikaista sisäänhengitystä (kuva 2).
5. Vapauta pumpun nuppi. Jos sumutin ei toimi normaalilla tavalla, irrota pumpun nuppi ja puhdista se lämpimällä vedellä (kts. kohta ”sumutimen puhdistaminen”). Pumpussa ei saa näkyä kiteytynyttä lääkeainetta.
6. Lisäännoksen saamiseksi toista kohdat 3, 4 ja 5.
7. **Puhdis ta sumuttime n pumpun nuppi jokaisen käyttökerran jälkeen huolellisesti lämpimällä vedellä** (kts. kohta ”sumutimen puhdistaminen”).

Sumuttime n puhdistamine n:


Irrota pumpun nuppi (=painonappi) jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä irrota sumutinpullossa kiinni olevaa pumppuosa. Jos pumppuosa irrotetaan, sumutin ei toimi enää. Puhdista pumpun nuppi huolellisesti juoksevalla lämpimällä vedellä. Nuppiin ei saa jäädä lääkeainetta. Kuivaa puhdistettu pumpun nuppi ja aseta se paikalleen. Aseta lopuksi pullon suojakorkki paikoilleen. **Puhdistamine n on erittäin tärkeää suusumutinpallon normaalilin toiminnan varmistamiseksi.** Dinit-valmiste kiteytyy helposti sumutimeen, ellei pumpun nuppia puhdisteta näiden pakkausselosten ohjeiden mukaan jokaisen käyttökerran jälkeen.

Älä testaa puhdistuksen jälkeen sumuttimen toimivuutta. Sumutin voi mennä tukkoon lääkeaineen joutuessa sumutinpallon nuppiin.


1. Irrota vain pumpun nuppi




2. Puhdista se lämpimällä vedellä



3. Kuivaa pumpun nuppi ja aseta se paikalleen



4. Älä testaa puhdistuksen jälkeen sumuttimen toimivuutta



Älä yritä avata tukkeutunutta sumutinta neulalla tai muulla terävällä esineellä, koska se vaurioittaa suusumutinpulloa, etkä saa oikeaa lääke annosta.

Jos olet ottanut enemmän Dinit-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähoidojen saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (*useammalla kuin yhdellä 10:stä*):

- päänsärky

Yleiset haittavaikutukset (*harvemmallakin kuin yhdellä 10:stä*):

- sekavuus
- huimaus, uneliaisuus
- sydämen tiheälyöntisyys
- alhainen verenpaine
- heikkouden tunne

Melko harvinaiset haittavaikutukset (*harvemmallakin kuin yhdellä 100:sta*):

- rasitusrintakivun (angina pectoris) paheneminen
- kasvojen punoitus, verenkiertohäiriöt
- pahoinvohti, oksentelu
- allergiset ihoreaktiot

Harvinaiset haittavaikutukset (*harvemmallakin kuin yhdellä 1 000:sta*):

- levottomuuks
- pyörtyminen
- sydämen harvalyöntisyys, palautuva sydämen johtumishäiriö
- methemoglobinemia

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (*harvemmallakin kuin yhdellä 10 000:sta*):

- närästys
- vakavat ihoreaktiot

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Dinit-valmisten säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C:ssa. Ei saa jäätynä.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tästä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Hävitä vanhentunut lääke pakkausineen noudattaen omassa asuinpaikkasi voimassa olevia ohjeita. Kartonkikotelot ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dinit-valmiste sisältää

Vaikuttava aine on isosorbitididitraatti.
Apuaineet ovat etanolili, glyseroli ja lääkekonejakkki.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoko

Vähintään 180 annosta suusumutetta pumpulla varustetussa alumiinisäiliössä.

Myyntiluvan haltija

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
DK-5260 Odense S
Tanska
info@orifarm.com

Valmistaja

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.05.2023

Bipacksedeln: Information till användaren

DINIT® 1,25 mg/dos-munhålespray, lösning

isosorbiddinitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipackse del finns information om följande:

1. Vad Dinit-produkt är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dinit-produkt
3. Hur du använder Dinit-produkt
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dinit-produkt ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dinit-produkt är och vad det används för

Dinit-munspray är en hjärtmedicin, ett nitratpreparat ("nitro") som verkar genom att utvidga blodkärlen.

Den används vid behandling av plötsliga anfall av hjärtrelaterade bröstsmärter och för kortfristigt förebyggande av sådana anfall. Den kan också användas som komplement till annan behandling vid behandling av svår hjärtsvikt.

För att försäkra att munsprhypumpen fungerar korrekt, är det ytterst viktigt att rengöra pumpknoppen noggrant med varmt vatten efter varje doseringstillfälle och i enlighet med instruktionerna i avsnitt 3 av denna bipacksedel. Dinit-läkemedlet kristalliseras lätt i munstycket om pumpknoppen inte rengörs i enlighet med instruktionerna i bipacksedeln efter varje doseringstillgång. Kristalliseringen kan förhindra pumpens normala funktion. Efter rengöringen får man inte testa att pumpen fungerar, eftersom den kan täppas till igen då läkemedel kommer in i sprayflaskans pumpknapp.

2. Vad du behöver veta innan du använder Dinit-produkt

Använd inte Dinit

- om du är allergisk mot isosorbiddinitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du samtidigt använder läkemedel avsedda för behandling av erekitionsstörningar, såsom sildenafil (Viagra®), tadalafil (Cialis™) eller vardenafil (Levitra®), eftersom de tillsammans med Dinit-produkt har en farligt stark blodtryckssänkande effekt och det därför är absolut förbjudet att använda dessa läkemedel samtidigt
- om du har sammandragande eller konstriktiv hjärtsäcksinflammation
- om du har hjärttamponad (ett livsfarligt tillstånd då vätska som ansamlats i hjärtsäcken hindrar hjärtverksamheten)
- om du har hjärnblödning
- om du har vätskebrist
- om du har chock (symtomet är kraftig matthet till och med medvetslöshet på grund av kollaps av blodcirkulationen i organ systemet)
- om du har lågt blodtryck.

Varningar och försiktighet

Rådgör med din läkare innan behandling med detta läkemedel om du har

- hjärtsvikt
- av naturen har lågt blodtryck
- vissa typer av klaffel i hjärtat (aortaklaffstenos eller mitralstenos eller mitralklaffsprolaps)
- en viss typ av hjärtmuskelsjukdom (obstruktiv kardiomyopati),
- lunghjärta (cor pulmonale)
- cirkulationsrubbningar i hjärnan
- blodtrycksfall som yttrar sig då du reser sig snabbt dvs. ortostatisk hypotension
- anlag för syrebrist i blodet, dvs. hypoxemi
- svår anemi.

Om du använder Dinit-produkt för första gången skall du sätta dig ned eller annars vara i viloställning, eftersom läkemedlets blodkärlsutvidgande effekt kan sänka blodtrycket och en stående person kan därför få svindel eller i vissa fall t.o.m. svimma.

Nitrater kan öka det intrakraniella trycket och det förhöjda ögontrycket hos patienter med glaukom.

Akta så att preparatet inte kommer i ögonen eller i beröring med kontaktlinser.

Andra läkemedel och Dinit-produkt

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vid samtidig användning kan effekten av vissa andra läkemedel eller Dinit-produkt ändras. Det kan också medföra biverkningar. Om du använder Dinit-produkt tillsammans med följande läkemedel kan dess blodtryckssänkande effekt förstärkas

- blodtrycksläkemedel
- andra läkemedel som sänker blodtrycket eller utvidgar blodkärlen (tricykliska depressionsmediciner, läkemedel som används för behandling av erekitionsstörningar såsom sildenafil, tadalafil och vardenafil).
- samtidig användning av dihydroergotamin, som används för behandling av blodtrycksfall som yttrar sig vid migrän eller då man reser sig snabbt dvs. vid ortostatisk hypertension, och Dinit-produkt kan höja blodtrycket.

Dinit-produkt med alkohol

Om Dinit-produkt används samtidigt med alkohol, kan detta förstärka den blodtryckssänkande effekten av Dinit-produkt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du blir tvungen att ta Dinit-produkt p.g.a. bröstsmärtor är det klokast att avstå från att samtidigt köra bil eller utföra andra uppgifter som kräver noggrannhet. Användning av Dinit-produkt kan sänka blodtrycket och förorsaka yrsel eller t.o.m. svimning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Detta läkemedel innehåller 57,3 mg alkohol (etanol) per dos. Mängden i dos av detta läkemedel motsvarar under 2 ml öl eller 1 ml vin.

Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

3. Hur du använder Dinit-produkt

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

(Se också på bilderna.)

Dinit-produkt används med hjälp av pumpen som är fäst vid flaskan. För att dosen skall vara den rätta skall du trycka på pumpknoppen tillräckligt snabbt och kraftigt. Dessutom skall pumpknoppen sprayöppning rengöras efter varje användning enligt anvisningarna nedan. Vid första användandet tryck på sprayen flera gånger tills det kommer en fin stråle.

När du drabbas av ett plötsligt anfall av bröstsmärter, spraya en dos (1,25 mg) på tungan genom att hålla flaskan i upprätt läge. Håll samtidigt andan en stund. Stäng munnen efter att du har tagit dosen och andas normalt. Vid behov kan spraydosen upprepas. Mellan sprayningarna skall du hålla en paus på minst 30 sekunder. Rekommenderad dos är 1–3 sprayningar (1,25–3,75 mg). Vid behov kan flera doser tas, den maximala dosen är individuell. Om smärtan är utdragen är det skäl att uppsöka förstahjälppoliklinik enligt den behandlande läkarens anvisningar.

För att förebygga anfall av bröstsmärter: Ta 1–3 spraydoser några minuter före en ansträngning som du vet kan medföra ett anfall av bröstsmärter.

Instruktioner för användning av spraypumpen:

1. Ta bort plastskyddet.
2. Håll sprayflaskan i upprätt läge och sätt pekfingret på pumpknoppen.
3. Öppna munnen och för sprayflaskan nära (framför) munnen (bild 1).




Bild 1





Bild 2

4. Tryck snabbt ner pumpknoppen ända i bottnen medan du riktar spraydosen mot tungan. Undvik att samtidigt andas in (bild 2).
5. Släpp pumpknoppen. Om sprayflaskan inte fungerar normalt ska du lösgöra pumpknoppen och rengöra den med varmt vatten (se avsnitt "Så här rengör du spraypumpen"). Inget kristalliserat läkemedel får synas i pumpmekanismen.
6. För en ytterligare dos, upprepa punkterna 3, 4 och 5.
7. **Rengör pumpknoppen noggrant med varmt vatten efter varje doseringstillfälle** (se avsnitt "Så här rengör du spraypumpen").

Så här rengör du spraypumpen:

Lösgör pumpknoppen (= den del du trycker på) efter varje doseringstillfälle. Ta inte loss själva pumpen som sitter fast i sprayflaskan. Om pumpen avlägsnas fungerar sprayen inte längre. Rengör pumpknoppen noggrant under rinnande, varmt vatten. Inget läkemedel får bli kvar i knoppen. Torka pumpknoppen noggrant innan du lägger tillbaka den på plats. Lägg till sist på skyddslocket. **Det är ytterst viktigt att rengöra pumpknoppen för att försäkra att sprayflaskan fungerar som den ska.** Dinit-lösningen kristalliseras lätt i spraymekanismen om pumpknoppen inte rengörs i enlighet med instruktionerna i denna bipacksedel efter varje doseringstillfälle.

Testa inte spraypumpens funktion efter att du rengjort den. Spraymekanismen kan täppas till då läkemedel åter kommer in i pumpknoppen.



Försök inte öppna en tillämppt spraymekanism med nål eller annat vasst före mål, eftersom detta kan skada munsprayflaskan och göra så att du inte får rätt mängd läkemedel.

Om du har tagit för stor mängd av Dinit-produkt

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel, kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (*hos fler än en av 10*)

- huvudvärk

Vanliga biverkningar (*hos färre än en av 10*)

- förvirring
- svindel, sömnighet
- ökad hjärtfrekvens
- lågt blodtryck
- svaghet

Mindre vanliga biverkningar (*hos färre än en av 100*)

- försämrad kärlkramp (angina pectoris)
- ansiktsrodnad, störningar i blodcirkulationen
- illamående, kräkning
- allergiska hudreaktioner

Sällsynta biverkningar (*hos färre än en av 1 000*)

- rastlöshet
- svimning
- långsam hjärtfrekvens, övergående överledningsrubbningar
- methemoglobinemi

Mycket sällsynta biverkningar (*hos färre än en av 10 000*)

- halsbränna
- allvarliga hudreaktioner

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Biverkningsregistret
PB 55
FI-00034 Fimea

5. Hur Dinit-produkt ska förvaras

Förvara under 25°C. Får ej frysa.
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om preparatet har synbart förändrats.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Vid förstöring av för gammal medicin och förpackning skall du följa de föreskrifter som gäller i din hemkommun. Kartongasken och bipacksedeln kan återvinnas.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är isosorbiddinitrat.
- Hjälpmännen är etanol, glycerol och medicinskt konjak.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

- Dinit-munspray är förpackad i en aluminiumbehållare som innehåller minst 180 doser munspray.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
DK-5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com

Tillverkare

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen

Denna bipack sedel ändrades senast 10.05.2023