

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Codetabs®-imeskelytabletti**

kokillaanankuoriuute

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

#### **Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Codetabs on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Codetabs-imeskelytabletteja
3. Miten Codetabs-imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Codetabs-imeskelytablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Codetabs on ja mihin sitä käytetään**

Codetabs-valmistetta käytetään eri syistä johtuvan yskän lyhytaikaiseen, oireenmukaiseen hoitoon.

1 imeskelytabletti sisältää 2 mg kokillaanankuoresta (*Guarea rusbyi* (Britton) Rusby) valmistettua nesteuutetta kuivana. Kokillaanankuoriuute vaikuttaa liman koostumukseen ja helpottaa tulehdukseen liittyvän liman irtoamista hengitysteistä. Lisäksi se hillitsee yskänärsytystä.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Codetabs-imeskelytabletteja**

##### **Älä käytä Codetabs-imeskelytabletteja**

jos olet allerginen kokillaanankuoriuutteelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

##### **Muut lääkevalmisteet ja Codetabs**

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä tai ravintolisiä.

Yhteisvaikutuksia ei ole todettu.

##### **Raskaus ja imetys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

## **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Valmisteella ei ole vaikutusta ajamiseen eikä koneiden käyttöön.

## **Codetabs-imeskelytabletit sisältävät sakkaroosia, glukoosisiirappia ja natriumbentsoattia**

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä valmiste sisältää 4 mikrogrammaa bentsoattia per imeskelytabletti.

Jos potilas noudattaa vähäsuolaista ruokavaliota, on hyvä ottaa huomioon, että yksi imeskelytabletti sisältää 37 mg natriumia.

### **3. Miten Codetabs-imeskelytabletteja käytetään**

Aikuisille 1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

11–15-vuotiaille 1/2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

4–10-vuotiaille 1/4 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Ei alle 4-vuotiaille.

### **Jos otat Codetabs-imeskelytabletteja enemmän kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977 riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi).

### **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutuksia ei juuri ole. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu, on niistä aina syytä ilmoittaa lääkärille.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

### **5. Codetabs-imeskelytablettien säilyttäminen**

Säilytä alle 25 °C:ssa, kuivassa paikassa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Hävitä vanhentunut lääke noudattaen omassa kunnassasi voimassa olevia ohjeita. Heitä läpipainopakkaus roskeen. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Codetabs-imeskelytabletti sisältää**

- Vaikuttava aine on kokillaanankuoresta (*Guarea rusbyi*, (Britton) Rusby) valmistettu etanolinesteute (2:1), 27 mg/tabletti. Tämä vastaa 2 mg:aa kuivattuna. Uttoliuotin 40 % V/V etanoli-vesi-seos.
- Muut aineet ovat sakkaroosi, ammoniumkloridi, talkki, natriumsyklamaatti (E 952), sokerikulööri (E 150a), magnesiumstearaatti, sakkariinatrium (E 954), mentoli (raseeminen), anisöljy ja lakritsiaromi (vesi, glyseroli, glukoosisiirappi, natriumbentsoaatti ja kaliumsorbaatti).

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko**

Ruskea, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteinen tabletti  
Tabletin halkaisija on 13 mm ja paksuus 4,3 mm.

Pakkauskoko on 20 imeskelytablettia.

### **Myyntiluvan haltija**

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

### **Valmistaja**

allphamed Pharmed Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12  
37081 Göttingen, Saksa

**Pakkausseloste on tarkistettu 17.4.2018**

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Codetabs®-sugtablett**

cocillanaskalextrakt

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Codetabs är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Codetabs
3. Hur du använder Codetabs
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Codetabs ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Codetabs är och vad det används för**

Codetabs används för kortvarig symtomatisk behandling av hosta av olika orsaker.

1 sugtablett innehåller 2 mg vätskeextrakt tillverkat av cocillanaskal (*Guarea rusbyi* (Britton) Rusby) i torr form. Cocillanaskalextrakten påverkar slemmets sammansättning och gör att slemmet i lufrören lossnar lättare i samband med infektion. Dessutom lindrar cocillanaextraktet hostretning.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Codetabs**

##### **Använd inte Codetabs**

om du är allergisk mot cocillanaskalextrakt eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

##### **Andra läkemedel och Codetabs**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eller kosttillskott.

Samverkningar har inte konstaterats.

##### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Preparatet skall inte användas under graviditet och amning.

##### **Körförmåga och användning av maskiner**

Preparatet har ingen inverkan på körförmåga eller användning av maskiner.

### **Codetabs-sugtabletter innehåller sackaros, glukossirap och natriumbensoat**

Om din läkare har berättat att du inte tål vissa sockerarter, diskutera med läkaren innan du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller 4 mikrogram bensoat per sugtablett

Om patienten följer saltreducerad kost är det bra att ta i beaktande att en sugtablett innehåller 37 mg natrium.

### **3. Hur du använder Codetabs**

För vuxna 1–2 tabletter 3–4 gånger per dygn.

För ungdomar mellan 11 och 15 år 1/2 tablett 3–4 gånger per dygn.

För barn mellan 4 och 10 år 1/4 tablett 3–4 gånger per dygn.

Inte för barn under 4 år.

### **Om du har tagit för stor mängd av Codetabs**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn (09) 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vid rekommenderade doser förekommer knappast några biverkningar. Om biverkningar förekommer, bör läkaren alltid informeras.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA.

### **5. Hur Codetabs ska förvaras**

Förvaras vid högst 25 °C, på ett torrt ställe.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om det synbart har förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förstör gamla läkemedel och förpackningar enligt de föreskrifter som gäller i din hemkommun. Kasta blisterförpackningen i soporna. Kartongasken och bipacksedeln kan återvinnas.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är etanolvätskeextrakt (2:1) tillverkat av cocillanaextrakt (*Guarea rusbyi* (Britton) Rusby), 27 mg/tablett. Det motsvarar 2 mg i torr form. Lösningmedlet för extraktion är 40 % V/V etanol-vatten-blandning.
- Övriga innehållsämnen är sackaros, ammoniumklorid, talk, natriumcyklammat (E 952), sockerkulör (E 150a), magnesiumstearat, sackarinnatrium (E 954), mentol (racemisk), anisolja och lakritsarom (vatten, glycerol, glukossirap, natriumbensoat och kaliumsorbat).

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Brun, rund, plan tablett med fasad kant och korsskåra  
Tablettens diameter är 13 mm och tjocklek 4,3 mm.

Förpackningsstorleken är 20 sugtabletter.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn 020 746 5000

### **Tillverkare**

allphamed Pharmed Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12  
37081 Göttingen, Tyskland

**Bipacksedeln är granskad 17.4.2018**