

PAKKAUSSELOSTE

CODETABS®-imeskelytabletti

Kokillaanauute

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Codetabs-imeskelytabletteja huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Codetabs on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Codetabs-imeskelytablettien käyttöä
3. Miten Codetabs-imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Codetabs-imeskelytablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ CODETABS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Codetabs-valmistetta käytetään eri syistä johtuvan yskän lyhytaikaiseen, oireenmukaiseen hoitoon.

1 imeskelytabletti sisältää 25 mg kokillaanauutetta. Kokillaanauute vaikuttaa liman koostumukseen ja helpottaa tulehdukseen liittyvän liman irtoamista hengitysteistä. Lisäksi se hillitsee yskänärsytystä.

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN CODETABS-IMESKELYTABLETTIEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Codetabs-imeskelytabletteja

jos olet allerginen (yliherkkä) kokillaanauutteelle tai Codetabs-yskän-tablettien jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Yhteisvaikutuksia ei ole todettu.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisteella ei ole vaikutusta ajamiseen tai koneiden käyttöön.

Tärkeää tietoa Codetabs-imeskelytablettien sisältämisestä aineista

Codetabs-imeskelytabletit sisältävät sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN CODETABS-IMESKELYTABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

Aikuisille 1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

11–15-vuotiaille ½ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

4–10-vuotiaille ¼ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Ei alle 4-vuotiaille.

Jos otat Codetabs-imeskelytabletteja enemmän kuin sinun pitäisi

Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai

Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Codetabs-imeskelytabletteja.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Codetabs voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutuksia ei juuri ole. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu, on niistä aina syytä ilmoittaa lääkärille.

5. CODETABS-IMESKELYTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä lääke huoneenlämmössä (+15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

Hävitä vanhentunut lääke noudattaen omassa kunnassasi voimassa olevia ohjeita. Heitä läpipainopakkaus roskeen. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Codetabs-imeskelytabletti sisältää?

- Vaikuttava aine on kokillaanauute.
- Muut aineet ovat lakritsiuute, ammoniumkloridi, mentoli, anisöljy, sakkaroosi, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Ruskea, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteinen tabletti

Pakkauskoko on 20 imeskelytablettia.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12
37081 Göttingen, Saksa

Pakkausseloste on tarkistettu 21.4.2016.

BIPACKSEDEL

CODETABS®-sugtablett

Cocillanaextrakt

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Codetabs måste trots det användas med försiktighet för att det bästa resultatet ska uppnås.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

1. Vad Codetabs är och vad det används för
2. Att tänka på innan du använder Codetabs
3. Hur du använder Codetabs
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Codetabs ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD ÄR CODETABS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Codetabs används för kortvarig symtomatisk behandling av hosta av olika orsaker.

1 sugtablett innehåller 25 mg cocillanaextrakt. Cocillanaextrakt påverkar slemmets sammansättning och gör att slemmet i luftrören lossnar lättare i samband med infektion. Dessutom lindrar cocillanaextraktet hostretning.

2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER CODETABS

Använd inte Codetabs

om du är allergisk (överkänslig) mot cocillanaextrakt eller något av övriga innehållsämnen i Codetabs.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria produkter, naturmediciner eller naturprodukter.

Samverkningar har inte konstaterats.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Preparatet skall inte användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Preparatet har ingen inverkan på körförmåga eller användning av maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Codetabs

Codetabs-sugtabletter innehåller sackaros. Om din läkare har berättat att du inte tål vissa sockerarter, diskutera med läkaren innan du tar detta läkemedel.

3. HUR ANVÄNDER DU CODETABS?

För vuxna 1–2 tabletter 3–4 gånger per dygn.

För ungdomar mellan 11 och 15 år 1/2 tablett 3–4 gånger per dygn.

För barn mellan 4 och 10 år 1/4 tablett 3–4 gånger per dygn.

Inte för barn under 4 år.

Om du har tagit för stor mängd av Codetabs

Kontakta alltid läkaren, sjukhuset eller Giftinformationscentralen (tfn (09) 471 977) om du eller någon annan har tagit en överstor dos av Codetabs.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Codetabs orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vid rekommenderade doser förekommer knappast några biverkningar. Om biverkningar förekommer, bör läkaren alltid informeras.

5. HUR SKA CODETABS FÖRVARAS?

Förvara läkemedlet i rumstemperatur (+15–25 °C).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Använd inte läkemedlet om det synbart har förändrats.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förstör gamla läkemedel och förpackningar enligt de föreskrifter som gäller i din hemkommun. Kasta blisterförpackningen i soporna. Kartongasken och bipacksedeln kan återvinnas.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är cocillanaextrakt.
- Övriga innehållsämnena är lakritsextrakt, ammoniumklorid, mentol, anisolja, sackaros, talk och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brun, rund, plan tablett med fasad kant och korsskåra

Förpackningsstorleken är 20 sugtabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn 020 746 5000

Tillverkare

allphamed Pharmed Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12
37081 Göttingen, Tyskland

Bipacksedeln är granskad 21.4.2016.