

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Tadalafil ratiopharm 5 mg kalvopäällysteiset tabletit tadalafiili

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Tadalafil ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tadalafil ratiopharmia
3. Miten Tadalafil ratiopharmia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Tadalafil ratiopharmin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Tadalafil ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Tadalafil ratiopharm sisältää vaikuttavana aineena tadalafiilia, joka kuuluu lääkeryhmään nimeltä fosfodiesteri-5:n estäjät.

Tadalafil ratiopharm 5 mg:n tabletteja käytetään aikuisille miehille:

- erektiohäiriön hoitoon. Erektiohäiriöstä on kyse silloin, kun mies ei kykene saamaan riittävästi erektiota tai ylläpitämään seksuaaliseen kanssakäymiseen riittävästi erektiota. Tadalafiilin on todettu merkittävästi parantavan kykyä saavuttaa seksuaaliseen kanssakäymiseen tarvittava erektio.
Tadalafil ratiopharmin vaikutus perustuu siihen, että se seksuaalisen stimulaation (kiihottumisen) yhteydessä rentouttaa siittimen verisuonia ja edistää verenvirtausta siihen. Tämä puolestaan parantaa erektiota. Tadalafil ratiopharm -valmisteesta ei ole apua, jos sinulla ei ole erektiohäiriötä.
On tärkeä muistaa, että Tadalafil ratiopharm ei tehoa erektiohäiriön hoitoon ilman seksuaalista stimulaatiota. Sinun tulee harrastaa esileikkejä kumppanisi kanssa aivan samoin kuin silloin, kun erektiohäiriölääkitystä ei käytetä.
- eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien virtsaamisoireiden hoitoon. Oireet liittyvät iän myötä suureneeseen eturauhaseen. Oireina ilmenee virtsaamisen aloituksen vaikeutuminen, tunne ettei rakko tyhjene täysin; sekä tihentynyt virtsaamisen tarve myös öisin. Tadalafiili parantaa veren virtausta eturauhasessa ja virtsarakossa ja rentouttaa näiden elinten lihaksia, mikä voi lievittää eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvuun liittyviä virtsaamisvaivoja. Tadalafiilin on osoitettu lievittävän virtsaamisvaivoja jopa jo 1 - 2 viikon sisällä hoidon aloittamisesta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tadalafil ratiopharmia

ÄLÄ käytä Tadalafil ratiopharmia

- jos olet allerginen tadalafiilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos käytät jotakin orgaanista nitraattia tai typpioksidia vapauttavaa ainetta, kuten amyylinitriittiä. Tämä on ryhmä rasisurintakivun hoidossa käytettäviä lääkkeitä (ns. nitraatit/nitrot). Tadalafiilin on osoitettu tehostavan näiden lääkkeiden vaikutuksia. Jos käytät

- jotakin nitraattia tai olet epävarma asiasta, mainitse siitä lääkärille (ks. lisäksi kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Tadalafil ratiopharm”)
- jos sinulla on jokin vakava sydänsairaus tai sinulla on hiljattain ollut sydänkohtaus (viimeisten 90 päivän aikana)
 - jos sinulla on hiljattain ollut aivohalvaus (viimeisten kuuden kuukauden aikana)
 - jos verenpaineesi on matala tai hallitsemattomasti kohonnut
 - jos sinulla on joskus ollut ei-tulehdusperäinen näköhermon etuosan iskeeminen vaurio (NAION), jota kutsutaan "halvaukseksi silmässä".
 - käytät riosiguaattia. Tätä lääkettä käytetään keuhkovaltimoiden verenpainetaudissa (korkea keuhkoverenpaine) ja kroonisessa tromboembolisessa keuhkoverenpainetaudissa (veritulpanjälkeinen korkea keuhkoverenpaine). PDE5-inhibiittoreiden, kuten Tadalafil ratiopharm, on osoitettu lisäävän näiden lääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. Jos käytät riosiguaattia tai olet epävarma, kerro siitä lääkärillesi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Tadalafil ratiopharmia.

Huomaa, että seksuaaliseen toimintaan aina liittyy mahdollinen riski, jos sinulla on jokin sydänsairaus, sillä seksuaalinen toiminta rasittaa sydäntä. Kerro lääkärille, jos sinulla on sydänvaivoja.

Koska eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun ja eturauhassyövän oireet voivat olla samankaltaisia, lääkäri tutkii sinut eturauhassyövän poissulkemiseksi ennen kuin voit aloittaa Tadalafil ratiopharm -lääkityksen eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireisiin. Tadalafil ratiopharm -lääkkeellä EI voida hoitaa eturauhassyöpää.

Ennen kuin otat tabletteja sinun on kerrottava lääkärille, jos sinulla on:

- sirppisoluanemia (punasolujen poikkeavuus)
- multippeli myelooma (luuytimen syöpä)
- leukemia (verisyöpä)
- jokin siittimen epämuotoisuus
- vakava maksasairaus
- vaikea munuaissairaus.

Ei tiedetä onko Tadalafil ratiopharm -hoito tehokas potilaille, joille on tehty:

- lantion alueen leikkaus
- eturauhasen täydellinen tai osittainen poistoleikkaus, jossa eturauhasen hermot on katkaistu (radikaali hermoja säästämätön eturauhasen poisto).

Jos näkökykysi yhtäkkiä heikkenee tai häviää kokonaan, LOPETA Tadalafil ratiopharm -käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Alentunutta tai äkillistä kuulonmenetystä on huomattu joillain tadalafiliä käyttäneillä potilailla. Vaikka ei olekaan tiedossa, että tapahtuma liittyy suoraan tadalafiliin, lopeta Tadalafil ratiopharm -lääkkeen käyttö ja ota lääkäriisi yhteyttä välittömästi, mikäli sinulla on alentunut tai äkillinen kuulonmenetys.

Tadalafil ratiopharmia ei ole tarkoitettu naisille.

Lapset ja nuoret

Tadalafil ratiopharmia ei ole tarkoitettu lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Tadalafil ratiopharm

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

ÄLÄ ota Tadalafil ratiopharmia, jos käytät jotakin nitraattia jo ennestään (ks. kohta ”ÄLÄ käytä Tadalafil ratiopharmia”).

Tadalafil ratiopharm voi vaikuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon, ja jotkut lääkkeet voivat puolestaan vaikuttaa Tadalafil ratiopharmin tehoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos jo käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

- alfasalpaajat (käytetään korkean verenpaineen ja eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien virtsaamisvaivojen hoitoon)
- muut verenpainelääkkeet
- riosiguaatti
- 5-alfa-reduktaasin estäjät (käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitoon)
- tietyt lääkkeet, kuten ketokonatsolitabletit (sieni-infektiolääke) ja proteaasinstäjät, joita käytetään AIDS:n tai HIV:n hoidossa
- fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini (kouristuksia ehkäiseviä lääkkeitä)
- rifampisiini, erytromysiini, klaritromysiini tai itrakonatsoli
- muut erektiohäiriöiden hoidot.

Tadalafil ratiopharm juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholin vaikutuksista on tietoa kohdassa 3.

Greippimehu voi vaikuttaa Tadalafil ratiopharmin tehoon ja sitä tulee käyttää varoen. Voit kysyä lisätietoa lääkäriltä.

Hedelmällisyys

Kun tadalafilia annettiin koirille, siittiöiden kehitys koirien kiveksissä hidastui lääkkeen käytön aikana. Joillakin miehillä on myös havaittu siittiöiden määrän vähenemistä. On kuitenkin epätodennäköistä, että nämä vaikutukset johtaisivat hedelmättömyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kliinisten tutkimusten yhteydessä on joillakin miehillä raportoitu huimausta. Tarkkaile huolellisesti miten reagoit tabletteihin ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tadalafil ratiopharm sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Tadalafil ratiopharmia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tadalafil ratiopharm -tabletit on tarkoitettu otettavaksi suun kautta. Lääke on tarkoitettu vain miehille. Tabletit niellään kokonaisina veden kera, ja ne voidaan ottaa ruokailuajoista riippumatta.

Alkoholin nauttiminen voi tilapäisesti laskea verenpainettasi. Jos olet ottanut tai aiot ottaa Tadalafil ratiopharm -tabletin, vältä liiallista alkoholin juomista (veren alkoholipitoisuus 0,08 % tai enemmän), koska se voi lisätä huimauksen vaaraa seisten.

Erektiohäiriön hoito

Suosittelun annos päivittäisessä käytössä on yksi 5 mg tabletti kerran vuorokaudessa suunnilleen samaan kellonaikaan joka päivä. Lääkäri saattaa pienentää annosta 2,5 mg:aan (yksi 2,5 mg:n tabletti) riippuen siitä, miten reagoit lääkkeeseen. Älä ota Tadalafil ratiopharmia useammin kuin kerran päivässä.

Tadalafil ratiopharmin otto kerran vuorokaudessa voi olla eduksi, jos oletat olevasi seksuaalisesti aktiivinen kahdesti viikossa tai useammin. Kun Tadalafil ratiopharm otetaan kerran vuorokaudessa,

se mahdollistaa erektion silloin, kun olet seksuaalisesti kiihottunut mihin aikaan tahansa vuorokauden 24 tunnin aikana.

On tärkeää huomioida, että Tadalafil ratiopharm ei vaikuta ilman seksuaalista kiihottumista. Tarvitset esileikkiä partnerisi kanssa samalla tavalla kuin ilman erektiohäiriölääkitystäkin. Alkoholin nauttiminen voi vaikuttaa kykyysi saavuttaa erektio.

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoito

Annos on yksi 5 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa suunnilleen samaan kellonaikaan joka päivä. Jos sinua hoidetaan sekä eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden että erektiohäiriöiden vuoksi, annostus on edelleen yksi 5 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Älä ota Tadalafil ratiopharmia useammin kuin kerran päivässä.

Jos otat enemmän Tadalafil ratiopharmia kuin sinun pitäisi

Yliannostus voi aiheuttaa kohdassa 4 mainittuja haittavaikutuksia.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Tadalafil ratiopharm -annoksen

Ota unohtunut tabletti heti, kun huomaat unohtuaksesi, mutta älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Tadalafil ratiopharmia EI saa ottaa useammin kuin kerran päivässä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämänkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset ovat yleensä luonteeltaan lieviä tai kohtalaisia.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista haittavaikutuksista, LOPETA lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

- allergiset reaktiot, myös ihottumat (esiintyy melko harvoin)
- rintakipu – älä ota nitraatteja, vaan hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon (esiintyy melko harvoin)
- priapismi, pitkittynyt ja mahdollisesti kivulias erektio Tadalafil ratiopharmin ottamisen jälkeen (esiintyy harvoin). Jos sinulle tulee tämänkaltaisen erektio, joka kestää yhtäjaksoisesti yli 4 tuntia, ota välittömästi yhteys lääkäriin
- äkillinen näön menetys (esiintyy harvoin).

Muita ilmoitettuja haittavaikutuksia:

Yleiset haittavaikutukset (1–10:llä lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

- päänsärky
- selkäkipu
- lihassärky
- raajakivut
- kasvojen punoitus
- nenän tukkoisuus
- ruoansulatusvaivat.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (1–10:llä lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

- huimaus
- vatsakipu

- pahoinvointi
- oksentelu
- närästys
- näön hämärtyminen
- silmä särky
- hengitysvaikeudet
- verta virtsassa
- pitkittynyt erektio
- tunne sydämen jyskytyksestä, nopea sydämen syke, korkea verenpaine, matala verenpaine
- nenäverenvuoto ja korvien soiminen
- käsien, jalkaterien ja nilkkojen turvotus ja väsymys.

Harvinaiset haittavaikutukset (1–10:llä lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta):

- pyörtyminen
- kouristuskohtaukset
- ohimenevä muistin menetys
- silmäluomien turvotus, silmien punoitus, äkillinen kuulon heikkeneminen tai menetys ja nokkosihottuma (ihon pinnalla punaisia kutiavia laikkuja)
- verenvuoto peniksestä
- verta siemennesteessä
- hikoilun lisääntyminen.

Tadalafiilin käytön yhteydessä on miehillä harvoin ilmoitettu myös sydänkohtaus- ja aivohalvaustapauksia. Näitä haittatapahtumia kokeneista miehistä useimmilla on ollut aikaisemmin tiedossa olleita sydänvaivoja.

Osittaista, ohimenevää tai pysyvää näön heikkenemistä tai häviämistä toisesta silmästä tai molemmista silmistä on ilmoitettu harvoin.

Tadalafilia käytävillä miehillä on lääkkeen markkinoille tulon jälkeen lisäksi ilmoitettu **harvinaisia haittavaikutuksia**, joita ei ole havaittu kliinisissä tutkimuksissa. Näitä ovat esim.:

- migreeni
- kasvojen turvotus
- vakavat allergiset reaktiot, jotka aiheuttavat kasvojen tai kurkun turvotusta
- vaikeat ihottumat
- tietyt silmän verenkierron häiriöt
- epäsäännölliset sydämen lyönnit
- rintakipu
- sydänperäiset äkkikuolemat.

Huimausta on ilmoitettu useammin yli 75-vuotiailla miehillä kuin sitä nuoremmilla. Ripulia on ilmoitettu useammin yli 65-vuotiailla miehillä kuin sitä nuoremmilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA.

5. Tadalafil ratiopharmin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainolevyssä ("EXP") mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tadalafil ratiopharm sisältää

- Vaikuttava aine on tadalafiili.
Yksi tabletti sisältää 5 mg tadalafiilia.
- Muut aineet tablettien ytimessä ovat: laktoosimonohydraatti, natriumlauryylisulfaatti, povidoni, krospovidoni ja natriumstearyylifumaraatti.
- Muut aineet tablettien päällysteessä ovat: poly(vinyylialkoholi), makrogoli, titaanidioksidi (E 171), talkki ja keltainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lääkevalmisteen kuvaus:

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletit ovat okranväriset tai keltaiset, soikeat kalvopäällysteiset tabletit, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu "5" ja joiden toinen puoli on sileä. Pituus 8,1 mm ja leveys 4,1 mm.

Pakkauskoot:

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletit: 14, 18, 28, 30 tai 84 kalvopäällysteistä tablettia läpipainolevyissä tai 14 x 1, 28 x 1, 84 x 1, 98 x 1 tai 112 x 1 kalvopäällysteistä tablettia annoksittain perforoiduissa läpipainolevyissä.

Kaikkia pakkauskojoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
89079 Ulm
Saksa

Valmistajat:

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company)
Pallagi út 13,
4042 Debrecen
Unkari

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne
BN22 9AG East Sussex
Iso-Britannia

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem

Alankomaat

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80.
31-546 Krakow
Puola

TEVA PHARMA S.L.U.
C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica
50016 Zaragoza
Espanja

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3
89143 Blaubeuren
Saksa

Merckle GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Saksa

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovica 25
10000 Zagreb
Kroatia

Actavis International Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR4013
Malta

Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
Dupnitsa 2600
Bulgaria

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
ratiopharm Oy
PL 67
02631 Espoo
puh. 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.9.2018.

Bipacksedel: Information till användaren

Tadalafil ratiopharm 5 mg filmdragerade tabletter tadalafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

1. Vad Tadalafil ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tadalafil ratiopharm
3. Hur du använder Tadalafil ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tadalafil ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tadalafil ratiopharm är och vad det används för

Tadalafil ratiopharm innehåller den aktiva substansen tadalafil som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare.

Tadalafil ratiopharm 5 mg används för behandling av vuxna män med:

- erektil dysfunktion. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en tillräckligt hård och erigerad penis (erektion) för sexuellt umgänge. Tadalafil har visat sig signifikant förbättra förmågan att uppnå en tillräcklig erektion för att möjliggöra sexuell aktivitet. Tadalafil ratiopharms effekt baserar sig på att läkemedlet vid sexuell stimulering får blodkärlen i penis att slappna av så att blod kan strömma in. Detta resulterar i sin tur i en förbättrad erektil funktion. Om du inte har erektil dysfunktion hjälper inte Tadalafil ratiopharm.

Det är viktigt att komma ihåg att Tadalafil ratiopharm inte har någon effekt vid behandling av erektil dysfunktion om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte tar något läkemedel för erektil dysfunktion.

- urineringsbesvär som förknippas med ett vanligt förekommande tillstånd som heter benign prostatahyperplasi. Detta är när prostatakörteln blir större med ålder. Symtomen inkluderar svårigheter att kasta vatten, en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan helt och att oftare behöva kasta vatten till och med på natten. Tadalafil får musklerna i prostatan och urinblåsan att slappna av och förbättrar blodgenomströmningen i dessa organ, vilket i sin tur minskar symtomen på benign prostatahyperplasi. Tadalafil har visat effekt på urineringsbesvären så pass tidigt som efter 1-2 veckor efter påbörjad behandling.

2. Vad du behöver veta innan du använder Tadalafil ratiopharm

Ta INTE Tadalafil ratiopharm

- om du är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxidatorer som t.ex. amylnitrit. Dessa läkemedel ("nitrater") används för att behandla kärlekskramp (bröstsmärta).

- Tadalafil har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrater eller om du är osäker, tala med din läkare (se avsnitt ”Andra läkemedel och Tadalafil ratiopharm”).
- om du har någon allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack (inom de senaste 90 dagarna)
 - om du nyligen har haft ett slaganfall (en stroke) (inom de senaste 6 månaderna)
 - om du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck
 - om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), så kallad ”stroke i ögat”.
 - tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som Tadalafil ratiopharm, har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Tadalafil ratiopharm.

Tänk på att sexuellt umgänge alltid utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.

Benign prostatahyperplasi och prostatacancer kan ha likartade symtom, och därför kommer din läkare att undersöka dig gällande prostatacancer innan du kan påbörja en eventuell behandling med Tadalafil ratiopharm för benign prostatahyperplasi. Tadalafil ratiopharm lämpar sig INTE som behandling mot prostatacancer.

Innan du tar tablettorna ska du tala om för läkaren om du har:

- sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar)
- multipelt myelom (cancer i benmärgen)
- leukemi (blodcellscancer)
- deformerad penis
- någon allvarlig leversjukdom
- någon svår njursjukdom.

Man känner inte till om tadalafil är effektivt hos patienter som har genomgått:

- någon bäckenoperation
- en operation där delar av, eller hela, prostatakörteln avlägsnats och där nerverna inte skonats (s.k. radikal, icke-nervsparande prostatektomi).

Om du upplever en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du AVBRYTA behandlingen med Tadalafil ratiopharm och omedelbart kontakta läkare.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning har noterats hos några patienter som tar tadalafil. Fastän det inte är känt om händelserna har ett samband med tadalafil, bör du kontakta läkare omedelbart om du får försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning.

Tadalafil ratiopharm är inte avsett för behandling av kvinnor.

Barn och ungdomar

Tadalafil ratiopharm är inte avsett för behandling av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Tadalafil ratiopharm

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta INTE Tadalafil ratiopharm om du redan tar nitrater (se avsnitt ”Ta INTE Tadalafil ratiopharm”).

Vissa läkemedel kan påverkas av Tadalafil ratiopharm eller påverka hur väl Tadalafil ratiopharm kommer att fungera. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

- alfa-blockerare (används för att behandla högt blodtryck eller urineringsbesvär relaterade till benign prostatahyperplasi)
- andra läkemedel för högt blodtryck
- riociguat
- 5-alfa-reduktashämmare (används för att behandla benign prostatahyperplasi)
- vissa läkemedel så som ketokonazoltabletter (för att behandla svampinfektioner) och proteashämmare för behandling av AIDS eller HIV-infektion
- fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel)
- rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itraconazol
- andra behandlingar för erektil dysfunktion.

Tadalafil ratiopharm med dryck och alkohol

För information om påverkan av alkohol, se avsnitt 3.

Grapefruktjuice kan påverka hur väl Tadalafil ratiopharm fungerar och ska därför intas med försiktighet. Vänd dig till läkare för ytterligare information.

Fertilitet

När hundar behandlades med tadalafil sågs en långsammare spermproduktion i testiklarna. Minskad mängd sperma har även konstaterats hos några män. Det är osannolikt att dessa effekter skulle leda till infertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats hos några av de män som tagit tadalafil i samband med kliniska studier. Känn noga efter hur du reagerar på Tadalafil ratiopharm innan du kör bil eller använder maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tadalafil ratiopharm innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du använder Tadalafil ratiopharm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tadalafil ratiopharm tablettorna ska tas via munnen och de är endast avsedda för män. Svälj tablettorna hela med litet vatten. Tablettorna kan tas oberoende av dagens måltider.

Alkoholintag kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Om du har tagit eller planerar att ta Tadalafil ratiopharm, undvik intag av stora mängder alkohol (0,8 promille eller mer i blodet) eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

För behandling av erektil dysfunktion

Rekommenderad dos vid regelbunden daglig behandling är en tablett på 5 mg en gång per dygn och vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Läkaren kan vid behov minska dosen till 2,5 mg (en tablett på 2,5 mg) beroende på hur du reagerar på behandlingen. Ta inte Tadalafil ratiopharm oftare än en gång om dagen.

En daglig dosering av Tadalafil ratiopharm kan vara på sin plats för män som har sexuellt umgänge två eller fler gånger per vecka. När du tar Tadalafil ratiopharm en gång om dagen, kan du få erektion vid vilken tidpunkt som helst under dygnets 24 timmar om du blir sexuellt stimulerad.

Det är viktigt att komma ihåg att Tadalafil ratiopharm inte har någon effekt om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte använder något läkemedel för erektil dysfunktion.

Ett alkoholintag kan inverka på din förmåga att uppnå erektion.

För behandling av benign prostatahyperplasi

Dosen är en tablett på 5 mg en gång per dygn vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Om du behandlas för både erektil dysfunktion och symptom orsakade av benign prostatahyperplasi är dosen fortfarande en tablett på 5 mg per dag. Ta inte Tadalafil ratiopharm oftare än en gång per dygn.

Om du har tagit för stor mängd av Tadalafil ratiopharm

En alltför stor dos kan orsaka den typ av biverkningar som nämns i avsnitt 4.

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Tadalafil ratiopharm

Ta din dos så fort du kommer ihåg det, men ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta INTE Tadalafil ratiopharm oftare än en gång om dagen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är vanligen lindriga eller måttliga till sin natur.

Om du får någon av följande biverkningar, SLUTA använda läkemedlet och uppsök läkare omedelbart:

- allergiska reaktioner, inklusive utslag (biverkningens frekvens: mindre vanlig).
- bröstsmärta – använd inte nitrater utan uppsök läkare omedelbart (biverkningens frekvens: mindre vanlig).
- priapism, förlängd och möjligtvis smärtsam erektion efter intag av Tadalafil ratiopharm (biverkningens frekvens: sällsynt). Om du får en sådan erektion som varar kontinuerligt i över 4 timmar, ska du omedelbart kontakta läkare.
- plötslig synförlust (biverkningens frekvens: sällsynt).

Andra biverkningar som har rapporterats:

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 av 100 patienter)

- huvudvärk
- ryggsmärta
- muskelvärk
- smärta i armar och ben
- ansiktsrodnad
- nästäppa
- matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 av 1 000 patienter)

- yrsel
- magsmärta
- - kräkningar
- reflux
- dimsyn
- smärta i ögonen
- andningssvårigheter
- förekomst av blod i urin
- förlängd erektion
- hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt blodtryck

- näsblod och tinnitus (öronsus)
- svullna händer, fötter eller anklar och trötthet.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1-10 av 10 000 patienter)

- svimning
- krampanfall
- tillfällig minnesförlust
- svullna ögonlock, röda ögon, plötslig försämring eller förlust av hörseln och nässelutslag (kliande röda små knottor i huden)
- blödning från penis
- förekomst av blod i sperma
- ökad svettning.

Hjärtattacker och slaganfall har rapporterats i sällsynta fall hos män som använt tadalafil. De flesta av dessa män hade kända hjärtproblem redan innan de tog läkemedlet.

Partiell, tillfällig eller varaktig synnedsättning eller synförlust på det ena eller båda ögonen har rapporterats i sällsynta fall.

Ytterligare några sällsynta biverkningar, som inte observerats i de kliniska prövningarna, har rapporterats av män som tagit tadalafil efter att läkemedlet kommit ut på marknaden. Sådana är t.ex.:

- migrän
- ansiktssvullnad
- allvarliga allergiska reaktioner som orsakar svullnad i ansikte och svalg
- allvarliga hudutslag
- vissa störningar i blodflödet till ögonen
- oregelbundna hjärtslag
- kärlekskramp
- plötslig hjärtdöd.

Biverkningarna yrsel har rapporterats oftare hos män över 75 år än hos yngre män. Diarré har rapporterats oftare hos män över 65 år än hos yngre män.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA.

5. Hur Tadalafil ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterskivan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är tadalafil.
En tablett innehåller antingen 5 mg tadalafil.
- Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, povidon, krospovidon och natriumstearylfumarat.
- Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är: poly(vinylalkohol), makrogol, titandioxid (E 171), talk och gul järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende:

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletter är ockergula eller gula, ovala, filmdragerade tabletter med ingraveringen ”5” på den ena sidan. Den andra sidan av tabletterna är slät. Längd 8,1 mm och bredd 4,1 mm.

Förpackningsstorlekar:

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletter: 14, 18, 28, 30 eller 84 filmdragerade tabletter i blisterskivor eller 14 x 1, 28 x 1, 84 x 1, 98 x 1 eller 112 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade endos-blisterskivor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
89079 Ulm
Tyskland

Tillverkare:

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company)
Pallagi út 13,
4042 Debrecen
Ungern

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne
BN22 9AG East Sussex
Iso-Britannia

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederländerna

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80.
31-546 Krakow
Polen

TEVA PHARMA S.L.U.
C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica
50016 Zaragoza
Spanien

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3
89143 Blaubeuren
Tyskland

Merckle GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Tyskland

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovica 25
10000 Zagreb
Kroatien

Actavis International Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR4013
Malta

Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
Dupnitsa 2600
Bulgarien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

ratiopharm Oy
PB 67
02631 Esbo
tel: 020 180 5900

Denna bipacksedel ändrades senast den 21.9.2018.