

Pakkausseloste: Tie toa potilaalle

Movicol Appelsiini, konsentraatti oraaliliuosta varten

Makrogoli 3350, Natriumkloridi, Natriumvetykarbonaatti, Kaliumkloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tästä lääketä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkienkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille, apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Movicol Appelsiini -valmiste on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Movicol Appelsiini -valmistetta
3. Miten Movicol Appelsiini -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Movicol Appelsiini -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Movicol Appelsiini -valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkkeen nimi on Movicol Appelsiini, konsentraatti oraaliliuosta varten.

Se on kroonisen ummetuksen hoitoon käytettävä valmiste aikuisille, yli 12-vuotiaille ja vanhuksille. Valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Movicol Appelsiini -valmiste auttaa saavuttamaan miellyttävän suolen toiminnan, vaikka ummetus olisi jatkunut jo pitkään.

Milloin valmistetta ei pidä käyttää

Älä käytä Movicol Appelsiini -valmistetta mikäli sinulla on ulostetukkeumaksi kutsuttu, erittäin vaikea ummetus.

Makrogolia, natriumkloridia, natriumvetykarbonaattia ja kaliumkloridia, joita Movicol Appelsiini sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Movicol Appelsiini -valmistetta

Älä käytä Movicol Appelsiini -valmistetta, jos lääkäri on kertonut, että sinulla on:

- suolen tukos (suolentukkeuma, ileus)
- haava suolen seinämässä
- vakava tulehdusellinen suolistosairaus, kuten ulceratiivinen kolitti, Crohnin tauti taitoksinen megakoolon.
- jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Nauti edelleen runsaasti nesteitä, kun käytät Movicol Appelsiini -valmistetta. Movicol-valmisteen sisältämä neste ei korvaa normaalilla nesteensaantia.

Muut lääkevalmisteet ja Movicol Appelsiini

Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkeitä.

Joidenkin lääkkeiden, esim. epilepsialääkkeiden, teho saattaa olla tavallista heikompi Movicol Appelsiini -valmisten käytön aikana.

Älä ota muita suun kautta otettavia lääkeitä tuntia ennen Movicol Appelsiini -valmisten ottamista, yhdessä Movicol Appelsiini -valmisten kanssa, tai tunnin sisällä Movicol Appelsiini -valmisten ottamisen jälkeen.

Jos sinun on sakeutettava nesteitä ennen kuin voit niellä niitä turvallisesti, on huomattava, että Movicol Appelsiini -valmiste saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.

Raskaus ja imetys

Movicol Appelsiini -valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet raskaana, suunnittelet lapsen hankkimista tai imetät, kysy lääkäriltä tai aptekista neuvoa ennen kuin käytät Movicol Appelsiini -valmistetta.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Movicol Appelsiini -valmiste ei vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Movicol Appelsiini sisältää etyli- ja metylyparahydroksibentsoattia, alkoholia (etanolia), bentsyylialkoholia ja natriumia.

Tämä lääkevalmiste sisältää etyli- ja metylyparahydroksibentsoattia, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita, mahdollisesti viivästyneitä.

Tämä lääkevalmiste sisältää 74,6 mg alkoholia (etanolia) per 25 ml konsentraatti oraaliliusta varten, joka vastaa 3,0 mg etanolia per ml. Alkoholimäärä 25 ml:n konsentraatissa oraaliliusta varten tätä lääkevalmistetta vastaa alle 2 ml:aa olutta tai 1 ml:aa viiniä. Tässä lääkevalmisten sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.

Tämä lääkevalmiste sisältää 45,6 mg bentsyylialkoholia laimennetussa 125 ml:n annoksessa.

Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Kysy lääkäriltä tai apteekkikenkilökunnalta neuvoa, jos sinulla on maksaa- tai munuaissairaus, olet raskaana tai imetät, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).

Keskustele lääkärin tai apteekkikenkilökunnan kanssa, jos käytät tätä lääkevalmistetta 3 annosta tai enemmän päivässä pitkääkäsestä, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

Movicol Appelsiini sisältää 186,87 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 25 ml annos. Tämä vastaa 9,3 % suositellusta natriumin päivittäisestä enimmäissaannista aikuiselle.

Älä ylitä suositeltua annosta.

3. Miten Movicol Appelsiini -valmistetta käytetään

Tämä lääke voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa, joko ruuan kanssa tai erikseen.

Tämä lääkevalmiste pitää laimentaa ennen käyttöä.

25 ml Movicol Appelsiini -valmistetta laimennetaan 100 ml:lla vettä.

Ota laimennettu annos 1–3 kertaa päivässä ummetuksesi vaikeusasteesta riippuen.

Sekoitusohje:

Aava pullo ja mittaa 25 millilitraa tai 5 teelusikallista valmistettua juomalaistaan. Lisää 100 millilitraa (noin puoli lasillista) vettä. Sekoita hyvin kunnes liuos on tasainen ja kirkas. Juo liuos. Huuhtele annosmitta käytön jälkeen ja lataa se takaisin pullon päälle.

Hoidon kesto:

Movicol Appelsiini -hoito kestää yleensä noin 2 viikkoa. Mikäli sinun tarvitsee käyttää lääkevalmista pidempään, ota yhteys lääkärin. Pitkääikainen hoito voi olla tarpeen, mikäli käytät ummetusta aiheuttavaa lääkitystä tai sinulla on sairaus, johon liittyy ummetusta esim. Parkinsonin tauti tai multippeliskleroosi (MS). Pitkääikäiskäytössä annostusta voidaan yleensä pienentää 1–2 annokseen päivässä.

Jos käytät enemmän Movicol Appelsiini -valmistetta kuin sinun pitäisi

On mahdollista, että saat pahan ripulin, joka voi johtaa kuivumiseen. Keskeytä Movicol Appelsiini -valmisten nauttiminen ja juo runsaasti nesteitä. Jos olet huolestunut, ota yhteys lääkärin tai apteekkiin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkärin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

Jos unohtdat ottaa Movicol Appelsiini -valmistetta

Ota unohtamasi annos heti, kun muistat ottaa sen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Movicol Appelsiini -valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi ja lopeta Movicol Appelsiini -valmisten ottaminen jos:

Saat vakavan allergisen reaktion, kuten hengenahdistusta tai heikotusta, kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotusta.

Muut allergiset reaktiot voivat aiheuttaa ihottumaa, ihmisen kutinaa, ihmisen punoitusta tai nokkosihottumaa, käsiä, jalkojen tai nilkkojen turpoamista ja päänsärkyä.

Muita haittavaikutuksia:

Joskus valmiste voi aiheuttaa ruoansulatushäiriötä, vatsakipuja tai vatsan kurinaa ja liian matalaa tai korkeaa kaliumpitoisuutta veressä. Movicol Appelsiini -hoidon alussa voi myös esiintyä vatsan turvotusta, ilmavaivoja, pahoinvointia tai oksentelua, kipua peräaukon seudulla sekä lievää ripulia. Nämä haittavaikutukset helpottuvat yleensä annosta pienentämällä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkijenkielkunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Movicol Appelsiini -valmisten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämääärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä säilytä lääkevalmistetta jääkaapissa tai pakastimessa.

Hävitä käyttämätön valmiste 30 päivän kuluttua pullon avaamisesta.

Kun olet laimentanut Movicol Appelsiini -annoksen vedellä, säilytä se peitettyä ellet heti juo sitä. Hävitä käyttämätön laimennettu liuos 24 tunnin kuluessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Movicol Appelsiini sisältää

25 ml Movicol Appelsiini -valmistetta sisältää:

Makrogoli 3350	13,125 g
Natriumkloridi	0,3507 g
Natriumvetykarbonaatti	0,1785 g
Kaliumkloridi	0,0466 g

Movicol Appelsiini sisältää myös puhdistettua vettä, appelsiiniaromia ja makeutusaineina asesulfaamikaliumia (E950) ja sukraloosia (E955).

Valmiste sisältää säilytysaineina bentsyylialkoholia (E1519), metyyliparahydroksibentsoattia (E218) ja etyyliparahydroksibentsoattia (E214). Ks kohta 2 " Movicol Appelsiini sisältää etyyli- ja metyyliparahydroksibentsoattia, alkoholia (etanolia), bentsyylialkoholia ja natriumia."

Appelsiiniaromi sisältää aromiaineita, aromivalmisteita ja pieni määrä alkoholia (etanolia).

Kun 25 ml liuosta on laimennettu 100 ml:lta vettä juomaksi, juoman elektrolyytti-ionien pitoisuudet ovat:

Natrium	65 mmol/l
Kloridi	53 mmol/l
Kalium	5,4 mmol/l
Vetykarbonaatti	17 mmol/l

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoko (-koot)

Movicol Appelsiini on kirkas väritön liuos.

Pakkauksessa on 500 ml Movicol Appelsiini -valmistetta sisältävä muovipullo ja muovinen lääkemitta.

Myyntiluvan haltija:

Norgine Healthcare B.V.

Antonio Vivaldistraat 1501083 HP Amsterdam

Alankomaat

Markkinoija:

SaboraPharma Oy
Tammelantie 10
03600 Karkkila
Suomi

Valmistaja:

Norgine Pharma Dreux,
29, Rue Ethé Virton,
28109 Dreux Cedex,
Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Tällä lääke valmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdysvalloissa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta	MOVICOL Liquid Orange
Belgia	MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak / MOVICOL Liquide Goût orange / MOVICOL Flüssig Orangengeschmack
Suomi	MOVICOL Appelsiini
Saksa	Macrogol Norgine Orangengeschmack Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Irlanti	MOVICOL Liquid Orange flavour
Italia	MOVICOL 13,9 g/25 ml Concentrato per soluzione orale, gusto Arancio
Luxemburg	MOVICOL Liquide Goût orange
Alankomaat	Movicolon Liquid Orange
Portugali	MOVICOL Laranja
Espanja	Movicol Sabor Naranja concentrado para solución oral
Ruotsi	Movicol Apelsin
Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois- Irlannissa)	MOVICOL Liquid Orange flavour

Tämä pakkausselostee on tarkistettu viimeksi 02.05.2023

Bipacksedel: Information till patienten

Movicol Appelsiini, koncentrat för oral lösning

Makrogol 3350, Natriumklorid, Natriumvätekarbonat, Kaliumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

I den här bipackselet finns information om följande:

1. Vad Movicol Appelsiini är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Movicol Appelsiini
3. Hur du tar Movicol Appelsiini
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Movicol Appelsiini ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Movicol Appelsiini är och vad det används för

Namnet på detta läkemedel är Movicol Appelsiini, koncentrat för oral lösning. Det är ett laxermedel för behandling av kronisk förstopning hos vuxna, barn över 12 år, samt äldre. Det rekommenderas inte för barn under 12 år.

Movicol Appelsiini hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid.

När läkemedlet inte bör användas

Du bör inte använda Movicol Appelsiini vid väldigt svår förstopning, så kallat fekalom.

Makrogol, natriumklorid, natriumbikarbonat och kaliumklorid som finns i Movicol Appelsiini kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Movicol Appelsiini

Använd inte Movicol Appelsiini om läkaren har talat om för dig att du:

- har förträngningar i tarmen (tarm obstruktioner, ileus)
- har sår i tarmväggen
- har svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t.ex. ulcerös colit, Crohn's sjukdom, toxisk megacolon.
- är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Drick fortfarande mycket vätska, när du använder Movicol Appelsiini-läkemedlet. Vätskan som Movicol-läkemedlet innehåller ersätter inte ditt normala vätskeintag.

Andra läkemedel och Movicol Appelsiini

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel, t.ex. epilepsimediciner, kan försvagas om du samtidigt tar Movicol Appelsiini.

Du ska inte ta några andra läkemedel via munnen tillsammans med Movicol Appelsiini, en timme innan eller en timme efter intag av Movicol Appelsiini.

Om du behöver förtjocka vätskor för att kunna svälja dem säkert, kan Movicol Appelsiini motverka effekten av förtjockningsmedlet.

Graviditet och amning

Movicol Appelsiini kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Movicol Appelsiini.

Körförmåga och användning av maskiner

Movicol Appelsiini påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Movicol Appelsiini innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat, alkohol (etanol), bensylalkohol och natrium

Detta läkemedel innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan förorsaka allergiska reaktioner, även födröjda.

Detta läkemedel innehåller 74,6 mg alkohol (etanol) per 25 ml koncentrat till oral lösning motsvarande 3,0 mg etanol per ml. Mängden i 25 ml koncentrat till oral lösning av detta läkemedel motsvarar mindre än 2 ml öl eller 1 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

Detta läkemedel innehåller 45,6 mg bensylalkohol i varje utspädd dos på 125 ml.

Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har en lever- eller njursjukdom, är gravid eller ammar. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och kan orsaka biverkningar (metabolisk acidosis).

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du behöver 3 eller flera doser dagligen under en längre period, särskilt om du har fått råd att följa en diet med lågt saltinnehåll (natrium).

Movicol Appelsiini innehåller 186,87 mg natrium (huvudingrediens i koksalt/bordssalt) per 25 ml dos. Detta motsvarar 9,3% av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen.

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

3. Hur du använder Movicol Appelsiini

Detta läkemedel kan intas när som helst under dygnet med eller utan mat.

Denna produkt måste spädas ut före användning.

25 ml Movicol Appelsiini lösning späds ut med 100 ml vatten.

Ta en sådan dos 1–3 gånger dagligen beroende på hur svår din förstoppling är.

Hur läkemedlet blandas:

Öppna flaskan och mät upp 25 ml eller fem 5 milliliters teskedar. Häll vätskan i ett dricksglas och tillsätt 100 ml (ett halvt glas) vatten. Rör om noga tills lösningen är jämn och klar. Drick sedan hela lösningen.

Skölj dosmåttet rent efter användning och sätt det tillbaka på flaskan.

Längd på behandling:

Behandling med Movicol Appelsiini varar oftast ungefär 2 veckor. Om du behöver använda Movicol Appelsiini längre än detta, kontakta din läkare. Långvarigt bruk kan vara nödvändigt ifall du använder läkemedel som orsakar förstopning eller om du har någon sjukdom, t.ex. Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS), som ger upphov till förstopning.

Vid långvarigt bruk kan dosen ofta minskas till 1- 2 doser dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Movicol Appelsiini

Du kan få kraftig diarré som kan leda till uttorkning. Avbryt behandlingen med Movicol Appelsiini och drick rikligt med vätska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Movicol Appelsiini

Ta dosen så fort du kommer ihåg att ta den.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkare omedelbart och sluta ta Movicol Appelsiini om:

Du får en allvarlig allergisk reaktion, som leder till andnöd eller svindel, svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller svalget.

Övriga allergiska reaktioner kan orsaka utslag, kåda, hudrodnad eller nässelfeber, svullnad i händer, fötter eller vrister och huvudvärk.

Övriga biverkningar:

Ibland kan man få matsmältningsbesvärs, magknip eller -kurrande och låga eller höga kaliumhalter i blodet. Det är möjligt att Movicol Appelsiini ger i början av behandlingen upphov till svullnad i magen, gasbildning, illamående eller kräkningar, smärta i ändtarmsområdet samt lindrig diarré. I allmänhet lättar dessa biverkningar när Movicol Appelsiini dosen minskas.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

5. Hur Movicol Appelsiini ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara inte läkemedlet i kylskåpet eller i frysen.

Öppnade flaskor bör användas inom 30 dagar.

När du har spätt ut Movicol Appelsiini i vatten, skall du förvara den täckt om du inte dricker den genast. Kasta all lösning som inte använts inom 24 timmar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

25 ml Movicol Appelsiini innehåller:

Macrogol 3350	13,125 g
Natriumklorid	0,3507 g
Natriumvätekarbonat	0,1785 g
Kaliumklorid	0,0466 g

Movicol Appelsiini innehåller även renat vatten, Appelsiiniarom och acesulfamkalium (E950) samt sukralos (E955) som sötningsämnen.

Preparatet innehåller även ett konserveringsmedel som består av bensylalkohol (E1519), methylparahydroxibensoat (E218) och etylparahydroxibensoat (E214). Se avsnitt 2 ”Movicol Appelsiini innehåller etyl- och methylparahydroxibensoat, alkohol (etanol), bensylalkohol och natrium”.

Appelsiiniaromen innehåller: aromämnen, arompreparat och låg mängd alkohol (etanol).

Då 25 ml späds i 100 ml vatten, motsvarar detta:

Natrium	65 millimol/liter
Klorid	53 millimol/liter
Kalium	5,4 millimol/liter
Vätekarbonat	17 millimol/liter

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Movicol Appelsiini är klar och färglös lösning.

Varje förpackning innehåller en 500 ml plastflaska Movicol Appelsiini och ett dosmått av plast.

Innehavare av försäljningsställstånd:

Norgine Healthcare B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederlanderna.

Marknadsförare:

SaboraPharma Oy
Tammelantie 10
03600 Högfors
Finland

Tillverkare

Norgine Pharma Dreux,
29, Rue Ethé Virton, 28109 Dreux Cedex,
Frankrike

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta det lokala ombudet för innehavaren av försäljningstillstånd.

Detta läke medel är godkänt inom det Europeiska ekonomiska samarbetssområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:

Österrike	MOVICOL Liquid Orange
Belgien	MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak / MOVICOL Liquide Goût orange / MOVICOL Flüssig Orangengeschmack
Finland	MOVICOL Appelsiini
Tyskland	Macrogol Norgine Orangengeschmack Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Irland	MOVICOL Liquid Orange flavour
Italien	MOVICOL 13,9 g/25 ml concentrato per soluzione orale, gusto Arancio
Luxemburg	MOVICOL Liquide Goût orange
Nederlanderna	Movicolon Liquid Orange
Portugal	MOVICOL Laranja
Spanien	Movicol Sabor Naranja concentrado para solución oral
Sverige	Movicol Apelsin
Förenade kungariket (Nordirland)	MOVICOL Liquid Orange flavour

Denna bipacks edel ändrades senast 02.05.2023