

Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

B12-vitamiini ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen

syano kobala miini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käytämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä B12-vitamiini ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat B12-vitamiini ratiopharm -valmistetta
3. Miten B12-vitamiini ratiopharm -valmistetta otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. B12-vitamiini ratiopharm -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä B12-vitamiini ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

B12-vitamiini ratiopharm -tablettien sisältämä syanokobalamiini korvaa elimistöstä puuttuvaa B₁₂-vitamiinia. B12-vitamiini ratiopharm -valmisteesta käytetään B₁₂-vitamiinin puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat B12-vitamiini ratiopharm -valmisteita

Älä ota B12-vitamiini ratiopharm -valmisteita

- jos olet allerginen syanokobalamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Ei erityisiä varotoimenpiteitä.

Muut lääkevalmisteet ja B12-vitamiini ratiopharm

Ei ole yhtesisvaikutuksia.

Raskaus ja imetyks

B12-vitamiini ratiopharm -valmisteesta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajamine ja koneiden käyttö

B12-vitamiini ratiopharm -valmisteella ei ole vaikutusta ajamiseen ja koneiden käyttöön.

3. Miten B12-vitamiini ratiopharm -valmisteita otetaan

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määritellyt tai apteekkienkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäristä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus

Mikäli lääkäri on määränyt jonkin muun annoksen, on sitä noudattettava.

Aikuisille: Alkuannos on yleensä 2–4 tablettia (2–4 mg) vuorokaudessa ja ylläpitoannos 1 tabletti (1 mg) vuorokaudessa.

Jos otat enemmän B12-vitamiini ratiopharm -valmisteita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaisina haittavaikutuksina on esiintynyt kutinaa, ihottumaa ja nokkosrokkoa. Allergisia reaktioita mukaan lukien ihoreaktioita ja angioedeemaa on raportoitu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. B12-vitamiini ratiopharm -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30°C.

Älä käytä tästä lääkettä pakauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä B12-vitamiini ratiopharm sisältää

- Vaikuttava aine on syanokobalamiini. Yksi tabletti sisältää 1 mg syanokobalamidia eli B₁₂-vitamiinia.
- Muut ainet ovat:
 - *Tablettiydin*: mannitoli (62,4 mg), esigelatinoitu tärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti, steariinihappo, perunatärkkelys.
 - *Kalvopäällyste*: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), makrogoli 400, punainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoot

Tabletin ulkonäkö: Vaaleanpunainen, kupera kalvopäällysteinen tabletti. Halkaisija noin 8 mm, merkintä "CCO".

Pakauskoot:

HDPE-muovipurki: 30, 60 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakauskokoa ei vältämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Alankomaat

Valmistaja

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.11.2021

Bipacksedel: Information till användaren

B12-vitamiini ratiopharm 1 mg filmdrage rad tablett

cyanokobalamin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande:

1. Vad B12-vitamiini ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar B12-vitamiini ratiopharm
3. Hur du tar B12-vitamiini ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur B12-vitamiini ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad B12-vitamiini ratiopharm är och vad det används för

Cyanokobalaminet som finns i B12-vitamiini ratiopharm tabletterna ersätter B₁₂-vitamin brist i kroppen. B12-vitamiini ratiopharm används för förebyggande och vård av B₁₂-vitamin brist.

2. Vad du behöver veta innan du tar B12-vitamiini ratiopharm

Ta inte B12-vitamiini ratiopharm

- om du är allergisk mot cyanokobalamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Inga speciella skyddsåtgärder.

Andra läke medel och B12-vitamiini ratiopharm

Ingen samverkan.

Graviditet och amning

B12-vitamiini ratiopharm tabletter kan användas under graviditet och amning.

Körförstående och användning av maskiner

B12-vitamiini ratiopharm har ingen inverkan på körförstående och användning av maskiner.

3. Hur du tar B12-vitamiini ratiopharm

Ta alltid detta läkemedel enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Om läkaren har ordinerat en annan dos, ska den i första hand följas. Vuxna: Initialdosen är vanligtvis 2–4 tabletter (2–4 mg) per dygn och underhållsdosen är 1 tablett (1 mg) per dygn.

Om du har tagit för stor mängd av B12-vitamiini ratiopharm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta biverkningar som har uppträtt är kläda, hudutslag och nässelfeber. Allergiska reaktioner som hudreaktioner och angioödem har rapporterats.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

5. Hur B12-vitamiini ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är cyanokobalamin. En tablett innehåller 1 mg cyanokobalamin, alltså B₁₂-vitamin.
- Övriga innehållsämnen är:
 - *Tablettkärnan:* manitol (62,4 mg), pregelatiniserad stärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, stearinsyra, potatisstärkelse.
 - *Filmdragering:* hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Ljusrosa, konvex tablett med filmdrägering. Diametern är ca 8 mm, utmärkning "CCO".

Förpackningsstorlekar:

HDPE-plastburk: 30, 60 och 100 tablettar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederländerna

Tillverkare

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läke medel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Teva Finland Oy

PB 67

02631 Esbo

Tel: 020 180 5900

Denna bipacksedel ändrade senast 18.11.2021