

# **VALMISTEYHTEENVETO**

## **1. LÄÄKEVALMISTeen NIMI**

LOCOID LIPID 0,1 % emulsiovoide

## **2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT**

Hydrokortisoni-17-butyraatti 1 mg /g  
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

## **3. LÄÄKEMUOTO**

Emulsiovoide

*Valmisteen kuvaus:* valkoinen tai melkein valkoinen emulsiovoide

## **4. KLIINiset TIEDOT**

### **4.1 Käyttöaiheet**

Paikalliskortikosteroideille reagoivat infektoitumattomat ihotaudit kuten kosketusekseemät sekä psoriasis.

Locoid-valmiste on tarkoitettu aikuisten ja yli 1-vuotiaiden lasten hoitoon.

### **4.2 Annostus ja antotapa**

#### Annostus

##### Aikuiset ja lapset

Pieni määärä Locoid-valmistetta levitetään ohuelti sairaalle alueelle 1 - 2 kertaa päivässä tai niin usein kuin tarve vaatii. Hoidon maksimipituus 3 - 4 viikkoa.

##### Pediatriset potilaat

Suuria määriä, peittohoitoa ja pitkittynyttä hoitoa tulee välttää. Imeväisillä hoitoajan ei normaalista tulisi ylittää seitsemää päivää.

##### Iäkkääät potilaat

Ei erityisiä varotoimia eikä tarvetta annosmuutoksiin.

### **4.3 Vasta-aiheet**

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Bakteerien ja sienten aiheuttamissa infektioissa paikalliskortikosteroidihoido voidaan suorittaa vain antimikrobioidon yhteydessä. Ihon virusinfektiot. Acne rosacea, perioraalinen dermatiitti, haavaumat.

### **4.4 Varoituset ja käyttöön liittyvät varotoimet**

Valmisteen joutuminen silmään tai sen läheisyyteen saattaa aiheuttaa glaucoma simplexin.

Systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy näön hämärtymisen kaltaisia oireita tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joista on ilmoitettu systeemisten tai topikaalisten

kortikosteroidien käytön jälkeen.

Kasvot, genitaalialue, taipeet tai muut alueet, joissa iho on ohutta, ovat erityisen herkkiä kortikosteroideille. Locoid-valmistetta tulee käyttää varoen näillä alueilla. Kädet tulee pestää käytön jälkeen ellei valmistetta käytetä käsiin hoitoon.

Systeemisten ja paikallisten haittavaikutusten riski on lisääntynyt hoidettaessa suuria tai hautuvia ihoalueita, peittohoidossa, usein tapahtuvassa annostelussa, sekä pitkääkaisessa käytössä. Systeemisiin haittavaikutuksiin, mukaan lukien lisämunuaiskuoren suppressio, tulee kiinnittää huomiota. Lapsilla tämä voi ilmetä nopeasti ja johtaa kasvuhormonin erityksen estymiseen.

Hoidon keskeytys saattaa aiheuttaa oireiden palaamista takaisin entistä voimakkaampina (rebound-vaikutus).

Kortikosteroidit läpäisevät istukan.

#### *Pediatriset potilaat*

Käyttö alle 1-vuotiaalle ei ole suositeltavaa.

Kliinissä tutkimuksissa ei ole osoitettu lapsille tyypillisä haittoja, jotka rajoittaisivat paikallisesti annostellun hydrokortisoni-17-butyraatin käyttöä lapsilla. Suurenman ihan pinta-ala/painosuhteen johdosta varovaisuutta ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjeita tulee kuitenkin noudattaa käytettäessä valmistetta lapsilla.

Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa imeväisten ihosairauksia mukaan lukien vaippaihottuma.

Lapsia hoidettaessa käytettäväksi olisi valittava tehokkuudeltaan vähiten potentti kortikosteroidi, jolla sairaus on hallittavissa.

### **4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

Kliinisesti merkittäviä interaktioita ei ole todettu.

### **4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetyks**

#### Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja hydrokortisoni-17-butyraatin käytöstä raskaana oleville naisille. Tulokset useista havainnoivista tutkimuksista (yli 1000 raskaudenaikaista altistusta) eivät ole osoittaneet merkittävää yhteyttä iholle annosteltavan kortikosteroidin raskaudenaikaisen käytön ja synnynnäisten epämuodostumien, ennenaikeisen syntymän, sikiökuoleman tai synnytystavan välillä, vahvuudesta riippumatta.

Ei ole tehty riittäviä eläinkokeita hydrokortisoni-17-butyraatin lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi. Vaikka vahvempien kortikosteroidien on eläinkokeissa osoitettu olevan teratogeenisä iholle annosteltaessa kliinistä merkitystä ihmisillä ei ole osoitettu.

Locoid-valmistetta tulee käyttää raskauden aikana vain kun mahdollinen hyöty ylittää mahdolliset haitat.

#### Imetyks

Ei tiedetä, erityykö/erittyvätkö hydrokortisoni-17-butyraatti/metaboliitit ihmisen rintamaitoon iholle tapahtuvan annostelun jälkeen.

Locoid-valmisteen imetyksen aikaisen käytön ei oleteta vaikuttavan imetyiseen, koska paikallisesti annostellun hydrokortisoni-17-butyraatin systeeminen imetyminen on vähäistä.

Voidaan käyttää imetyksen aikana, mutta on suositeltavaa välttää valmisteen käytöä rinnan iholla.

#### Hedelmällisyys

Locoid-valmisteen vaikutusta hedelmällisyyteen koskevaa tutkimustietoa ihmisiä tai eläimiä ei ole käytettäväissä.

## 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Tutkimuksia valmisten vaikutuksesta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty, mutta Locoid-valmisten ei oleteta vaikuttavan näihin.

## 4.8 Haittavaikutukset

Kliinissä tutkimuksissa on raportoitu ihoärsytystä ja yliherkkyyttä.

Yleisimmät myyntiluvan myöntämisen jälkeiset raportoidut haittavaikutukset ovat yliherkkyyss ja ihoreaktiot kuten punoitus, kutina ja ihmisen infektiot.

Haittavaikutukset on lueteltu MedDRA-elinjärjestelmittäin. Kussakin yleisyytsluokassa haittavaikutukset on esitetty vakavuudeltaan alenevassa järjestyksessä. Yleisyytsluokat ovat:

Hyvin yleinen ( $\geq 1/10$ )

Yleinen ( $\geq 1/100, < 1/10$ )

Melko harvinainen ( $\geq 1/1\,000, < 1/100$ )

Harvinainen ( $\geq 1/10\,000, < 1/1\,000$ )

Hyvin harvinainen ( $< 1/10\,000$ )

Tuntematon (ei voida arvioida käytettävissä olevan tiedon perusteella)

	Harvinainen ( $\geq 1/10\,000, < 1/1\,000$ )	Hyvin harvinainen ( $< 1/10\,000$ )	Tuntematon
Infektiot			Ihmisen infektiot
Immuniijärjestelmä			Yliherkkyyss
Umpieritys		Lisämunuaiskuoren suppressio	
Iho ja ihmusalainen kudos	Atrofia* Dermatiitti** Teleangiekktasia Ihmisen punatäpläisyys Striat Akne Perioraalidermatiitti Depigmentaatio		
Silmät			Näön hämärtyminen***
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat	Rebound-vaikutus		Kipu hoidettavalla ihmalueella

\* Usein pysyvä johon liittyy orvaskeden ohentumista.

\*\* Dermatiittiä ja ihottumaa, mukaan lukien kosketusihottumaa, on raportoitu.

\*\*\* ks. myös kohta 4.4.

### Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **4.9 Yliannostus**

Locoid-valmisteen yliannostuksesta ei ole olemassa tutkimustuloksia. Kroonisen liika-annostelun yhteydessä hyperkortisolismin oireita voi esiintyä.

## **5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET**

### **5.1 Farmakodynamiikka**

Farmakoterapeutinen ryhmä: Locoid kuuluu keskivahvoihin kortikosteroideihin (II ryhmä).

Vaikutustapa:

Locoid-valmisteella on anti-inflammatorinen ja vasokonstriktiivinen vaikutus. Se hillitsee erityyppisten iholeesioiden tulehdusellisia reaktioita.

Locoid Lipid emulsiovoide on puskuroitu öljy-vesiemulsio. Se sopii hyvin subakuuttien ja kroonisten ihosairauksien hoitoon.

### **5.2 Farmakokinetiikka**

Valmisten levittämisen jälkeen Locoid vaikuttaa pääasiassa epidermissessä, stratum corneumin alueella. Penetroitumista ihoon voidaan parantaa käyttämällä peittosidettä. Systeemisiä vaikutuksia ei ole havaittu käytettäessä suositeltua annosta.

### **5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta**

Prekliiniset tiedot, jotka perustuvat tutkimuksiin toistuvien annoksienvaihteluiden, mutageenisyydestä sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuudesta, eivät osoita erityistä vaaraa ihmisille.

## **6. FARMASEUTTISET TIEDOT**

### **6.1 Apuaineet**

Setostearyylialkoholi, makrogoli-25-setostearyylieetteri, kevyt nestemäinen parafiini, valkovaseliini, vedetön sitruunahappo, vedetön natriumsitraatti, propyyliparahydroksibentsoaatti, bentsyylialkoholi ja puhdistettu vesi.

### **6.2 Yhteensopimattomuudet**

Ei oleellinen.

### **6.3 Kestoaika**

3 vuotta. Pakkauksen avaamisen jälkeen: 6 kuukautta.

### **6.4 Säilytys**

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätynä.

### **6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot**

30 g, 100 g aluminiiputki  
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### **6.6 Erityiset varotoimet hävittämiseelle**

Valmistetta ei tule käyttää kelpoisuusajan päätyttyä. Vanhentunut valmiste hävitetään kuten lääkejätteet yleensä.

**7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  
Ziegelhof 24  
17489 Greifswald  
Saksa

**8. MYYNTILUVAN NUMERO**

8784

**9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

20.6.1984/6.11.2000

**10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

07.02.2022

# PRODUKTRESUMÉ

## 1. LÄKEMEDLETS NAMN

LOCOID LIPID 0,1 % kräm

## 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Hydrokortison-17-butyrat 1 mg/g

För fullständig förteckning över hjälpmännen, se avsnitt 6.1

## 3. LÄKEMEDELSFORM

Kräm

*Beskrivning av läkemedlet:* vit eller nästan vit kräm

## 4. KLINISKA UPPGIFTER

### 4.1 Terapeutiska indikationer

Hudsjukdomar, t.ex. kontakteksem och psoriasis, som inte innefattar infektion och som reagerar på lokala kortikosteroider.

Locoid är avsett för behandling av vuxna samt barn över 1 år.

### 4.2 Dosering och administreringssätt

#### Dosering

##### Vuxna och barn

En liten mängd Locoid appliceras i ett tunt lager på drabbade hudområden 1–2 gånger om dagen eller så ofta det behövs. Maximal behandlingstid är 3–4 veckor.

##### *Pediatrisk population*

Användning av stora mängder kräm, ocklusionsbehandling och långvarig behandling ska undvikas. För spädbarn ska behandlingstiden normalt inte överskrida sju dagar.

##### *Äldre patienter*

Inga specifika försiktighetsåtgärder eller dosjusteringar är nödvändiga.

### 4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpmäne som anges i avsnitt 6.1.

Vid infektioner förorsakade av bakterier och svampar kan lokal kortikosteroidbehandling ges endast i kombination med antimikrobiell behandling. Virusinfektioner i huden. *Acne rosacea*, perioral dermatit, sår bildning.

### 4.4 Varningar och försiktighet

Om preparatet kommer i kontakt med ögonen eller området nära ögonen kan det orsaka *glaucoma simplex*.

I samband med användning av systemiska eller topikala kortikosteroider kan det förekomma rapporter om

synrubbningar. Patienter som uppvisar symptom såsom dimsyn eller andra synrubbningar ska hänvisas till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker till symtomen. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati, som har rapporterats efter användning av systemiska eller topikala kortikosteroider.

Ansikte, genitalområde, hudveck och andra områden där huden är tunn är särskilt känsliga för kortikosteroider. Locoid ska användas med försiktighet på dessa områden. Händerna ska tvättas efter varje applicering, såvida inte Locoid används för att behandla händerna.

Risken för systemiska och lokala biverkningar är förhöjd vid behandling av stora eller intertriginösa hudområden, vid ocklusionsbehandling, vid frekvent applicering samt vid långvarig användning. Uppmärksamhet ska fästas vid systemiska biverkningar, däribland binjurebarkssuppression. Hos barn kan detta uppkomma snabbt och leda till att sekretionen av tillväxthormon förhindras.

Avbrytande av behandlingen kan leda till att symtomen återkommer och är ännu kraftigare än tidigare (s.k. reboundeffekt).

Kortikosteroider passerar placentabarriären.

#### *Pediatrisk population*

Användning hos barn under 1 år rekommenderas inte.

I kliniska studier har inga biverkningar som är typiska för barn och som skulle begränsa användningen av lokalt applicerat hydrokortison-17-butyrat påvisats. Eftersom barn har en större hudyta i förhållande till kroppsvikten ska dock försiktighet iakttas och hälso- och sjukvårdspersonalens anvisningar följas när preparatet ges till barn.

Särskild försiktighet ska iakttas vid behandling av hudsjukdomar hos spädbarn, inklusive blöjdermatit.

Behandling av barn ska genomföras med den, avseende effekt, minst potenta kortikosteroiden med vilken sjukdomskontroll uppnås.

### **4.5 Interaktioner med andra läke medel och övriga interaktioner**

Inga kliniskt betydelsefulla interaktioner har konstaterats.

### **4.6 Fertilitet, graviditet och amning**

#### Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av hydrokortison-17-butyrat i gravida kvinnor. Data från ett flertal observationsstudier (fler än 1 000 exponeringar under graviditet) har inte visat på något betydande samband mellan användning av lokalt applicerade kortikosteroider under graviditet och kongenitala missbildningar, förtidsbörd, fosterdöd eller förlossningssätt, oavsett styrka.

Djurstudier är otillräckliga avseende reproduktionstoxikologiska effekter av hydrokortison-17-butyrat. Även om starkare kortikosteroider i djurstudier har visat sig vara teratogena vid applicering på huden har detta inte påvisats ha någon klinisk relevans hos mänskliga.

Locoid ska användas under graviditet endast när den möjliga nyttan överväger de potentiella riskerna.

#### Amning

Det är okänt om hydrokortison-17-butyrat/metaboliter utsöndras i bröstmjölk efter kutan administrering.

Användning av Locoid under amning förväntas inte påverka spädbarn, eftersom den systemiska absorptionen av lokalt applicerat hydrokortison-17-butyrat är ringa.

Locoid kan användas under amning, men applicering direkt på brösten ska undvikas.

## Fertilitet

Det finns inga tillgängliga djur- eller humandata om Locoids inverkan på fertilitet.

## **4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner**

Inga studier av Locoids effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts, men preparatet förväntas inte ha någon effekt på dessa.

## **4.8 Biverkningar**

Hudirritation och överkänslighet har rapporterats i kliniska studier.

De vanligaste rapporterade biverkningarna efter godkännande för försäljning är överkänslighet och hudreaktioner såsom erytem, pruritus och hudinfektioner.

Biverkningarna är listade enligt MedDRA:s klassificering av organsystem. Inom respektive frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad. Biverkningsfrekvenserna är följande:

Mycket vanliga ( $\geq 1/10$ )

Vanliga ( $\geq 1/100, < 1/10$ )

Mindre vanliga ( $\geq 1/1\ 000, < 1/100$ )

Sällsynta ( $\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$ )

Mycket sällsynta ( $< 1/10\ 000$ )

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

	Sällsynta ( $\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$ )	Mycket sällsynta ( $< 1/10\ 000$ )	Ingen känd frekvens
Infektioner och infestationer			Hudinfektioner
Immunsystemet			Överkänslighet
Endokrina systemet		Binjurebarkssuppression	
Hud och subkutan vävnad	Atrofi* Dermatit** Telangiaktasi Röda fläckar på huden Stria Akne Perioral dermatit Depigmentering		
Ögon			Dimsyn***
Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället	Reboundeffekt		Smärta vid applikationsstället

\* Ofta irreversibel med förtunning av *epidermis*.

\*\* Dermatit och utslag, inklusive kontaktdermatit, har rapporterats.

\*\*\* se även avsnitt 4.4.

## Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

## 4.9 Överdosering

Det finns inga studiedata om överdosering av Locoid. Symtom på hyperkortisolism kan förekomma i samband med kronisk överdosering.

## 5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

### 5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Locoid hör till gruppen medelstarkt verkande kortikosteroider (grupp II).

Verkningssätt:

Locoid har antiinflammatorisk och vasokonstriktiv effekt. Det dämpar inflammatoriska reaktioner vid olika typer av hudlesioner.

Locoid Lipid kräm är en buffrad olja i vatten-emulsion. Den är väl lämpad för behandling av subakuta och kroniska hudsjukdomar.

### 5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Efter applicering utövar Locoid sin effekt huvudsakligen i *stratum corneum* i *epidermis*. Penetreringen av huden kan förbättras genom användning av ocklusionsförband. Systemiska effekter har inte observerats vid användning av den rekommenderade dosen.

### 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data från studier avseende allmäntoxicitet, mutagenicitet samt reproductionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för mänskliga.

## 6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

### 6.1 Förteckning över hjälppämnen

Cetostearylalkohol, makrogol-25-cetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyrta, vattenfritt natriumcitrat, propylparahydroxibensoat, bensylalkohol och renat vatten.

### 6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

### 6.3 Hållbarhet

3 år. Efter öppnande av förpackningen: 6 månader.

### 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

### 6.5 Förpackningstyp och innehåll

30 g, 100 g aluminiumtub

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

## **6.6 Särskilda anvisningar för destruktion**

Preparatet ska inte användas efter att det har passerat utgångsdatum. Ej använt läke medel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

## **7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  
Ziegelhof 24  
17489 Greifswald  
Tyskland

## **8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

8784

## **9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE**

20.6.1984/6.11.2000

## **10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN**

07.02.2022