

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **NiQuitin Tropical 2 mg tai 4 mg lääkepurukumi**

#### **nikotiini**

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin terveydenhoitohenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa terveydenhoitohenkilökunnalta, esimerkiksi lääkäriltä, sairaanhoitajalta, tupakoinnin lopettamisessa auttavalta tukihenkilöltä tai apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä terveydenhoitohenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellet ole onnistunut lopettamaan tupakointia, kun olet käyttänyt NiQuitin Tropical 2 mg tai 4 mg -lääkepurukumeja 9 kuukauden ajan.
- Tässä pakkausselosteessa NiQuitin Tropical 2 mg ja 4 mg -lääkepurukumeista käytetään nimeä NiQuitin Tropical -purukumit.

#### **Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä NiQuitin Tropical -purukumi on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät NiQuitin Tropical -purukumia
3. Miten NiQuitin Tropical -purukumia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. NiQuitin Tropical -purukumien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä NiQuitin Tropical -purukumi on ja mihin sitä käytetään**

NiQuitin Tropical -purukumia käytetään apuna tupakoinnin lopettamisessa. Tämäntyyppistä hoitoa kutsutaan nikotiinikorvaushoidoksi.

Savukkeiden sisältämä nikotiini voi aiheuttaa fyysistä riippuvuutta.

- NiQuitin Tropical -purukumi auttaa tupakoinnin lopettamisessa, sillä se korvaa osan savukkeista saadusta nikotiinista.
- Purukumista saatava nikotiini lievittää joitakin epämiellyttäviä oireita, joita tupakoija voi tuntea yrittäessään lopettaa tupakointi. Näitä ovat esimerkiksi sairauden tunne tai ärtyisyys.
- Purukumien nikotiini voi lievittää myös tupakanhimoa ja auttaa vastustamaan tupakointihalua.

NiQuitin Tropical -purukumilla ei ole tupakan terveyshaittoja. Tämä johtuu siitä, että purukumeissa ei ole tervaa, hääkää eikä muita tupakansavun myrkyllisiä aineita. Jotkut voivat pelätä, että tupakoinnin lopettamisen jälkeen heistä tulee riippuvaisia nikotiinipurukumista. Tämä on erittäin harvinaista, ja jos niin tapahtuu, se on vähemmän haitallista kuin tupakoinnin jatkaminen. Siitä on myös helpompi päästä irti.

Mahdollisuutesi onnistua tupakoinnin lopettamisessa paranevat, jos osallistut myös kannustusohjelmaan. Tällaisia ”tupakoinninlopettamisohjelmia” kutsutaan tukiohjelmiksi, jotka auttavat muuttamaan käytöstä. Lisätietoja tupakoinnin lopettamisen tukiohjelmista saat terveydenhoitohenkilöltä tai apteekista.

Tupakoinnilla ei ole mitään hyviä terveysvaikutuksia. Tupakoinnin lopettaminen on aina paras vaihtoehto. Nikotiinikorvaushoidosta, kuten NiQuitin Tropical -purukumeista, voi olla apua. Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä huomattavasti vähäisempiä kuin tupakoinnin jatkamisen hyvin tunnetut vaarat.

## **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät NiQuitin Tropical -purukumia**

### **Älä käytä NiQuitin Tropical -purukumia**

- Jos olet allerginen nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- Jos olet alle 12-vuotias.

### **Varoitukset ja varotoimet**

### **Keskustele terveydenhoitohenkilökunnan kanssa ennen kuin aloitat NiQuitin Tropical -purukumien käytön:**

- Jos sinulla on ollut hiljattain sydänkohtaus tai aivohalvaus tai sinulla on vaikeita sydämen rytmihäiriöitä, epävakaata tai pahenevaa angina pectoris (rintakipu), korkea verenpaine, jota ei saada hallintaan lääkityksellä, tai rintakipua levossa, sinun on yritettävä lopettaa tupakointi ilman nikotiinikorvaushoitovalmisteita, paitsi jos lääkäri kehottaa sinua käyttämään niitä.
- Jos sinulla on diabetes, sinun on seurattava verensokeriarvojasi tavallista useammin, kun aloitat NiQuitin Tropical -purukumien käytön. Insuliinin tai lääkkeiden tarve saattaa muuttua.
- Jos sinulla on joskus ollut allergisia reaktioita, joihin liittyy huulien, kasvojen ja kurkun turpoamista (angioedeemaa) tai kutiavaa ihottumaa (nokkosihottumaa). Nikotiinikorvaushoitovalmisteet voivat joskus aiheuttaa tämäntyyppisiä reaktioita.
- Jos käytät hammasproteesia, sillä se voi vaikeuttaa purukumin pureskelua.
- Nikotiinipurukumin pureskelu voi löysyttää hammaspaikkoja tai hammasimplanttia.
- Nikotiinikorvaushoito ei sovi alle 12-vuotiaille lapsille. Nikotiini vaikuttaa lapsiin enemmän kuin aikuisiin. Se voi aiheuttaa lapsille vaikean myrkytyksen, joka voi johtaa kuolemaan.

Älä vaihda NiQuitin Tropical -purukumeja nikotiinia sisältäviin imeskelytabletteihin tai päinvastoin kun yrität lopettaa tupakointia.

Muuta huomioitavaa: Tämän lääkkeen käyttöön liittyy riippuvuuden kehittymisen riski.

### **Pyydä apua ja ohjeita terveydenhoitohenkilökunnalta, jos sinulla on:**

- Vaikeita tai kohtalaisia maksan tai munuaisten toimintahäiriöitä, sillä haittavaikutusten vaara saattaa tällöin olla suurempi.
- Huonossa hoitotasapainossa oleva kilpirauhasen liikatoiminta tai feokromosytooma (lisämunuaisen kasvain, joka voi vaikuttaa verenpaineeseen), koska nikotiini voi pahentaa oireitasi. Lääkäri on kertonut sinulle tästä.
- Maha- tai pohjukaissuolihaava tai ruokatorvitulehdus, koska nikotiinin nieleminen voi pahentaa oireitasi. Se voi myös aiheuttaa suun haavaumia. Jos oireesi pahenevat, ota yhteyttä lääkäriin. Haluat ehkä vaihtaa purukumit toisenlaiseen korvaushoitovalmisteeseen, esimerkiksi nikotiinilaastareihin.

### **Lapset (alle 12-vuotiaat)**

Aikuisille sopiva annos voi aiheuttaa pienille lapsille vakavan myrkytystilan, joka voi johtaa kuolemaan. Siksi on erittäin tärkeää, että pidät NiQuitin Tropical -purukumit aina poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

## **Muut lääkevalmisteet ja NiQuitin Tropical -purukumi**

Kerro terveydenhoitohenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Tupakoinnin lopettaminen voi muuttaa joidenkin käyttämiesi lääkkeiden vaikutuksia. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, keskustele niistä terveydenhoitohenkilökunnan kanssa.

Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät lääkkeitä, jotka sisältävät:

- teofylliiniä (käytetään astman hoitoon)
- takriinia (käytetään Alzheimerin taudin hoitoon)
- klotsapiinia (käytetään skitsofrenian hoitoon)
- ropinirolia (käytetään Parkinsonin taudin hoitoon).

## **NiQuitin Tropical -purukumi ruuan ja juoman kanssa**

Älä syö tai juo, kun sinulla on NiQuitin Tropical -purukumi suussasi.

Happamat juomat (esim. hedelmämehut, kahvi tai virvoitusjuomat) vaikuttavat nikotiinin imeytymiseen suuontelosta.

Jotta purukumeista saadaan paras mahdollinen teho, näitä juomia on syytä välttää noin 15 minuutin ajan ennen NiQuitin Tropical -purukumien pureskelua.

## **Raskaus, imetys ja hedelmällisyys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy terveydenhoitohenkilökunnalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaudenaikainen tupakointi voi aiheuttaa haittoja sikiölle. Näitä ovat sikiön kasvun hidastuminen, ennenaikainen syntymä tai sikiökuolema. Tupakoinnin lopettaminen on paras tapa parantaa sekä omaa terveyttäsi että lapsesi terveyttä. Mitä aikaisemmin lopetat, sen parempi.

Jos olet raskaana, sinun tulisi lopettaa tupakointi mieluiten ilman nikotiinikorvaushoitoa. Ellei tämä kuitenkaan ole onnistunut yrityksistäsi huolimatta, terveydenhoitohenkilökunta saattaa suositella nikotiinikorvaushoitoa auttamaan sinua tupakoinnin lopettamisessa. Tämä on parempaa kehittyvälle lapsellesi kuin tupakoinnin jatkaminen. Päätös nikotiinikorvaushoidon käytöstä on tehtävä raskautesi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sitä ei pitäisi käyttää kauempaa kuin 2–3 kuukautta. Muista, että tärkeintä on tupakoinnin lopettaminen. Nikotiinipurukumin kaltaiset valmisteet saattavat olla suositeltavampia kuin nikotiinilaastarit. Tämä johtuu siitä, että purukumeista ei tule nikotiinia elimistöön koko ajan. Laastarit voivat kuitenkin olla parempi vaihtoehto, jos sinulla on pahoinvointia tai oksentelua.

Jos imetät, tupakansavu aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja muita ongelmia vauvoille ja pienille lapsille. Tupakointi pitäisi lopettaa mieluiten ilman nikotiinikorvaushoitoa. Ellei tämä kuitenkaan ole onnistunut yrityksistäsi huolimatta, terveydenhoitohenkilökunta saattaa suositella nikotiinikorvaushoitoa. Jos tarvitset nikotiinikorvaushoitoa auttamaan tupakoinnin lopettamisessa, vauvan mahdollisesti saama nikotiinimäärä on pieni. Parhaita ovat sellaiset nikotiinikorvaushoitovalmisteet, joita otetaan vain tiettyinä aikoina päivästä (purukumit tai imeskelytabletit mieluummin kuin laastarit). Vauva pitäisi myös mieluiten imettää juuri ennen purukumin käyttöä. Tällöin vauva saa mahdollisimman pienen määrän nikotiinia.

## Ajaminen ja koneiden käyttö

NiQuitin Tropical -purukumilla ei ole tunnettuja vaikutuksia ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn. Tupakoinnin lopettaminen voi kuitenkin aiheuttaa käyttäytymismuutoksia, jotka voivat vaikuttaa ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita.

### NiQuitin Tropical -purukumi sisältää

- Natriumia – Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) yhtä purukumia kohti eli käytännössä se ei sisällä natriumia.
- Sorbitolia (E420) – Jos sinulla on todettu jonkin sokerin sietohäiriö (intoleranssi), neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön.
- Butyylihydroksitolueenia (E321) – tämä saattaa ärsyttää limakalvoja.

### 3. Miten NiQuitin Tropical -purukumia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin terveydenhoitohenkilökunta on neuvonut sinulle. Tarkista ohjeet terveydenhoitohenkilökunnalta, jos olet epävarma.

Kun yrität lopettaa tupakoinnin NiQuitin Tropical -purukumin avulla, on tärkeää, että yrität kaikin voimin lopettaa tupakoinnin kokonaan. Jos kuitenkin poltat savukkeeseen nikotiinikorvaushoidon aikana, sinun kannattaa siitä huolimatta jatkaa lopettamisyritystäsi. Jos sinulla on edelleen vaikeuksia tupakoinnin lopettamisessa, keskustelu lääkärin, sairaanhoitajan, lopettamisessa auttavan tukihenkilön tai apteekkihenkilökunnan kanssa voi auttaa.

NiQuitin Tropical 2 mg -purukumi on tarkoitettu tupakoitsijoille, jotka polttavat alle 20 savuketta päivässä. NiQuitin Tropical 4 mg -purukumi on tarkoitettu tupakoitsijoille, jotka polttavat 20 savuketta päivässä tai enemmän.

Älä pureskele NiQuitin Tropical -purukumia samalla tavoin kuin tavallista purukumia. Jos NiQuitin Tropical -purukumia pureskellaan liian nopeasti ilman taukoja, nikotiinia vapautuu liian nopeasti. Se voi aiheuttaa epämiellyttäviä tunteita (esim. närästystä ja nikottelua).

Kun otat NiQuitin Tropical -purukumin pakkauksesta, repäise suojapaperi pois ja paina purukumityyny ulos. Laita yksi purukumityyny suuhusi ja pureskele hitaasti, kunnes maku voimistuu (noin 1 minuutin ajan). Keskeytä pureskelu ja pidä purukumia ikenen ja posken välissä. Kun maku heikkenee, pureskele muutamia kertoja, kunnes maku voimistuu, ja keskeytä pureskelu uudelleen. Kun purukumia on käytetty tällä tavoin noin 30 minuutin ajan, se on käytetty loppuun. Älä syö äläkä juo, kun purukumi on suussasi, sillä se voi vähentää nikotiinin imeytymistä. Älä käytä enempää kuin 15 purukumia päivässä. Jos tunnet tarvetta käyttää NiQuitin Tropical -purukumeja pitempään kuin 9 kuukauden ajan, kysy neuvoa terveydenhoito-henkilökunnalta.

Voit noudattaa NiQuitin Tropical -purukumien käytössä seuraavaa aikataulua, joka on laadittu siten, että käyttämiesi purukumien määrä vähenee asteittain.

### Aikuiset (18 vuotta täyttäneet)

- Aloita käyttämällä 8–12 purukumia vuorokaudessa. Pureskele yksi purukumi aina, kun tunnet tarvetta tupakoida.
- Käytä purukumeja tällä tavoin enintään 3 kuukauden ajan, ja vähennä sitten päivittäisten purukumien määrää asteittain (ks. taulukko alla).
- Kun käytät enää 1 tai 2 purukumia vuorokaudessa, lopeta purukumien käyttö kokonaan.

Vielä lopettamisen jälkeenkin tupakanhimo saattaa joskus iskeä yllättäen. Jos niin käy, voit käyttää yhden purukumin.

| VAIHE 1  | VAIHE 2  | VAIHE 3   |
|--|--|---|
| Hoidon alkuvaihe<br><br>Pureskele<br>1 purukumi aina kun tunnet tupakanhimoa.<br>Käytä<br>8–12 purukumia/vrk enintään<br>3 kuukauden ajan. | Hoidon asteittaisen vähentämisen vaihe<br>Vähennä<br>purukumien käyttö vähitellen<br>1–2 purukumiin/vrk.<br>Lopeta sitten hoito. | Tukihoito<br><br>Pureskele 1 purukumi, jos äkillinen tupakanhimo iskee. |

## Käyttö lapsille ja nuorille

### Nuoret (12–17-vuotiaat)

Nuoret eivät saa käyttää NiQuitin Tropical -purukumeja, paitsi jos lääkäri suosittelee niitä heille.

Älä ylitä ilmoitettua annosta. Älä tupakoi äläkä käytä samaan aikaan muita nikotiinia sisältäviä valmisteita. Noudata ohjeita huolellisesti äläkä käytä enempää kuin 15 purukumia vuorokaudessa (24 tuntia).

### Alle 12-vuotiaat lapset

Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää NiQuitin Tropical -purukumeja.

### Jos tunnet houkutusta aloittaa tupakoinnin uudelleen

Jos sinua huolestuttaa, että saatat aloittaa tupakoinnin uudelleen, tai jos sinun on vaikea lopettaa purukumien käyttö kokonaan, keskustele terveydenhoitohenkilökunnan kanssa. Jos aloitat tupakoinnin uudelleen, he voivat neuvoa, kuinka saat parhaat tulokset uusien nikotiinikorvaushoitokurien avulla.

### Jos käytät enemmän NiQuitin Tropical -purukumeja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos käytät liian monta NiQuitin Freshmint -purukumia, saatat tuntea pahoinvointia, huimausta ja huonovointisuutta. Lopeta purukumien käyttö ja hakeudu heti lääkäriin tai sairaalan ensiapupoliklinikalle. Näytä heille purukumipakkaus tai tämä pakkausseloste, jos mahdollista.

Purukumit eivät sovi alle 12-vuotiaille lapsille. Jos lapset käyttävät purukumeja, heille saattaa ilmaantua nikotiinin yliannostuksen oireita. Niitä ovat päänsärky, pahoinvointi, vatsakivut ja ripuli. Jos lapsi on käyttänyt tai niellyt purukumeja, ota heti yhteyttä lääkäriin tai lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikkaan, sillä tämä voi olla erittäin vaarallista ja jopa johtaa kuolemaan. Näytä heille purukumipakkaus tai tämä pakkausseloste, jos mahdollista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny terveydenhoitohenkilökunnan puoleen.

#### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä. Suositeltuja annoksia käytettäessä NiQuitin Tropical -purukumien ei ole todettu aiheuttavan vakavia haittavaikutuksia.

Tupakoinnin lopettaminen voi itsessään aiheuttaa oireita, kuten heitehuimausta, päänsärkyä, unihäiriöitä, yskää, flunssan kaltaisia oireita. Myös masennus, ärtyisyys, ahdistuneisuus ja unettomuus voivat liittyä tupakoinnin lopettamisen aiheuttamiin vieroitusoireisiin.

Lopeta NiQuitin Tropical -purukumien käyttö ja hakeudu heti lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista allergisen reaktion oireista, sillä oireet voivat olla vakavia:

Harvinaiset haittavaikutukset (näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta)

- kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen
- nielemisvaikeudet
- nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet
- epäsäännöllinen sydämen syke.

Muut haittavaikutukset luetellaan alla niiden todennäköisen yleisyyden mukaan.

Yleiset (näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

- pahoinvointi, maha- ja suolisto-oireet
- kurkkukipu, suun aristus tai kuiva suu, suun ärsytys tai haavaumat, nielutulehdus, yskä
- unihäiriö, päänsärky, ärtyisyys, heitehuimaus
- oksentelu, nikottelu, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat, ripuli, ummetus
- leukakipu.

Mikään edellä olevista vaikutuksista ei ole vakava, ja ne häviävät usein muutaman päivän hoidon jälkeen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta)

- sydämen sykkeen nopeutuminen tai tietoisuus sydämen lyönneistä
- pyörrytyksen tunne
- hengitysvaikeudet, rintakipu
- makuhäiriöt / makujen vääristyminen
- kutina tai ihottuma, ihon punoitus, lisääntynyt hikoilu
- lihasten tai nivelten kipu tai turvotus
- suun limakalvon tulehdus
- vapina
- yleinen huonovointisuus.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä tuhannesta)

- vaikeat allergisen reaktion oireet, joita ovat äkillinen hengityksen vinkuminen tai painon tunne rintakehässä, ihottuma ja pyörtymisen tunne.

**Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä terveydenhoitohenkilökunnalle.**

**Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haettavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haettavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haettavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haettavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haettavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## 5. NiQuitin Tropical -purukumin säilyttäminen

- **Ei lasten ulottuville eikä näkyville.**
- Älä käytä tätä lääkettä läpipainolevyssä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
- Säilytä alle 25 °C.
- Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.
- Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### Mitä NiQuitin Tropical -purukumit sisältävät:

- Vaikuttava aine on nikotiini. Yksi purukumi sisältää 2 mg tai 4 mg nikotiinia (hartsiyhdisteenä, josta käytetään nimeä nikotiiniresinaatti).
- Muut aineet ovat:
  - Purukumi sisältää: Butyylihydroksitolueeni (E321), sorbitoli (E420), ksylitoli (E967), kalsiumkarbonaatti (E170), natriumkarbonaatti, vedetön (E500), glyseroli (E422), asesulfaamikalium (E950), sukraloosi (E955), mannitoli (E421), akaasiakumi (E414), titaanidioksidi (E171) ja
  - Makuaineet: Levomentoli, Optacool, Optamint Tropical (sis. glyseryylitriasetaattia (E1518) ja alfa-tokoferolia (E307), Optamint Tropical SD (sis. arabikumia (E414) ja sorbitolia (E420), Microcandy Fruit Cocktail (sis. mannitolia (E421), glyseryylitriasetaattia (E1518) ja rasvahappojen mono- ja diglyseridejä (E471), Optamint Grapefruit -makuaine.

### Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Valkoinen tai luonnonvalkoinen suorakulmion muotoinen purukumi

Yhdessä läpipainolevyssä on 4 tai 10 purukumia.

Pakkauksessa on 4, 10, 30, 100 tai 200 purukumia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### Myyntiluvan haltija ja valmistaja

#### Myyntiluvan haltija

Omega Pharma Nordic AB

Box 7009

SE-164 07 Kista

Ruotsi

#### Valmistaja

Fertin Pharma A/S  
Dandyvej 19  
7100 Vejle  
Tanska

**Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:**

|                  |  |
|------------------|--|
| Alankomaat       | NiQuitin Tropical Fruit 2 mg & 4mg Wirkstoffhaltiges Kaugummi  |
| Belgia           | NiQuitin Tropicisch Fruit – Fruits tropicaux - Tropicische Früchte 2mg/4 mg Gomme à mâcher médicamenteuse  |
| Espanja          | NiQuitin Fruit 2mg & 4mg chicles medicamentosos  |
| Irlanti          | NiQuitin Tropical Fruit 2mg & 4mg medicated chewing gum  |
| Iso-Britannia    | Nicabate Tropical Flavour 2mg & 4mg Medicated Chewing Gum  |
| Italia           | NIQUITINTROPS 2/4mg gomme da masticare medicata gusto frutta tropicale                                     |
| Itävalta         | NiQuitin Tropical Fruit 2 mg & 4 mg Wirkstoffhaltiges Kaugummi   |
| Kreikka          | NiQuitin Tropical Fruit  |
| Kroatia          | NiQuitin GUM Tropical Fruit 2 mg & 4 mg ijekovita guma za žvakanje   |
| Latvia           | NiQuitin Fruit 2mg & 4mg ārstnieciskā košļājamā gumija   |
| Liettua          | NiQuitin Fruit 2mg & 4mg vaistinė kramtomoji guma  |
| Luxemburg        | NiQuitin Tropicisch Fruit – Fruits tropicaux - Tropicische Früchte 2 mg/4 mg Gomme à mâcher médicamenteuse |
| Norja            | Nicabate 2 mg/4 mg medisinsk tyggegummi Tropisk frukt  |
| Portugali        | NiQuitin Tropical 2 mg & 4 mg gomas para mascar medicamentosas   |
| Puola            | NiQuitin Tropical  |
| Romania          | NIQUITIN Fresh 2mg & 4mg, gumă masticabilă medicamentoasă  |
| Ruotsi           | NiQuitin Tropiskt frukt 2 mg & 4 mg medicinskt tuggummi  |
| Saksa            | NiQuitin 2mg & 4mg Wirkstoffhaltiges Kaugummi mit Tropenfruchtgeschmack                                    |
| Slovakia         | NiQuitin Tropické ovocie 2mg & 4mg liečivé žuvačky   |
| Suomi            | NiQuitin Tropical 2 mg & 4 mg lääkepurukumi  |
| Tanska           | NiQuitin Tropical 2 mg & 4 mg medicinsk tyggegummi   |
| Tšekin tasavalta | NiQuitin tropickéovoce   |
| Unkari           | NiQuitin trópusi gyümölcs 2mg & 4mg gyógyszeres rágógumi   |
| Viro             | NiQuitin Fruit   |

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.01.2019**

#### **Muut tiedonlähteet**

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) kotisivuilta.



## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **NiQuitin Tropical 2 mg eller 4 mg medicinskt tuggummi**

#### **nikotin**

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt sjukvårdspersonalens anvisningar.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till sjukvårdspersonal, t.ex. läkare, sjuksköterska, rökavvänjningsrådgivare eller apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte har lyckats sluta röka efter 9 månaders behandling med NiQuitin Tropical 2 mg eller 4 mg medicinskt tuggummi.
- I denna bipacksedel kallas NiQuitin Tropical 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi för NiQuitin Tropical tuggummi.

#### **I denna bipacksedel finns information om följande**

1. Vad NiQuitin Tropical tuggummi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder NiQuitin Tropical tuggummi
3. Hur du använder NiQuitin Tropical tuggummi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur NiQuitin Tropical tuggummi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad NiQuitin Tropical tuggummi är och vad det används för**

NiQuitin Tropical tuggummi används för att hjälpa människor som vill sluta röka. Denna typ av läkemedel kallas nikotinersättningsmedel.

Det är nikotinet i cigaretterna som kan göra dig fysiskt beroende av rökning.

- NiQuitin Tropical tuggummi hjälper dig att sluta röka genom att ersätta en del av det nikotin du får från cigaretter.
- Detta nikotin minskar en del av de obehagliga symtom som rökare kan känna när de försöker sluta. Dit hör sjukdomskänsla och irritabilitet.
- Nikotinet kan också lindra röksuget och göra det lättare att stå emot lusten att röka.

NiQuitin Tropical tuggummi är inte skadliga för hälsan på samma sätt som tobak. Det beror på att de inte innehåller tjära, koloxid eller andra giftiga ämnen som finns i tobaksrök. En del oroar sig för att de, när de väl lyckats sluta röka, i stället ska bli beroende av nikotintuggummin. Ett sådant beroende är mycket ovanligt och om det skulle inträffa är det både mindre skadligt och lättare att sluta med än rökning.

Dina chanser att lyckas sluta röka ökar om du deltar i ett rökavvänjningsprogram. Sådana ”sluta-röka-program” hjälper dig förändra ditt beteende. Tala med sjukvårdspersonal eller apotekspersonal om du vill ha information om rökavvänjningsprogram.

Det finns inga hälsovinster med att röka, det är alltid bättre att sluta. Nikotinersättningsläkemedel som NiQuitin Tropical tuggummi kan vara till hjälp. I allmänhet uppväger eventuella biverkningar förknippade med nikotinersättningsmedel de välkända riskerna med att fortsätta röka.

## **2. Vad du behöver veta innan du använder NiQuitin Tropical tuggummi**

### **Använd inte NiQuitin Tropical tuggummi:**

- Om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- Om du är under 12 år.

### **Varningar och försiktighet**

#### **Tala med sjukvårdspersonal innan du använder NiQuitin Tropical tuggummi:**

- Om du nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke, eller om du har allvarliga problem med hjärtrytmen, instabil eller försämrad angina (kärlkramp), högt blodtryck som inte kontrolleras med medicinering, eller kärlkramp i vila. I dessa fall ska du försöka sluta röka utan att använda nikotinersättningsmedel, om inte din läkare ordinerat det.
- Om du har diabetes. Kontrollera blodsockret oftare än vanligt när du börjar använda NiQuitin Tropical tuggummi. Ditt insulin- eller läkemedelsbehov kan ändras.
- Om du någonsin har haft allergiska reaktioner som medfört svullnad av läppar, ansikte och svalg (angioödem), eller kliande hudutslag (nässelutslag). Nikotinersättningsmedel kan ibland utlösa sådana reaktioner.
- Om du har tandprotes, eftersom du kan ha svårt att tugga.
- Fyllningar eller tandimplantat kan lossna vid tuggning av nikotintuggummi.
- Nikotinersättningsmedel inte är lämplig för barn under 12 år. Nikotin påverkar barn i högre grad än vuxna. Det kan orsaka svåra förgiftningsfall hos barn som kan leda till döden.

Växla inte mellan NiQuitin Tropical tuggummi och nikotinsugtabletter eller tvärtom när du försöker sluta röka.

Övrigt att beakta: det finns en risk att du kan bli beroende när du använder detta läkemedel.

#### **Rådfråga sjukvårdspersonal om du har:**

- Svåra eller måttliga lever- eller njurbesvär, eftersom risken för biverkningar då kan vara högre.
- Okontrollerad överaktiv sköldkörtel eller feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket) – i så fall har din läkare talat om det för dig – eftersom nikotin kan förvärra symtomen.
- Magsår eller sår på tolvfingertarmen, eller inflammation i matstrupen, eftersom symtomen kan förvärras när du sväljer ned nikotin. Det kan också orsaka sår i munnen. Tala med läkaren om dina symtom blir värre. Det kan vara bättre för dig att använda en annan form av nikotinersättningsmedel, t.ex. nikotinplåster.

#### **Barn (under 12 år)**

En normal dos för vuxna kan allvarligt förgifta eller till och med döda ett litet barn. Det är därför mycket viktigt att du förvarar NiQuitin Tropical tuggummi alltid utom syn- och räckhåll för barn.

#### **Andra läkemedel och NiQuitin Tropical tuggummi**

Tala om för sjukvårdspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Att sluta röka kan förändra effekten av andra läkemedel som du tar. Om du har några frågor eller funderingar kring detta, tala med sjukvårdspersonal.

Detta är särskilt viktigt om du använder andra läkemedel som innehåller

- teofyllin (används vid astma)
- takrin (används vid Alzheimers sjukdom)
- klozapin (används vid schizofreni)
- ropinirol (används vid Parkinsons sjukdom).

### **NiQuitin Tropical tuggummi med mat och dryck**

Du bör inte äta eller dricka något med ett NiQuitin Tropical tuggummi i munnen.

Sura drycker (t.ex. fruktjuice, kaffe eller läsk) påverkar upptaget av nikotin i munhålan.

För att få bästa effekt bör du undvika sådana drycker under cirka 15 minuter innan du använder NiQuitin Tropical tuggummi.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga sjukvårdspersonal innan du använder detta läkemedel.

Rökning under graviditeten medför risker för fostret. Sådana risker är dålig tillväxt före födelsen, för tidig födsel eller dödfödsel. Att sluta röka är det bästa sättet att förbättra både din egen och barnets hälsa. Ju tidigare du slutar röka desto bättre.

Om du är gravid är det allra bäst om du kan sluta röka utan att använda nikotinersättningsmedel. Om du har försökt och inte lyckats kan sjukvårdspersonal rekommendera nikotinersättningsmedel som stöd för dig när du försöker sluta. Det är bättre för det växande barn än om du fortsätter röka. Beslutet att använda nikotinersättningsmedel bör fattas så tidigt som möjligt under graviditeten. Målet är att det bara ska användas i 2–3 månader. Kom ihåg att det viktigaste är att du slutar röka. Nikotintuggummi liknande preparat kan vara bättre än nikotinplåster, eftersom tuggummit inte tillför nikotin hela tiden. Om du mår illa eller kräks kan det dock vara bättre att använda plåster.

Om du ammar, orsakar tobaksrök andningssvårigheter och andra problem i spädbarn och små barn. Det bästa är att du slutar röka utan att använda nikotinersättningsmedel. Om du har försökt och inte lyckats kan sjukvårdspersonal rekommendera nikotinersättningsmedel. Om du måste använda nikotinersättningsmedel för att kunna sluta är den mängd nikotin barnet får i sig liten. Det bästa är att använda sådana nikotinersättningsmedel som bara tas vid vissa tillfällen under dagen (t.ex. tuggummin eller sugtabletter snarare än plåster). Det är också bäst att amma precis innan du tar tuggummit. Då får barnet i sig så lite nikotin som möjligt.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

NiQuitin Tropical tuggummi har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Du måste dock vara medveten om att du kan få beteendeförändringar när du slutar röka, vilket skulle kunna påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

### **NiQuitin Tropical tuggummi innehåller**

- Natrium – Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tuggummi, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
- Sorbitol (E420) – Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

- Butylhydroxitoluen (E321) – kan vara irriterade för slemhinnor.

### 3. Hur du använder NiQuitin Tropical tuggummi

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från sjukvårdspersonal. Rådfråga sjukvårdspersonal om du är osäker.

Under ett försök att sluta röka med hjälp av NiQuitin Tropical tuggummi är det viktigt att du verkligen försöker sluta röka helt. Om du skulle röka en cigarett under tiden du använder nikotinersättningsmedel ska du ändå fortsätta med ditt försök att sluta röka. Om det är fortfarande svårt för dig att sluta kan det hjälpa att tala med läkare, sjuksköterska, rökavvänjningsrådgivare eller apotekspersonal.

NiQuitin Tropical tuggummi 2 mg är lämpligt för personer som röker under 20 cigaretter per dag. NiQuitin Tropical tuggummi 4 mg är lämpligt för personer som röker 20 cigaretter eller fler per dag.

Tugga inte NiQuitin Tropical tuggummi som ett vanligt tuggummi. Om du tuggar NiQuitin Tropical tuggummi för snabbt och utan uppehåll frisätts nikotinet för snabbt. Det kan orsaka obehag (t.ex. halsbränna eller hicka).

När du tar tuggummit ur förpackningen, dra bort skyddspapperet och tryck ut ett tuggummi. Stoppa tuggummit i munnen och tugga långsamt tills smaken blir stark (cirka 1 minut), sluta sedan tugga och låt tuggummit vila mot kinden. När smaken avtar, tugga några gånger tills smaken blir stark, låt sedan tuggummit vila igen. När gummit har använts på detta sätt under cirka 30 minuter är tuggummit slut. Du ska inte äta eller dricka något med tuggummit i munnen. Det kan minska nikotinupptaget. Använd inte mer än 15 tuggummin per dag. Rådgor med sjukvårdspersonal om du behöver använda NiQuitin Tropical tuggummi längre än totalt 9 månader.

NiQuitin Tropical tuggummi kan användas enligt följande tidsschema med stegvis nedtrappning av antalet tuggummin per dag.

#### Vuxna (18 år och äldre)

- Börja med 8 till 12 tuggummin per dag. Ta ett tuggummi när du känner röksuget.
- Använd tuggummina på detta sätt i upp till 3 månader, minska sedan gradvis på antalet tuggummin du använder varje dag (se tabellen nedan).
- När du är nere i 1 eller 2 tuggummin per dag ska du sluta använda dem helt.

Om du skulle bli röksugen någon gång efter att du slutat. Om det händer kan du ta ett tuggummi igen.

| STEG 1   | STEG 2   | STEG 3   |
|--|--|--|
| Inledning av behandlingen<br>Ta 1 tuggummi när du känner röksuget.<br>Använd 8–12 st/dag i upp till 3 månader. | Nedtrappning<br>Minska stegvis tills du tar 1–2 tuggummin per dag.<br>Sluta då helt. | Stöttande behandling<br>Ta 1 tuggummi om du blir röksugen. |

#### Användning för barn och ungdomar

## **Ungdomar (inkl. 12-17 år)**

Ungdomar ska inte använda NiQuitin Tropical tuggummi om inte en läkare har rekommenderat det.

Överskrid inte den angivna dosen. Ta inte fler tuggummin än den angivna dosen. Rök inte och ta inte några andra nikotininnehållande produkter samtidigt. Följ instruktionerna noga och använd högst 15 tuggummin per dygn (24 timmar).

## **Barn under 12 år**

Barn under 12 år får inte använda NiQuitin Tropical tuggummi.

## **Om du känner dig frestad att börja röka igen**

Om du är orolig för att du ska börja röka igen eller tycker det är svårt att sluta helt med tuggummi, rådfråga sjukvårdspersonal. Om du börjat röka igen kan de hjälpa dig med att få bäst resultat av nikotinersättningsmedel vid ett nytt försök.

## **Om du har använt för stor mängd av NiQuitin Tropical tuggummi**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har använt för många NiQuitin Tropical tuggummin kan du börja känna dig illamående, yr och sjuk. Sluta använda tuggummina och kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning. Visa om möjligt förpackningen eller den här bipacksedeln.

Tuggummit är inte lämpligt för barn under 12 år. Om barn tuggar på tuggummit kan de få symtom på nikotinöverdos. Symtomen är huvudvärk, illamående, magont och diarré. Om barnet har använt eller svält några tuggummin kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning eftersom det kan vara mycket farlig och till och med livshotande. Visa om möjligt förpackningen eller den här bipacksedeln.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vid de rekommenderade doserna har NiQuitin Tropical tuggummi inte visat sig orsaka allvarliga biverkningar.

Att sluta röka kan i sig orsaka symtom som yrsel, huvudvärk, sömnproblem, hosta, förkylningsliknande symtom. Symtom som depression, irritabilitet, ångest och sömnsvårigheter kan också bero på abstinensbesvär när man slutar röka.

Sluta ta NiQuitin Tropical tuggummi och sök läkare omedelbart om du får några av följande symtom på en allergisk reaktion, vilket kan vara allvarligt:

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårt att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter
- oregelbundna hjärtslag.

Övriga biverkningar räknas upp nedan efter sannolikhet att de uppträder.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- illamående, obehag från magtarmkanalen
- halsont, ömmande/torra munslemhinnor, irritation och sår i munnen, inflammation i svalget, hosta
- sömnsvårigheter, huvudvärk, irritabilitet, yrsel
- kräkningar, hicka, matsmältningsbesvär, väderspänning, diarré, förstoppning
- smärta från käkarna.

Ingen av dessa biverkningar är allvarliga och de försvinner ofta efter några dagars behandling.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- snabbare hjärtslag eller ökad medvetenhet om hjärtslagen
- vimmelkantighet
- andningssvårigheter, bröstsmärtor
- smakrubbingar/smakförvrängning
- klåda eller hudutslag, rodnad hud, ökad svettning
- värk eller svullnad i muskler och leder
- inflammation i munslemhinnan
- darrningar
- sjukdomskänsla.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

- allvarliga allergiska symtom såsom plötslig väsande/pipande andning eller trångghetskänsla i bröstet, hudutslag och svimfärdighet.

**Om någon biverkning blir värre, eller om du får biverkningar som inte nämns i denna information, tala om det för sjukvårdspersonal.**

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## **5. Hur NiQuitin Tropical tuggummi ska förvaras**

- **Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.**
- Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Förvaras vid högst 25 °C.
- Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är nikotin. Ett tuggummi innehåller 2 mg eller 4 mg (i form av nikotinresinat).
- Övriga innehållsämnen är
  - Tuggummit innehåller: Butylhydroxitulouen (E321), sorbitol (E420), xylitol (E967), kalciumkarbonat (E170), natriumkarbonat, vattenfritt (E500), glycerol (E422), acesulfamkalium (E950), mannitol (E421), akaciagummi (E414), sukralos (E955), titandioxid (E171) och smakämnen: levomentol, optacool, tropiskt (inkl. glyceryltriacetat (E1518), alfa- tokoferol (E307), tropiskt SD (inkl. arabiskt gummi (E414) och sorbitol (E420), frukt cocktail (inkl. mannitol (E421), glyceryltriacetat (E1518) och mono- och diglycerider av fettsyror (E471) och grapefrukt arom.

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt till benvitt rektangulärt tuggummi

En blisterkarta innehåller 4 eller 10 tuggummin.

Förpackning innehåller 4, 10, 30, 100 eller 200 tuggummin.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

#### Innehavare av godkännande för försäljning

Omega Pharma Nordic AB

Box 7009

SE-164 07 Kista

Sverige

#### Tillverkare

Fertin Pharma A/S

Dandyvej 19

7100 Vejle

Danmark

### Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

|                |  |
|----------------|--|
| Belgien        | NiQuitin Tropisch Fruit – Fruits tropicaux - Tropische Früchte 2mg/4 mg Gomme à mâcher médicamenteuse  |
| Danmark        | NiQuitin Gum Tropical 2 mg & 4 mg medicinsk tyggegummi   |
| Estland        | NiQuitin Fruit   |
| Finland        | NiQuitin Tropical 2 mg & 4 mg lääkepurukumi  |
| Grekland       | NiQuitin Tropical Fruit  |
| Irland         | NiQuitin Tropical Fruit 2 mg & 4mg medicated chewing gum   |
| Italien        | NIQUITINTROPS 2/4mg gomme da masticare medicata gusto frutta tropicale                                 |
| Kroatien       | NiQuitin GUM Tropical Fruit 2 mg & 4 mg ijekovita guma za žvakanje                                     |
| Lettland       | NiQuitin Fruit 2mg & 4mg ārstnieciskā košļājamā gumija   |
| Litauen        | NiQuitin Tropical 2 mg & 4 mg vaistinė kramtomoji guma   |
| Luxemburg      | NiQuitin Tropisch Fruit – Fruits tropicaux - Tropische Früchte 2 mg/4 mg Gomme à mâcher médicamenteuse |
| Nederländerna  | NiQuitin Fruit en Mint 2 mg & 4 mg kauwgom   |
| Norge          | Nicabate 2 mg & 4 mg medisinsk tyggegummi, tropisk frukt   |
| Polen          | NiQuitin Fruit   |
| Portugal       | NiQuitin Tropical 2 mg & 4 mg gomas para mascar medicamentosas   |
| Rumänien       | NIQUITIN Fresh 2 mg & 4 mg gumă masticabilă medicamentoasă   |
| Slovakien      | NiQuitin Tropické ovocie 2 mg & 4 mg liečivé žuvačky   |
| Spanien        | NiQuitin Tropical Fruit 2 mg & 4 mg chicles medicamentosos   |
| Sverige        | NiQuitin Tropiskt frukt 2 mg & 4 mg medicinskt tuggummi  |
| Storbritannien | Nicabate Tropical Flavour 2mg & 4mg Medicated Chewing Gum  |
| Tjeckien       | NiQuitin Tropické ovoce 2 mg & 4 mg léčivá žvýkáčková guma   |

|           |  |
|-----------|--|
| Tyskland  | NiQuitin Tropical Fruit 2 mg & 4 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi |
| Ungern    | NiQuitin Tropical Fruit 2 mg & 4 mg gyógyszeres ráógumi        |
| Österrike | NiQuitin Tropical Fruit 2 mg & 4 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi |

**Denna bipacksedel ändrades senast 24.01.2019**

**Övriga informationskällor**

Ytterligare information om detta läkemedel finns på webbplats [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)