

**PAKKAUSSELOSTE**  
**Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle**

**1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI**

Myyntiluvan haltija:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S  
Weidekampsgade 14  
2300 Kööpenhamina S  
Tanska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
4, Chemin du Calquet  
31000 Toulouse  
Ranska

**2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Hyonate vet. 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle.  
natriumhyaluronaatti

**3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET**

**1 ml sisältää:**

**Vaikuttava aine**

Natriumhyaluronaatti 10 mg

**Apuaineet**

Natriumkloridi  
Dinatriumfosfaatti, vedetön  
Natriumdivetyfosfaattimonohydraatti  
Injektionesteisiin käytettävä vesi

**4. KÄYTTÖAIHEET**

Hevosen infekioon liittymättömien niveltulehdusten hoitoon.

**5. VASTA-AIHEET**

Ei tunnetta.

**6. HAITTAVAIKUTUKSET**

Ohimenevää, paikallista turvotusta voi toisinaan esiintyä vuorokauden kuluessa nivelensisäisen injektion jälkeen. Oireet häviävät normaalisti 1-2 vuorokauden kuluttua.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselostessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

## **7. KOHDE-ELÄINLAJI**

Hevonen

## **8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN**

Laskimoon ja niveleen.

*Laskimoon: 4 ml (40 mg)*

*Niveleen: 2 ml (20 mg)*

Hoito voidaan uusaa 1 viikon kuluttua. Hoitoa saa antaa enintään 3 kertaa.

## **9. ANNOSTUSOHJEET**

Nivelensisäinen injektio on tehtävä ehdottoman aseptisesti ja kudოსvaurioita välttää. Huolellinen injektiokohdan desinfiointi ja eläimen hillitseminen ovat hyvin tärkeitä toimenpiteitä. Ylimääräinen nivelneste tulee poistaa aseptisesti ennen injektiota. Ruston pintaa ei tule raapia neulan kärjellä. Nivelensisäisen injektion jälkeen hevosen tulee levätä 3 päivää, jonka jälkeen vähitellen jatketaan normaalia liikutusta.

## **10. VAROAIKA**

Teurastus: 0 vrk.

## **11. SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta erääntymispäivän jälkeen, joka on ilmoitettu kartonkikotelossa. EXP jälkeen.

## **12. ERITYISVAROITUKSET**

Valmiste ei sisällä säilytysaineita. Käytettävä mahdollisimman nopeasti avaamisen jälkeen.

## **13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

## **14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY**

01.02.2023

## **15. MUUT TIEDOT**

### **Pakkaustyyppi ja sisältö**

Lasipullo, 2 x 2 ml

**BIPACKSEDEL FÖR**  
**Hyonate vet 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst**

**1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA**

Innehavare av godkännande för försäljning:  
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S  
Weidekampsgade 14  
2300 København S  
Danmark

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsats:  
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
4, Chemin du Calquet  
31000 Toulouse  
Frankrike

**2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Hyonate vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst.  
natriumhyaluronat

**3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER**

**1 ml innehåller:**

**Aktivt innehållsämne**  
Natriumhyaluronat 10 mg

**Hjälpämnen**

Natriumklorid  
Dinatriumfosfat, vattenfri  
Natriumdivätefosfatmonohydrat  
Vatten för injektionsvätskor

**4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Behandling av icke infektiösa ledinflammationer hos häst.

**5. KONTRAINDIKATIONER**

Inga kända.

**6. BIVERKNINGAR**

Efter intraartikulär injektion kan i sällsynta fall en lokal, övergående reaktion i form av svullnad förekomma. I de flesta fall avtar symtomen inom 1-2 dagar.  
Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

## **7. DJURSLAG**

Häst

## **8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR**

För intravenös och intraartikulär behandling.

*Intravenöst: 4 ml (40 mg)*

*Intraartikulärt: 2 ml (20 mg)*

Behandlingen kan upprepas efter 1 vecka. Maximalt ges 3 behandlingar.

## **9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING**

Intraartikulär injektion skall utföras under strikt aseptiska förhållanden och försiktighet iakttas för att undvika vävnadsskada. Det är mycket viktigt att injektionsstället desinficeras noggrant och att djuret hålls lugnt. Överflödiga ledvätska skall avlägsnas aseptiskt före injektionen. Var noga med att inte skrapa broskytan med nålens spets.

Efter intraartikulär injektion skall hästen vila i 3 dagar före gradvis tillbakagång till normalt aktivitet.

## **10. KARENSTID**

Slakt: noll dygn.

## **11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som finns angivet på kartongen efter EXP.

## **12. SÄRSKILDA VARNINGAR**

Läkemedlet innehåller inte konserveringsmedel. Läkemedlet ska användas så fort som möjligt efter öppnandet.

## **13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

## **14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

01.02.2023

## **15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

## **Förpackningstyp och innehåll**

Glasflaska, 2 x 2 ml